



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **106331** (13) **U**  
(51) МПК (2016.01)  
**A61N 5/00**  
**A61N 5/067** (2006.01)  
**C12R 1/385** (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
УКРАЇНИ

**(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ**

<b>(21)</b> Номер заявки: <b>u 2015 09708</b>	<b>(72)</b> Винахідник(и): <b>Пантьо Валерій Валерійович (UA),</b> <b>Коваль Галина Миколаївна (UA),</b> <b>Пантьо Валерій Іванович (UA)</b>
<b>(22)</b> Дата подання заявки: <b>07.10.2015</b>	
<b>(24)</b> Дата, з якої є чинними права на корисну модель: <b>25.04.2016</b>	<b>(73)</b> Власник(и): <b>ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ",</b> вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA)
<b>(46)</b> Публікація відомостей про видачу патенту: <b>25.04.2016, Бюл.№ 8</b>	

**(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЦЕФОТАКСИМУ ШТАМІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ВИСІЯНИХ ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ**

**(57) Реферат:**

Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм, включає опромінення стандартної зависі культури (стандарт мутності 0,5 за Мак-Фарландом) *Pseudomonas aeruginosa* низькоінтенсивним лазером при безперервному режимі випромінювання. Опромінення стандартної зависі культури *Pseudomonas aeruginosa* променем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного діапазону при довжині хвилі 870 нм, щільності потужності 15мВт/см<sup>2</sup> з експозицією 180, 360 та 600 секунд здійснюється у м'ясопептонному бульйоні, і опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться на початку логарифмічної фази росту (16-24-годинна агарова або 5-6-годинна бульйонна культура), після чого культуру пересіюють на агар Мюллер-Хінтона у чашках Петрі та наносять стандартні комерційні мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, далі вимірюють зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура), при цьому підвищення чутливості досліджуваних штамів *Pseudomonas aeruginosa* найбільш виражене за експозиції 180 секунд і відповідає щільності дози 2,7 Дж/см<sup>2</sup>.

UA 106331 U



Корисна модель належить до медицини та біології і може бути використана при комплексному лікуванні інфекційних захворювань.

5 *Pseudomonas aeruginosa* (синьогнійна паличка) - типовий представник роду *Pseudomonas*, родини *Pseudomonadaceae*, асоціант різноманітних екологічних ніш людини, тварин і навколишнього середовища, набув широкого поширення як збудник опортуністичних інфекцій у медицині та ветеринарії.

Починаючи з 70-х років ХХ століття, *P. aeruginosa* - один з основних збудників локальних та системних гнійно-запальних процесів, особливо в умовах стаціонарів, де можливі епідемічні спалахи внаслідок порушення правил санітарно-протиепідемічного режиму.

10 Незважаючи на досягнення сучасної мікробіології та практичної медицини, проблеми синьогнійної інфекції в клінічній практиці стоять досить гостро, чому, зокрема, сприяє високий рівень природної та набутої антибіотикорезистентності збудника.

Найбільш близьким за технічною суттю та ефектом, який досягається, є спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму золотистого стафілокока, висіяного із ран, із використанням 15 низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм [1]. Даний спосіб полягає у тому, що опромінення стандартної зависі культури неперервним променем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного діапазону при довжині хвилі 870 нм та потужності 15 мВт з експозицією 180, 360 та 600 секунд здійснюють у м'ясопептонному бульйоні, і 20 опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться у логарифмічній фазі росту, після чого культуру пересіюють на тверде поживне середовище у чашках Петрі та наносять мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, далі вимірюють зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура), при цьому підвищення чутливості культури золотистого стафілокока найбільш 25 виражене за експозиції 180 секунд і відповідає дозі 2,7 Дж.

Цей спосіб [1] дозволяє суттєво підвищити чутливість культур *S. aureus*, висіяних із ран, до цефотаксиму за рахунок безпосереднього впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм на досліджувані штами. Проте даний спосіб не враховує вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на чутливість до цефотаксиму 30 досліджуваних штамів *Pseudomonas aeruginosa*, які відрізняються сукупністю бактеріоскопічних, тинкторіальних, бактеріологічних, біохімічних, серологічних властивостей, а також ступенем природної резистентності до антибактеріальних препаратів від *S. aureus*.

В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого способу підвищення чутливості до цефотаксиму штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, який дасть змогу зменшити терапевтично ефективну та курсову дозу даного антибіотика, його мінімальну інгібуючу концентрацію і, відповідно, токсичний вплив на макроорганізм.

Поставлена задача вирішується таким чином, що спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, із використанням 40 низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм, який включає опромінення стандартної зависі культури (стандарт мутності 0,5 за Мак-Фарландом) *Pseudomonas aeruginosa* низькоінтенсивним лазером при безперервному режимі випромінювання, який відрізняється тим, що опромінення стандартної зависі культури *Pseudomonas aeruginosa* променем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного діапазону при довжині хвилі 870 нм, щільності потужності 15 мВт/см<sup>2</sup> з експозицією 180, 360 та 600 секунд 45 здійснюється у м'ясопептонному бульйоні, і опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться на початку логарифмічної фази росту (16-24-годинна агарова або 5-6-годинна бульйонна культура), після чого культуру пересіюють на агар Мюллер-Хінтона у чашках Петрі та наносять стандартні комерційні мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, далі вимірюють 50 зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура), при цьому підвищення чутливості досліджуваних штамів *Pseudomonas aeruginosa* найбільш виражене за експозиції 180 секунд і відповідає щільності дози 2,7 Дж/см<sup>2</sup>.

В таблиці представлено статистично оброблені дані вимірювання зон затримки росту 55 контрольних та опромінених неперервним променем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного діапазону (довжина хвилі 870 нм, щільність потужності 15 мВт/см<sup>2</sup>, експозиція 180, 360 та 600 сек.) штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран.

Таблиця

Антибіотик	Контроль (n=25)	Опромінення інфрачервоним лазером		
		Експозиція 180 с (n=25)	Експозиція 360 с (n=25)	Експозиція 600 с (n=25)
Цефотаксим	14,1±0,3	22,4±0,3 (P <sub>1</sub> <0,05)	20,3±0,4 (P <sub>2</sub> <0,05)	17,9±0,5 (P <sub>3</sub> <0,05)

P<sub>1</sub> - достовірність різниці між 180-секундною експозицією та контролем;

P<sub>2</sub> - достовірність різниці між 360-секундною експозицією та контролем;

P<sub>3</sub> - достовірність різниці між 600-секундною експозицією та контролем.

5 Так, при опроміненні штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, низькоінтенсивним лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 870 нм при експозиції 180 секунд (щільність дози 2,7 Дж/см<sup>2</sup>), їх чутливість до цефотаксиму збільшилася на 59 %. При експозиції 360 секунд (щільність дози 5,4 Дж/см<sup>2</sup>) спостерігали збільшення чутливості опромінених культур, порівняно з контролем на 44 %. Експозиція, тривалістю 600 секунд (щільність дози 9,0 Дж/см<sup>2</sup>) призвела до збільшення чутливості до цефотаксиму на 27 %.

Конкретним прикладом використання способу, який заявляється, є наступне спостереження.

10 Хвора Р., 1947 р. н., історія хвороби № 597, госпіталізована у хірургічне відділення ВКЛ ст. Ужгород 24.04.2012 р. із діагнозом "Цукровий діабет, II тип, середньої тяжкості, субкомпенсований, діабетична мікро-, макроангіопатія, ішемія тканин нижніх кінцівок II ступеню, трофічна виразка лівої ступні".

15 При госпіталізації хворій призначено антибіотик цефотаксим у добовій дозі 2,0 г. На третю добу отримано результати бактеріологічного дослідження - висіяна *Pseudomonas aeruginosa*, малочутлива до дії цефотаксиму. Хворій призначено опромінення поверхні виразок низькоінтенсивним лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 870 нм, щільністю потужності 15 мВт/см<sup>2</sup> протягом 180 секунд перед введенням антибіотика.

20 На другу добу після корекції лікування хвора відмітила покращення самопочуття, значне зменшення виділень з виразки. Загоєння виразки відбулось протягом 10 діб, хвора виписана додому у задовільному стані.

25 Таким чином, спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм, що пропонується, містить сукупність суттєвих ознак, які відрізняють його від найближчого аналогу і які в сукупності з ознаками, які збігаються з ознаками найближчого аналогу забезпечують досягнення значно вищого результату, а саме, дають змогу значно підвищити чутливість досліджуваних штамів *Pseudomonas aeruginosa* до цефотаксиму, зменшити його терапевтично ефективну та курсову дозу і, відповідно, його токсичний вплив на макроорганізм, оскільки дає змогу при меншій агресивності лікування обмежити прогресування

30 інфекційного процесу, ліквідувати осередок ураження і відновити на задовільному рівні працездатність хворих. Крім того, при здійсненні способу, який заявляється, значно скорочується термін лікування хворих та значно зменшуються дози медикаментозних препаратів.

35 Корисна модель може бути використана в медицині, біології та фармації і рекомендована для практичного застосування у відділеннях хірургічного профілю.

Джерело інформації:

40 1. Патент № 66868 Україна, МПК (2011.01) A61N 5/00 C12R 1/445 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму золотистого стафілокока, висіяного із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / Пантьо В.В., Ніколайчук В.І., Пантьо В.І.; заявник та патентовласник ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - u201107131; заявл. 06.06.2011; опубл. 25.01.2012. - Бюл. № 2. - 6 с. - прототип.

## ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

- Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів *Pseudomonas aeruginosa*, висіяних із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм, який
- 5 включає опромінення стандартної зависі культури (стандарт мутності 0,5 за Мак-Фарландом) *Pseudomonas aeruginosa* низькоінтенсивним лазером при безперервному режимі випромінювання, який **відрізняється** тим, що опромінення стандартної зависі культури *Pseudomonas aeruginosa* променем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного діапазону при довжині хвилі 870 нм, щільності потужності 15мВт/см<sup>2</sup> з експозицією 180, 360 та 600 секунд
- 10 здійснюється у м'ясопептонному бульйоні, і опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться на початку логарифмічної фази росту (16-24-годинна агарова або 5-6-годинна бульйонна культура), після чого культуру пересіюють на агар Мюллер-Хінтона у чашках Петрі та наносять стандартні комерційні мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, далі вимірюють
- 15 зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура), при цьому підвищення чутливості досліджуваних штамів *Pseudomonas aeruginosa* найбільш виражене за експозиції 180 секунд і відповідає щільності дози 2,7 Дж/см<sup>2</sup>.