

УДК 616.13-002.28-06:616.17.4

2708. Случай синдрома Бюргера с поражением нескольких висцеральных органов. Лазорик М. И., Кутафьев В. Б. Burger's Syndrome with Affection of Several Visceral Organs. Ужгород, 1979, 5 с. (Рукопись депонир. во ВНИИМИ МЗ СССР № 2403-79).

Приведена выписка из истории болезни больного, у которого в течение непродолжительного времени имели место тромбоз сосудов головного мозга, инфаркт миокарда, дважды инфаркт легкого. В период пребывания в стационаре развился спазм мезентериальных сосудов по типу брюшной ангины. Сделан вывод, что первичным было поражение сосудов нижних конечностей (мигрирующий тромбофлебит), а его течение распространилось на сосуды висцеральных органов. СССР.

лат хирургически. При обструкции лимфатических сосудов формируется лимфогенный анастомоз. Из 7 случаев хирургического вмешательства удовлетворительные результаты имели место в 2, в 3 отмечали отеки конечностей, в 2 — окклюзию вены в месте анастомоза. Радиоизотопное и рентгенологическое исследования применяли для обнаружения отверстия при несостоятельных анастомозах и протекания лимфы через эти отверстия. Имевшая место окклюзия вены в месте анастомоза была связана с образованием тромба или развитием пролиферации эндотелия. Операция на правой нижней конечности заключалась в подведении лигатуры и перевязке значительно расширенного лимфатического канала. Наблюдали уменьшение отека конечности. При вмешательстве на клапанах во всех случаях имело место уменьшение отека конечностей. Япония, University School of Medicine, Hamamatsu.