

НАУКОВИЙ ВІСНИК
у жгородського університету

серія

**МАТЕМАТИКА І
ІНФОРМАТИКА**

випуск № 1 (30)

2017

УДК 51+001

Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. /
Редкол.: В. В. Маринець (гол. ред.) та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ
«Говерла», 2017. – випуск №1 (30). – 155 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор — Маринець В. В., доктор фізико-математичних наук, професор.
Заст. головн. редактора — Гече Ф. Е., доктор технічних наук; доцент.
Заст. головн. редактора — Король І. І., доктор фізико-математичних наук, доцент.
Відповідальний секретар — Мич І. А., кандидат фізико-математичних наук,
доцент.

Члени редакційної колегії:

Бовді А. А., доктор фізико-математичних наук, професор.
Бовді В. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Бондаренко В. М., доктор фізико-математичних наук, професор.
Волошин О. Ф., доктор технічних наук, професор.
Головач Й. Г., доктор технічних наук, професор.
Гусак Д. В., доктор фізико-математичних наук, професор.
Задирака В. К., академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор.
Козаченко Ю. В., доктор фізико-математичних наук, професор.
Кузка О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Перестюк М. О., академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор.
Ронто А. М., доктор фізико-математичних наук, професор,
Ронто М. Й., доктор фізико-математичних наук, професор,
Сливка-Тиличак Г. І., доктор фізико-математичних наук, доцент.
Слюсарчук П. В., кандидат фізико-математичних наук, професор.
Шапочка І. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Рекомендовано до друку Вченого радиою ДВНЗ «Ужгородський національний
університет», протокол № 5 від 27.04.2017 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №7972 від 9.10.2003 року, видане Державним комітетом телебачення
і радіомовлення України.

Засновник і видавець — Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет».

Виходить два рази на рік.

Збірник наукових праць видається з 1994 року.

Адреса редакційної колегії: Україна, 88020 Ужгород, вул. Університетська, 14,
математичний факультет УжНУ. Тел. (факс): +380 (312) 642725, e-mail:
f-mat@uzhnu.edu.ua.

© В. В. Маринець,
І. А. Мич, упорядкування, 2017

© Ужгородський національний університет,
2017

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

STATE UNIVERSITY
«UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY»

cop.

r.

**SCIENTIFIC BULLETIN OF
UZHGOROD UNIVERSITY**

Series of
MATHEMATICS AND INFORMATICS

Issue no 1 (30)

Uzhhorod 2017

Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics / Edit.: V. Marynets (Chief edit.) and others. – Uzhhorod: Scientific Bulletin of UzhNU «Hoverla», 2017. – Issue no 1 (30). – 155 p.

EDITORIAL

Chief editor — Marynets V., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Deputy Chief editor — Heche F., As. prof., Dr. Sci. (Tech.).

Deputy Chief editor — Korol I., As. prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Responsible secretary — Mych I., As. prof., Cand. Sci. (Phys.-Math.).

Members: Bovdi A., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Bovdi V., As. prof., Cand. Sci. (Phys.-Math.).

Bondarenko V., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Voloshyn O., Prof., Dr. Sci. (Tech.).

Holovach J., Prof., Dr. Sci. (Tech.).

Gusak D., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Zadyraka V., Prof., academic of NA of Sc of Ukraine,

Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Kozachenko Yu., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Kuzka A., As. prof., Cand. Sci. (Phys.-Math.).

Perestyuk N., Prof., academic of NA of Sc of Ukraine,

Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Ronto A., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Ronto M., Prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Slyvka-Tulyshchak G., As. prof., Dr. Sci. (Phys.-Math.).

Slyusarchuk P., Prof., Cand. Sci. (Phys.-Math.).

Shapochka I., As. prof., Cand. Sci. (Phys.-Math.).

Recommended for publication by the Scientific Council of UzhNU, record no 5
dated by April 27, 2017.

Certificate of state registration number KV 7972 dated by September 9, 2003.

Founder and Publisher: State University “Uzhhorod National University”.

Published twice a year.

The collection of scientific articles has been published since 1994.

Address of publishing house: Mathematical faculty “UzhNU”, Universytetska
str. 14, Uzhhorod, 88020, Ukraine, tel. (fax): +380 (312) 642725, e-mail:
f-mat@uzhnu.edu.ua.

ЗМІСТ

1. Герич М. С. Гусак Дмитро Васильович — до 80-ти річчя від дня народження	7
2. Бондаренко В. М., Бортос M. Ю. Достатні умови звідності в категорії мономіальних матриць над комутативним локальним кільцем	11
3. Бондаренко В. М., Заціха Я. В. Про комбінаторні властивості напівгруп четвертого порядку	25
4. Боярищева Т. В., Далекорей М. В., Михасюк М. М., Поляк І. Й., Слюсарчук П. В. Деякі узагальнення оцінок Золотарьова для послідовності серій	32
5. Брила А. Ю., Гренджа В. І. Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічної задачі про ранг з альтернативними критеріями	43
6. Гопкало О. М. Узагальнені твори Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів	47
7. Костишин Е. М. Алгебра Ауслендера для нашівгрупи всіх перетворень двоелементної множини	53
8. Лукашів Т. О., Малик І. В. Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості в <i>L₁, m</i> для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами і переміканнями	61
9. Маринець К. В., Мауриц О. Т. Дослідження розв'язності нелінійних двоточкових крайових задач за допомогою топологічних індексів	66
10. Мич І. А., Ніколенко В. В. Повні системи тотожностей в одному класі алгебр	79
11. Петечук В. М., Петечук Ю. В. Нерухомі і лишкові підмодулі	87
12. Плакош Л. І., Шапочка І. В. Про когомології четвертої групи Клейна	95
13. Романюк І. В. Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи	103
14. Сливка-Тилищак Г. І. Оцінки для розподілу супремуму на нескінченності розв'язку задачі про коливання струни з випадковими початковими умовами	110
15. Чуйко С. М., Сисоев Д. В. Лінійна матрична диференціально-алгебраїчна крайова задача у випадку параметричного резонансу	118
16. Чупов С. В. Бінарні алгоритми пошуку лексикографічних екстремумів множин у задачах про покриття та упаковку скінченної множини	133
17. Ясинський В. К., Юрченко І. В., Кисілюк У. М. Існування та єдиність сильного розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішніми випадковими збуреннями	143

УДК 517.9

К. В. Маринець, О. Т. Мауриц (ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т»)

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДВОТОЧКОВИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОПОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ

We give new existence results of the boundary-value problem investigation, in the case of two-point non-linear boundary conditions, that base upon the theory of topological indexes, i. e. the Brauwer topological index.

У роботі наведено нові результати дослідження існування розв'язків нелінійних двоточкових краївих задач, які базуються на використанні теорії топологічних індексів, а саме — топологічного індексу Брауєра.

1. Вступ. Результати, які наведено у даній роботі, є новими та базуються на одержаних раніше результатах дослідження нелінійних багатоточкових та інтегральних краївих задач [1–7], та є продовженням роботи [3].

2. Постановка задачі. Розглянемо країву задачу для системи нелінійних диференціальних рівнянь з нелінійними двоточковими граничними умовами вигляду:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)), \quad t \in [0, T], \quad x, f \in \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

$$g(x(0), x(T)) = 0, \quad (2)$$

де функції $f : [0, T] \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ та $g : D \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) неперервні, а множина $D \subset \mathbb{R}^n$ — замкнена обмежена область.

Задача полягає у встановленні необхідних та достатніх умов існування розв'язків країової задачі (1), (2) у класі неперервно диференційовних функцій $x : [0, T] \times D$.

3. Побудова наближеного розв'язку країової задачі (1), (2). У науковій статті [3] обґрунтовано, що доцільно, замість країової задачі (1), (2) з нелінійними краївими умовами, досліджувати задачу з деякими параметризованими лінійними умовами. Таким чином, за допомогою параметризації вигляду:

$$z := x(0), \quad \lambda := x(T). \quad (3)$$

одержимо країву задачу з лінійними розділеними краївими умовами:

$$x(0) = z, \quad x(T) = d(z, \lambda), \quad (4)$$

де $d(z, \lambda) := \lambda + g(z, \lambda)$.

Зауваження 1. Множина розв'язків нелінійної двоточкової країової задачі (1), (2) співпадає з множиною тих розв'язків задачі (1), (4), які задовольняють додатковим умовам (3).

Припустимо, що країова задача (1), (4) задовільняє наступні умови:

1) Функція f неперервна в області $[0, T] \times D$ та задовільняє умову Ліпшицца:

$$|f(t, u) - f(t, v)| \leq K |u - v|, \quad (5)$$

для всіх $t \in [0, T]$, $\{u, v\} \subset D$, де $K = (k_{ij})_{i,j=1}^n$ — деяка стала матриця з невід'ємними компонентами.

2) множина

$$D_\beta := \left\{ z \in D : B \left(z + \frac{t}{T} [d(z, \lambda) - z], \frac{T}{2} \delta_D(f) \right) \subset D, \forall \lambda \in D \right\}$$

є непорожньою, тобто

$$D_\beta \neq \emptyset, \quad (6)$$

де

$$\delta_D(f) := \frac{1}{2} \left[\max_{(t,x) \in [0,T] \times D} f(t, x) - \min_{(t,x) \in [0,T] \times D} f(t, x) \right]. \quad (7)$$

3) Спектральний радіус матриці

$$Q := \frac{3T}{10} K \quad (8)$$

задовільняє нерівність:

$$r(Q) < 1. \quad (9)$$

Для дослідження розв'язків параметризованої країової задачі (1), (4) будуємо послідовність функцій $\{x_m\}$, що визначається рекурентним співвідношенням [3]:

$$x_m(t, z, \lambda) := z + \int_0^t f(s, x_{m-1}(s, z, \lambda)) ds - \\ - \frac{t}{T} \int_0^T f(s, x_{m-1}(s, z, \lambda)) ds + \frac{t}{T} [d(z, \lambda) - z], \quad (10)$$

де $m = 1, 2, 3, \dots$, $z \in D_\beta$, $\lambda \in D$, а в якості початкового наближення розглядається функція:

$$x_0(t, z, \lambda) = z + \frac{t}{T} [d(z, \lambda) - z] \in D_\beta,$$

Для доведення необхідних та достатніх умов існування розв'язків країової задачі (1), (4) наведемо основні теореми.

Теорема 1. [3] *Нехай функція $f : [0, T] \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ у правій частині системи диференціальних рівнянь (1), а також параметризовані розділені країові умови (4) задовільняють умови (5), (6), (9).*

Тоді при всіх фіксованих $\lambda \in D$, $z \in D_\beta$:

- 1) *Усі функції послідовності (10) неперервно диференційовні і задовільняють параметризовані країові умови:*

$$x_m(0, z, \lambda) = z, \quad x_m(T, z, \lambda) = d(z, \lambda),$$

$m=1,2,3,\dots$

- 2) *Послідовність функцій (10) рівномірно збігається відносно $t \in [0, T]$ при $m \rightarrow \infty$ до граничної функції*

$$x_\infty(t, z, \lambda) = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m(t, z, \lambda). \quad (11)$$

3) Границна функція x_∞ задовільняє параметризовані лінійні граничні умови:

$$x_\infty(0, z, \lambda) = z, \quad x_\infty(T, z, \lambda) = d(z, \lambda).$$

4) Границна функція (11) для всіх $t \in [0, T]$ є єдиним неперервно диференційовним розв'язком інтегрального рівняння:

$$x(t) = z + \int_0^t f(s, x(s))ds - \frac{t}{T} \int_0^T f(s, x(s))ds + \frac{t}{T} [d(z, \lambda) - z],$$

або еквівалентної йому задачі Коші для модифікованої системи диференціальних рівнянь вигляду:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) + \Delta(z, \lambda),$$

$$x(0) = z, \quad (12)$$

де

$$\Delta(z, \lambda) := \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x(s))ds. \quad (13)$$

5) Має місце оцінка відхилення x_m від її граничної функції:

$$|x_\infty(t, z, \lambda) - x_m(t, z, \lambda)| \leq \frac{20}{9} t \left(1 - \frac{t}{T}\right) Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f), \quad (14)$$

де I_n — одинична n -вимірна матриця, $K, Q, \delta_D(f)$ задаються співвідношеннями (5), (8) та (7) відповідно.

Розглянемо задачу Коші для системи диференціальних рівнянь з постійним збуренням у правій частині:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) + \mu, \quad t \in [0, T] \quad (15)$$

з початковими умовами (12), де $\mu = \text{col}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ є керуючим параметром.

Теорема 2. [3] Нехай $z \in D_\beta$, $\lambda \in D$ та $\mu \in \mathbb{R}^n$ — довільно задані вектори. Припустимо, що для системи (1) виконуються всі умови Теореми 1.

Тоді для того, щоб розв'язок задачі Коші (15), (12) задовільняє також і двоточкові параметризовані крайові умови (4), необхідно і достатньо, щоб параметр μ в (15) був заданий рівностю:

$$\mu = \mu_{z, \lambda} = \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_\infty(s, z, \lambda))ds.$$

де x_∞ має вигляд (10).

Теорема 3. [3] Нехай для крайової задачі (1), (2) виконуються умови (5), (6), (9).

Тоді пара $(x_\infty(\cdot, z^*, \lambda^*), \lambda^*)$ є розв'язком параметризованої крайової задачі (1), (4) тоді і тільки тоді, коли $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_n^*)$, $\lambda^* = (\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_n^*)$ задовільняють систему визначальних алгебраїчних рівнянь:

$$\Delta(z, \lambda) = \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - \bar{z}] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_\infty(s, z, \lambda)) ds = 0, \quad (16)$$

$$x_\infty(T, z, \lambda) = \lambda. \quad (17)$$

Зауваження 2. При деякому $t \geq 1$ визначимо функцію $\Delta_m : D_\beta \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ згідно формули:

$$\Delta_m(z, \lambda) := \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_m(s, z, \lambda)) ds, \quad (18)$$

де z та λ задаються співвідношеннями (3). Для дослідження розв'язності параметризованої крайової задачі (1), (4) розглядаємо наближену визначальну систему алгебраїчних рівнянь, що має вигляд:

$$\Delta_m(z, \lambda) = \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_m(s, z, \lambda)) ds = 0, \quad (19)$$

$$x_m(T, z, \lambda) = \lambda, \quad (20)$$

де $x_m(\cdot, z, \lambda)$ вектор-функція, задана рекурентним співвідношенням (10).

При зростанні t системи (16), (17) і (19), (20) досить близькі, щоб забезпечити необхідну точність знаходження наближеного розв'язку вихідної крайової задачі (1), (2).

4. Достатні умови існування розв'язків крайової задачі

Означення 1. [4] Для всіх індексів i_1 та i_2 , що приймають значення від 1 до n , визначимо матрицю J_{i_1, i_2} розмірності $(i_2 - i_1 + 1) \times n$ наступним чином:

$$J_{i_1, i_2} := (O_{i_2-i_1+1, i_1-1}, I_{i_2-i_1+1}, O_{i_2-i_1+1, n-i_2}).$$

Таким чином, множення зліва деякого вектора матрицею J_{i_1, i_2} еквівалентно вибору його компонент з номерами від i_1 до i_2 .

Лема 1. Нехай виконуються умови Теореми 1.

Тоді для кожного $t \geq 1$ та z, λ вигляду (3) для точної та наближеної визначальних функцій

$$\begin{aligned} \Delta &: D_\beta \times D \rightarrow \mathbb{R}^n, \\ \Delta_m &: D_\beta \times D \rightarrow \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

визначених згідно з (13) та (18), випливає оцінка:

$$|\Delta(z, \lambda) - \Delta_m(z, \lambda)| \leq \frac{10T}{27} K Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f), \quad (21)$$

де $K, Q, \delta_D(f)$ задаються співвідношеннями (5), (8) та (7) відповідно.

Доведення. Зафіксуємо параметри z, λ вигляду (3). З урахуванням умови Ліппшица (5), оцінки (14) та рівності

$$\int_0^T \alpha_1(t)dt = \frac{T^2}{3},$$

маємо:

$$\begin{aligned} |\Delta(z, \lambda) - \Delta_m(z, \lambda)| &= \\ &= \left| \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_\infty(s, z, \lambda)) ds - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_m(s, z, \lambda)) ds \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{T} \int_0^T K |x_\infty(s, z, \lambda) - x_m(s, z, \lambda)| ds \leq \frac{1}{T} K \int_0^T \frac{10}{9} \alpha_1(s) Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f) ds = \\ &= \frac{10}{9T} K Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f) \int_0^T \alpha_1(s) ds = \frac{10T}{27} K Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f), \end{aligned}$$

що і доводить лему.

На основі систем визначальних рівнянь (16), (17) та (19), (20) введемо в розгляд наступні відображення:

$$\begin{aligned} \Phi : D_\beta \times D &\rightarrow \mathbb{R}^{2n}, \\ \Phi_m : D_\beta \times D &\rightarrow \mathbb{R}^{2n}, \end{aligned}$$

які для всіх z, λ з (3) мають вигляд:

$$\Phi(z, \lambda) := \begin{pmatrix} \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_\infty(s, z, \lambda)) ds \\ x_\infty(T, z, \lambda) - \lambda \end{pmatrix}, \quad (22)$$

$$\Phi_m(z, \lambda) := \begin{pmatrix} \frac{1}{T} [d(z, \lambda) - z] - \frac{1}{T} \int_0^T f(s, x_m(s, z, \lambda)) ds \\ x_m(T, z, \lambda) - \lambda \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Означення 2. [4] Нехай $H \subset \mathbb{R}^{2n}$ деяка непорожня множина. Для всякої пари функцій

$$f_j = \text{col}(f_{j1}(x), \dots, f_{j,2n}(x)) : H \rightarrow \mathbb{R}^{2n}, j = 1, 2$$

має місце запис:

$$f_1 \triangleright_H f_2$$

тоді і тільки тоді, коли існує функція

$$g : H \rightarrow \{1, 2, \dots, 2n\}$$

така, що

$$f_{1,g(x)} > f_{2,g(x)}$$

для всіх $x \in H$, це означає, що в кожній точці $x \in H$ принаїмні одна з компонент вектора $f_1(x)$ більша, ніж відповідна їй компонента вектора $f_2(x)$.

Розглянемо множину:

$$\Omega = D_1 \times \Lambda_1, \quad (24)$$

де $D_1 \subset D_\beta$, $\Lambda_1 \subset D_0$ — деякі відкриті множини.

Теорема 4. *Нехай виконуються умови Теореми 1 і можна вказати деякі $m \geq 1$ та множину $\Omega \subset \mathbb{R}^{2n}$ вигляду (24) такі, що має місце співвідношення:*

$$|\Phi_m| >_{\partial\Omega} \left(\frac{\frac{10T}{27}}{\frac{20}{9}t(1 - \frac{t}{T})} KQ^m(I_n - Q)^{-1}\delta_D(f) \right), \quad (25)$$

Крім того, якщо індекс Брауера векторного поля Φ_m на множині Ω відносно нуля задовільняє нерівність:

$$\deg(\Phi_m, \Omega, 0) \neq 0, \quad (26)$$

тоді існує пара $(z^, \lambda^*) \in \Omega$ така, що*

$$x_\infty(t) = x_\infty(t, z^*, \lambda^*) = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m(t, z^*, \lambda^*) \quad (27)$$

є розв'язком нелінійної крайової задачі (1), (2) з початковою умовою

$$x_\infty(0) = z^*. \quad (28)$$

Доведення. Доведемо, що векторні поля Φ та Φ_m гомотопні. Для цього введемо в розгляд сім'ю векторних відображень:

$$P(\theta, z, \lambda) := \Phi_m(z, \lambda) + \theta [\Phi(z, \lambda) - \Phi_m(z, \lambda)], \quad (29)$$

де $(z, \lambda) \in \partial\Omega$, $\theta \in [0, 1]$.

Очевидно, що $P(\theta, \cdot, \cdot)$ — неперервне на $\partial\Omega$ для кожного $\theta \in [0, 1]$. Крім того,

$$P(0, z, \lambda) = \Phi_m(z, \lambda), P(1, z, \lambda) = \Phi(z, \lambda)$$

для всіх $(z, \lambda) \in \partial\Omega$.

Для довільної пари $(z, \lambda) \in \partial\Omega$, з урахуванням (29), маємо

$$\begin{aligned} |P(\theta, z, \lambda)| &= |\Phi_m(z, \lambda) + \theta [\Phi(z, \lambda) - \Phi_m(z, \lambda)]| \geq \\ &\geq |\Phi_m(z, \lambda)| - |\Phi(z, \lambda) - \Phi_m(z, \lambda)|. \end{aligned} \quad (30)$$

З іншого боку, на основі позначення (22), (23), з використанням апроксимації (10) та оцінки (21), одержимо покомпонентні нерівності:

$$|\Phi(z, \lambda) - \Phi_m(z, \lambda)| \leq \left(\frac{\frac{10T}{27}}{\frac{20}{9}t(1 - \frac{t}{T})} KQ^m(I_n - Q)^{-1}\delta_D(f) \right), \quad (31)$$

звідки, на основі співвідношень (25), (30), (31), випливає, що:

$$|P(\theta, \cdot, \cdot)| >_{\partial\Omega} 0, \theta \in [0, 1]. \quad (32)$$

Вираз (32) зокрема показує, що $P(\theta, \cdot, \cdot)$ не перетворюється в 0, для жодного значення $\theta \in [0, 1]$, тобто збурення (29) невироджене, а отже, векторні поля, Φ_m та Φ гомотопні.

Беручи до уваги співвідношення (26) та властивість інваріантності індексу Брауера відносно гомотопії, можемо зробити висновок, що

$$\deg(\Phi(z, \lambda), \Omega, 0) = \deg(\Phi_m(z, \lambda), \Omega, 0) \neq 0.$$

Класичний топологічний результат гарантує існування пари:

$$(z^*, \lambda^*) \in \Omega$$

такої, що

$$\Phi(z^*, \lambda^*) = 0.$$

Тому пара (z^*, λ^*) задовільняє систему визначальних рівнянь (15), (16).

Беручи до уваги умови Теореми 3, приходимо до висновку, що функція (27) є розв'язком вихідної нелінійної двоточкової крайової задачі (1), (2) з початковою умовою (28).

Зауваження 3. Для перевірки умови (25) Теореми 4 на конкретних прикладах, потрібно використати рекурентну формулу (10), щоб обчислити значення функції $x_m(\cdot, z, \lambda)$, яка залежить від параметрів $z \in D_\beta$, $\lambda \in D$ та встановити чи приналежні одна з компонент вектора Φ_m у лівій частині співвідношення (25) більша ніж відповідна її компонента вектора у правій частині його у кожній точці границі $\partial\Omega$.

Після цього встановити, згідно з (26), чи топологічний індекс відображення Φ_m відмінний від нуля. У загальному це є досить складною задачею, але в ряді випадків можна застосовувати додаткові критерії для дослідження цього питання.

Зокрема, коли Φ_m не парне відображення, тобто

$$\Phi_m(-z, -\lambda) = -\Phi_m(z, \lambda),$$

тоді згідно з теоремою Борсукa індекс Brauera є непарним числом, а отже відмінним від нуля.

Зауваження 4. Безпосередньо з визначення топологічного індексу випливає, що якщо якобіан функції Φ_m вигляду (23) вироджений в ізольованому нулі

$$z = z_{m,0}, \quad \lambda = \lambda_{m,0},$$

тобто

$$\det \frac{\partial}{\partial(z, \lambda)} \Phi_m(z_{m,0}, \lambda_{m,0}) \neq 0,$$

тоді нерівність (26) має місце.

5. Необхідні умови існування розв'язків. Введемо у розгляд матрицю

$$R := \sup_{t \in [0, T]} \left| 1 - \frac{t}{T} \right| I_n \quad (33)$$

та вектор

$$\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1) = d(z^0, \lambda^0) - d(z^1, \lambda^1). \quad (34)$$

Лема 2. Нехай виконуються умови Теореми 1.

Тоді гранична функція (11) відносно змінних z та λ задовільняє умову ліпшицевого типу наступного вигляду:

$$|x_\infty(t, z^0, \lambda^0) - x_\infty(t, z^1, \lambda^1)| \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \left[R + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} R \alpha_1(t) \right] |z^0 - z^1| + \\ &+ \left[I_n + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} \alpha_1(t) \right] |\rho(z^0, \lambda^0, z^1, \lambda^1)|, \end{aligned} \quad (35)$$

де $z^j \in D_\beta$, $\lambda^j \in D_0$, $j = 0, 1$, $t \in [0, T]$.

Доведення. З виразу (10) при $m = 1$ випливає

$$\begin{aligned} x_1(t, z^0, \lambda^0) - x_1(t, z^1, \lambda^1) &= (z^0 - z^1) + \\ &+ \int_0^t [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds - \frac{t}{T} \int_0^T [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds + \\ &+ \frac{t}{T} [d(z^0, \lambda) - z^0 - d(z^1, \lambda) + z^1] = \\ &= \left(1 - \frac{t}{T}\right) I_n (z^0 - z^1) + \left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds - \\ &- \frac{t}{T} \int_t^T [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds - \frac{t}{T} [d(z^0, \lambda) - d(z^1, \lambda)] = \\ &= \left(1 - \frac{t}{T}\right) I_n (z^0 - z^1) + \left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds - \\ &- \frac{t}{T} \int_t^T [f(s, z^0) - f(s, z^1)] ds - \frac{t}{T} \rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1), \end{aligned}$$

де $\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)$ визначена згідно з (34).

Використовуючи рекурентну формулу (10) та беручи до уваги співвідношення (5), (33), (34) одержимо:

$$\begin{aligned} &|x_1(t, z^0, \lambda^0) - x_1(t, z^1, \lambda^1)| \leq \\ &\leq R |z^0 - z^1| + K \left[\left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t ds + \frac{t}{T} \int_t^T ds \right] |z^0 - z^1| + \frac{t}{T} |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| \leq \\ &= [R + \alpha_1(t)K] |z^0 - z^1| + |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|, \end{aligned} \quad (36)$$

для всіх $t \in [0, T]$.

Аналогічно, враховуючи вирази (10), (5) та (36), при $m = 2$ маємо:

$$\begin{aligned} &|x_2(t, z^0, \lambda^0) - x_2(t, z^1, \lambda^1)| \leq \\ &\leq R |z^0 - z^1| + K \left[\left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t [(R + K\alpha_1(s)) |z^0 - z^1| + |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|] ds + \right. \\ &\left. + \frac{t}{T} \int_t^T [(R + K\alpha_1(s)) |z^0 - z^1| + |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|] ds \right] + |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| = \\ &= (R + KR\alpha_1(t) + K^2\alpha_2(t)) |z^0 - z^1| + K\alpha_1(t) |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| + \\ &+ |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|. \end{aligned} \quad (37)$$

За індукцією, на основі оцінок, одержаних у (36), (37), можна показати, що:

$$\begin{aligned} & |x_m(t, z^0, \lambda^0) - x_m(t, z^1, \lambda^1)| \leq \\ & \leq \left[R + \sum_{i=1}^{m-1} K^i R \alpha_i(t) + K^m \alpha_m(t) \right] |z^0 - z^1| + \sum_{i=0}^{m-1} K^i \alpha_i(t) |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|. \quad (38) \end{aligned}$$

З нерівності (38) отримаємо:

$$\begin{aligned} & |x_m(t, z^0, \lambda^0) - x_m(t, z^1, \lambda^1)| \leq \\ & \leq \left[R + \frac{10}{9} K \sum_{i=1}^{m-2} Q^i R \alpha_1(t) + \frac{10}{9} K Q^{m-1} \alpha_1(t) \right] |z^0 - z^1| + \\ & + \left[I_n + \frac{10}{9} K \alpha_1(t) \sum_{i=1}^{m-2} Q^i \right] |\rho(z^0, \lambda^0, z^1, \lambda^1)|. \quad (39) \end{aligned}$$

При переході в оцінці (39) до границі при $m \rightarrow \infty$, одержимо:

$$\begin{aligned} & |x_\infty(t, z^0, \lambda^0) - x_\infty(t, z^1, \lambda^1)| \leq \\ & \leq \left[R + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} R \alpha_1(t) \right] |z^0 - z^1| + \\ & + \left[I_n + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} \alpha_1(t) \right] |\rho(z^0, \lambda^0, z^1, \lambda^1)|. \end{aligned}$$

Лема 3. Нехай виконується умови Теореми 1.

Тоді для функції $\Delta : D_\beta \times D_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ системи визначальних рівнянь (16), (17) справедлива оцінка:

$$\begin{aligned} & |\Delta(z^0, \lambda^0) - \Delta(z^1, \lambda^1)| \leq \\ & \leq KR \left[I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right] |z^0 - z^1| + \\ & + K \left[I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right] |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| + \frac{1}{T} |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|. \quad (40) \end{aligned}$$

де $z^j \in D_\beta$, $\lambda^j \in D$, $j=0, 1$.

Доведення. Згідно із співвідношеннями (13) маємо:

$$\begin{aligned} & \Delta(z^0, \lambda^0) - \Delta(z^1, \lambda^1) = \\ & = -\frac{1}{T} \int_0^T [f(s, x_\infty(s, z^1, \lambda^1)) - f(s, x_\infty(s, z^0, \lambda^0))] ds + \\ & + \frac{1}{T} [d(z^0, \lambda^0) - d(z^1, \lambda^1) - z^0 + z^1]. \quad (41) \end{aligned}$$

А тоді, з урахуванням (5), (33) – (35), із (41) отримаємо:

$$|\Delta(z^0, \lambda^0) - \Delta(z^1, \lambda^1)| \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{1}{T} |z^0 - z^1| + \frac{1}{T} \int_0^T K |x_\infty(s, z^1, \lambda^1) - x_\infty(s, z^0, \lambda^0)| ds + \frac{1}{T} |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| \leq \\
&\leq \frac{1}{T} |z^0 - z^1| + \frac{1}{T} K \int_0^T \left\{ R + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} R \alpha_1(s) \right\} ds |z^0 - z^1| + \\
&+ \frac{1}{T} K \int_0^T \left\{ I_n + \frac{10}{9} K (I_n - Q)^{-1} \alpha_1(s) \right\} ds |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| + \frac{1}{T} |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| = \\
&= KR \left[I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right] |z^0 - z^1| + K \left(I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right) |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)| + \\
&+ \frac{1}{T} |\rho(z^0, z^1, \lambda^0, \lambda^1)|,
\end{aligned}$$

що і доводить справедливість оцінки (40).

Теорема 5. *Нехай виконуються умови Теореми 1. Крім того, нехай існують деякій номер $m \in \mathbb{N}$ і пара*

$$(\bar{z}, \bar{\lambda}) \in \Omega,$$

де множина Ω має вигляд (24), такі, що покомпонентна нерівність:

$$\begin{aligned}
|\Delta_m(\bar{z}, \bar{\lambda})| &\leq \\
&\leq \sup_{z \in D} \left\{ R \left[I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right] |z - \bar{z}| \right\} + \\
&+ \sup_{(z, \lambda) \in \Omega} \left\{ K \left[I_n + \frac{10T}{27} K (I_n - Q)^{-1} \right] |\rho(z, \bar{z}, \lambda, \bar{\lambda})| + \frac{1}{T} |\rho(z, \bar{z}, \lambda, \bar{\lambda})| \right\} + \\
&+ \frac{10T}{27} K Q^m (I_n - Q)^{-1} \delta_D(f), \tag{42}
\end{aligned}$$

не спаджується, де вектор $\delta_D(f)$ має вигляд (7) і матриці K, Q, R та вектор ρ визначені згідно з (5), (8), (33) та (34) відповідно.

Тоді не існує пари $(z^*, \lambda^*) \in \Omega$, для якої вихідна двоточкова крайова задача (1), (2) матиме розв'язок $x = x(t)$ такий, що:

$$x(0) = z^*,$$

$$x(T) = \lambda^*.$$

Доведення.

Нехай $m \in \mathbb{N}$ та $(\bar{z}, \bar{\lambda}) \in D \times \Lambda$ — довільні. Покажемо, що при зроблених припущеннях система визначальних рівнянь (16), (17) не має на множині Ω жодного розв'язку. Доведемо це від супротивного. Припустимо, що пара $(\bar{z}, \bar{\lambda})$ є розв'язком (16), (17). Згідно з Теоремою 4 розв'язок крайової задачі (1), (4) задається формулою (27). Використаємо оцінку (40), покладаючи

$$(z^0, \lambda^0) = (z^*, \lambda^*), (z^1, \lambda^1) = (\bar{z}, \bar{\lambda}),$$

Тоді з (40) випливає:

$$\begin{aligned} |\Delta(\bar{z}, \bar{\lambda})| &\leq KR \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |z^* - \bar{z}| + \\ &+ K \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |\rho(z^*, \bar{z}, \lambda^*, \bar{\lambda})| + \frac{1}{T} |\rho(z^*, \bar{z}, \lambda^*, \bar{\lambda})|. \end{aligned} \quad (43)$$

З урахуванням нерівності (21) Леми 1, матимемо:

$$\begin{aligned} |\Delta_m(\bar{z}, \bar{\lambda})| &\leq |\Delta(\bar{z}, \bar{\lambda})| + |\Delta_m(\bar{z}, \bar{\lambda}) - \Delta(\bar{z}, \bar{\lambda})| \leq \\ &\leq |\Delta(\bar{z}, \bar{\lambda})| + \frac{10T}{27} KQ^m(I_n - Q)^{-1} \delta_D(f). \end{aligned} \quad (44)$$

Поєднуючи нерівності (43) та (44), можемо записати, що:

$$\begin{aligned} |\Delta_m(\bar{z}, \bar{\lambda})| &\leq \\ &\leq R \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |z^* - \bar{z}| + \\ &+ K \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |\rho(z^*, \bar{z}, \lambda^*, \bar{\lambda})| + \frac{1}{T} |\rho(z^*, \bar{z}, \lambda^*, \bar{\lambda})| + \\ &+ \frac{10T}{27} KQ^m(I_n - Q)^{-1} \delta_D(f) \end{aligned} \quad (45)$$

або

$$\begin{aligned} |\Delta_m(\bar{z}, \bar{\lambda})| &\leq \\ &\leq \sup_{z \in D} \left\{ R \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |z - \bar{z}| \right\} + \\ &+ \sup_{(z, \lambda) \in \Omega} \left\{ K \left[I_n + \frac{10T}{27} K(I_n - Q)^{-1} \right] |\rho(z, \bar{z}, \lambda, \bar{\lambda})| + \frac{1}{T} |\rho(z, \bar{z}, \lambda, \bar{\lambda})| \right\} + \\ &+ \frac{10T}{27} KQ^m(I_n - Q)^{-1} \delta_D(f), \end{aligned}$$

тобто отримали нерівність, яка співпадає з (42). Але, за припущенням теореми, для пари $(\bar{z}, \bar{\lambda})$ покомпонентна нерівність (42) не виконується. Отримали протиріччя, яке означає, що визначальна система (16), (17) не має розв'язків на множині Ω . Тому, на основі Теореми 3, функція x_∞ , що визначена формулою (11), не є розв'язком крайової задачі (1), (4) при будь-якому виборі пари $(\bar{z}, \bar{\lambda})$ з області Ω . Тому, згідно з Теоремою 4, це означає, що нелінійна крайова задача (1), (2) не має жодного розв'язку $x(\cdot)$, для якого пари $(x(0), x(T))$ належить області Ω .

Зауваження 5. На основі Теореми 5 можемо задати алгоритм для наближеного відшукання пари (z^*, λ^*) , яка визначає розв'язок (27) вихідної крайової задачі (1), (2). Для цього представимо множину Ω вигляду (24) як об'єднання скінченості кількості підмножин:

$$\Omega := \bigcup_{i=1}^N \Omega_i = D_i \times \Lambda_i. \quad (46)$$

У кожній підмножині Ω_i з (46) вибираємо довільну точку

$$(\bar{z}^i, \bar{\lambda}^i) \in \Omega_i, \quad (47)$$

та для деякого t обчислюємо t -ве наближення $x_m(t, \bar{z}^i, \bar{\lambda}^i)$, користуючись рекурентним спiввiдношенням (10), а тодi знаходимо значення "вiзначенальнi функцiї" $\Delta_m(\bar{z}^i, \bar{\lambda}^i)$ згiдно з формулou (19). Виключаємо з мnожини (46) тi пiдмножини Ω_i , для яких нерiвнiсть не виконується.

Це обумовлюється тим, що, за Теоремою 5, вони не можуть мiстити пару (z^*, λ^*) , яка визначає розв'язок (27) крайової задачi (1), (2).

Решта пiдмножин

$$\Omega_{i_1}, \Omega_{i_2}, \dots, \Omega_{i_s}$$

утворюють деяку мnожину

$$\Omega_{m,N} = D_{m,N} \times \Lambda_{m,N} \quad (48)$$

таку, що тiльки $(\tilde{z}, \tilde{\lambda}) \in \Omega_{m,N}$ може визначити розв'язок (27).

Коли N та t прямують до ∞ , $\Omega_{m,N}$ "прямує" до мnожини

$$\Omega^* = D^* \times \Lambda^*, \quad (49)$$

яка може мiстити значення (z^*, λ^*) , що визначає розв'язок крайової задачi (1), (2) у виглядi (27).

Кожну пару $(\tilde{z}, \tilde{\lambda}) \in \Omega_{m,N}$ можна розглядати як наближення до пари (z^*, λ^*) , яка визначає розв'язок вихiдної крайової задачi (1), (2).

У цьому випадку очевидно, що

$$|\tilde{z} - z^*| \leq \sup_{z \in D_{m,N}} |\tilde{z} - z|, |\tilde{\lambda} - \lambda^*| \leq \sup_{\lambda \in \Lambda_{m,N}} |\tilde{\lambda} - \lambda|,$$

а значення функцii $x_m(t, \tilde{z}, \tilde{\lambda})$, що обчислюється згiдно з рекурсивним спiввiдношенням (10), може бути взяте в якостi наближеного розв'язку крайової задачi (1), (2).

Теорема 6. Нехай мають мiсце умови Теореми 1. Крiм того, пара (z^*, λ^*) , визначена на мnожинi (49) є розв'язком точної системи визначенних рiвнянь (16), (17), та $(\tilde{z}, \tilde{\lambda})$ – довiльна пара з мnожини $\Omega_{m,N}$ вигляду (48).

Тодi справедлива наступна оцiнка:

$$\begin{aligned} |x_\infty(t, z^*, \lambda^*) - x_m(t, \tilde{z}, \tilde{\lambda})| &\leq \\ &\leq \frac{10}{9} \alpha_1(t) Q^m (I_n - Q)^{-1} \sup_{(z, \lambda) \in \Omega_{m,N}} \delta_D(f) + \\ &+ \sup_{z \in D_{m,N}} \left[R + \frac{10}{9} K \alpha_1(t) (I_n - Q)^{-1} R \alpha_1(t) \right] |z - \tilde{z}|. \end{aligned} \quad (50)$$

Доведення. Використаємо нерівність:

$$\begin{aligned} |x_\infty(t, z^*, \lambda^*) - x_m(t, \tilde{z}, \tilde{\lambda})| &\leq |x_\infty(t, z^*, \lambda^*) - x_m(t, z^*, \lambda^*)| + \\ &+ |x_m(t, z^*, \lambda^*) - x_m(t, \tilde{z}, \tilde{\lambda})|. \end{aligned} \quad (51)$$

Оцінимо перший доданок у правій частині (51) нерівністю (14).

З використанням (38), другий доданок нерівності (51) будемо оцінювати наступним чином:

$$\begin{aligned} &|x_m(t, z^*, \lambda^*) - x_m(t, \tilde{z}, \tilde{\lambda})| \leq \\ &\leq \left[R + \frac{10}{9} K \sum_{i=1}^{m-2} Q^i R \alpha_1(t) + \frac{10}{9} K Q^{m-1} \alpha_1(t) \right] |z^* - \tilde{z}| + \\ &+ \left[I_n + \frac{10}{9} K \alpha_1(t) \sum_{i=1}^{m-2} Q^i \right] |\rho(z^*, \lambda^*, \tilde{z}, \tilde{\lambda})| \leq \\ &\leq \sup_{z \in D_{m,N}} \left[R + \frac{10}{9} K \sum_{i=1}^{m-2} Q^i R \alpha_1(t) + \frac{10}{9} K Q^{m-1} \alpha_1(t) \right] |z - \tilde{z}| + \\ &+ \sup_{(z,\lambda) \in \Omega_{m,N}} \left[I_n + \frac{10}{9} K \alpha_1(t) \sum_{i=1}^{m-2} Q^i \right] |\rho(z, \lambda, \tilde{z}, \tilde{\lambda})| \end{aligned} \quad (52)$$

Об'єднуючи (14) та (52), отримуємо оцінку (50), що й доводить теорему.

Список використаної літератури

1. Rontó M., Marynets, K. On the parametrization of boundary-value problems with three-point non-linear restrictions // Miskolc Math. Notes – 2012. – **13**, №1. – P. 91–106.
2. Rontó Miklós, Marynets Kateryna. Parametrization for non-linear problems with integral boundary conditions // Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. – 2012. – **99**. – P. 1–23.
3. Rontó Miklós, Marynets Kateryna. On parametrization for non-linear BVP with non-linear boundary conditions // Miskolc Math. Notes. – 2011. – **12**, №2. – P. 209–223.
4. Rontó M., Marinets K.. On the parametrization of boundary value problems with two-point nonlinear boundary conditions // Nelinīni Koliv. – 2011. – **14**, №3.– P. 359–391.
5. Rontó A., Rontó M. Successive approximation techniques in non-linear boundary value problems for ordinary differential equations:Handbook of differential equations: ordinary differential equations. 2008.– **8**. – P. 441–592.
6. Rontó Miklós, Varha Yana, Marynets Kateryna. Further results on the investigation of solutions of integral boundary value problems // Tatra Mountains – 2015. – **63**. – P. 247–267.
7. Marynets Kateryna. On construction of the approximate solution of the special type integral boundary-value problem // Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. – 2016. – **6**. – P. 1–14.

Одержано 20.01.2017