

Січень-червень 2005, том 6, число 1-2 (64-65)



# Українські Медичні Вісті

Науково-практичний часопис

Всеукраїнського Лікарського Товариства

## Ukrainian Medical News

The scientific & practical journal of the

## Ukrainian Medical Association

Засновано 1918 року як часопис Всеукраїнської спілки лікарів у Києві, відновлено 1997 р.

# Ювілейний VIII з'їзд ВУЛТ

(Всеукраїнського Лікарського Товариства)

Присвячений

15-річчю організації

(1990 – 2005рр.)

м. Івано-Франківськ  
21 – 22 квітня 2005 року  
Тези доповідей

КИЇВ  
2005

здійснюють за допомогою комп'ютерної системи аналізу внутрішньопорожнинного рН стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки мобільним ацидографом.

Використання даного способу можливе як у спеціалізованих гастроентерологічних відділеннях, так і в амбулаторних умовах лікарями різних спеціальностей (терапевти, сімейні лікарі).

#### **176. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ХВОРИХ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗМІРІВ ВИРАЗКИ.**

**О. С. Блага, І. В. Чопей.**

**м. Ужгород, Україна,**

**Ужгородський національний університет**

**Кафедра терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти**

Проблема пептичної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки привертає усе більшу увагу широкого кола осіб – науковців, фармацевтів, практичних лікарів, громадськості, представників системи охорони здоров'я та урядових структур різних країн і світового співтовариства у цілому. Так як одна з вирішальних ролей у етіопатогенезі пептичної виразки шлунку відводиться психоемоційним змінам, то важливого значення набуває необхідність комплексного психологічного обстеження осіб, що страждають на цю патологію.

Метою дослідження було: провести комплексне вивчення психоемоційного статусу особистості хворих на пептичну виразку шлунку, з'ясувати наявність взаємозв'язку між статтю хворих, локалізацією та розмірами виразки і психоемоційним статусом, розробити оптимальні методи виявлення прихованих психологічних розладів особистості.

У дане дослідження ми включили 45 хворих на неускладнену пептичну виразку шлунку в активній фазі віком від 20 до 61 р., з них 27 (60 %) осіб чоловічої статі та 18 (40 %) осіб жіночої статі з діагнозом, встановленим на основі комплексу клініко-діагностичних обстежень. Для виявлення психоемоційних змін та прихованих психологічних розладів ми використовували добірку анкетних тестів: опитувальник ММРІ „Міні-мульти” (скорочений варіант Міннесотського Мультифакторного Опитувальника Особистості), ООБІ (Особистісний Опитувальник Бехтеревського інституту), опитувальник Спілбергера (шкала реактивної та особистісної тривожності) та опитувальник Бека (шкала депресії).

У хворих на пептичну виразку шлунку наявні психоемоційні розлади у вигляді дистресу, в основному тривожного характеру з переважним ураженням соматичної сфери та депресивними тенденціями. Хворі жінки психічно більш чутливі та реагують у більш широкому діапазоні порівняно з чоловіками. Хворі на пептичну виразку пілоричного відділу шлунку та виразку середніх розмірів більш тривожні, вразливі, пригнічені, депресивні. У динаміці відмічено достовірне зниження рівня тривожності, депресивних тенденцій, підвищення адаптаційних можливостей особистості після проведеного курсу лікування.

#### **177. СТУПІНЬ ІМУННИХ РОЗЛАДІВ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНОМУ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ**

**Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Татарчук О.М.**

**Дніпропетровськ, Україна**

**Інститут гастроентерології АМН України**

**Мета роботи :** вивчити ступінь розладів імунної системи (ІС) у хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК).

**Матеріал та методи.** Обстежено 32 пацієнта на НВК (25 - з середнім ступенем тяжкості та 7 - з тяжким перебігом захворювання). Імунний статус хворих оцінювали за допомогою комплексу

станда  
клітин  
Земсь  
Дослід  
норма  
розлад  
Резули  
вірогі  
третьо  
ступен  
ступен  
хелпер  
**Висно**  
ефект

так і с  
на фо  
екзок  
наяв  
поруш  
мотор  
відділ  
панкр  
хвори  
цукро  
Іг фе  
до 7,  
здатн  
висів  
досто  
лакто  
при с  
грибк