

Сипуха

Tyto alba
(Scopoli, 1769)

Клас
Птахи – Aves

Ряд
Совоподібні – Strigiformes

Родина Сипухові – Tytonidae

Охоронний статус: BernC: II; CITES: II;
ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Майже вся територія Європи (крім північних і східних районів), Південна Азія, Північна та Південна Америка, Африка, Австралія [1].

Україна: Західні та центральні області, під час кочівель можлива поява в деяких інших частинах території.

Середовище існування та особливості біології. Осілий, у Європі – переважно синантропний вид. Молоді особини кочують. Селиться в антропогенному ландшафті. Гніздо – пере-



важно на маловідвідуваних горищах, дзвіницях, вежах, у щілинах будівель, серед руїн. Кладка – 4-8 матово-білих яєць, з'являється в кінці квітні; період насиджування – 30-34 дні. Пташенята покидають гніздо через 35-45 діб. Живиться сипуха дрібними гризунами і комахоїдними, птахами, земноводними.

Сучасний стан. У кінці XIX – на початку XX ст. – звичайний і широко розповсюджений вид регіону [2], у другій половині XX ст. – нечисленний вид області; постійно спостерігався у ве-

ликих містах [3]. На гніздуванні виявлена в населених пунктах у долинах карпатських річок: Латориці (Чинадієве, Свалява), Боржави (Кушниця), Тересви (Нересниця), Ужа і приток (Перечин, Турі Ремети) [4, 5, 6]. У наш час – дуже рідкісний вид, гніздування якого в регіоні не виявлено. В останні десятиліття на території Карпат сипуху спостерігали в с.Орява і Довжки Сколівського р-ні Львівської обл. [3] і в Підліснівському л-ві Карпатського НПП.

Фактори загрози. Використання отрутохімікатів, зменшення кількості гніздопридатних місць; турбування на гніздуванні; трофічна конкуренція з вухатою совою, загибель у суворі зими.

Рекомендовані заходи охорони. Виявлення та охорона місць гніздування; створення штучних гніздівель; пропаганда охорони ваду.

Джерела інформації:

1. Портенко, 1950; 2. Кистяківський, 1950; 3. Страутман, 1954. 4. Страутман, 1963; 5. Татарінов, 1973.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш
Фото: М. Еней

