

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО СКЛАДУ КРОВІ ПРИ ДІЇ МОЛИТОВ НА ПАЦІЄНТА

Лазорик М.І.

Ужгородський національний університет

РЕЗЮМЕ: вивчено динаміку і виявлено різкі зміни вмісту лейкоцитів, нейтрофілів, лімфоцитів, тромбоцитів у літрі крові та показників активності фагоцитозу і лужної фосфатази нейтрофілів у мазку та літрі капілярної та венозної крові під впливом молитов. Одержані результати захищені патентом України на винахід № 80967.

Ключові слова: клітини крові, молитва

Вступ. Вивченю впливу молитов на організм людини останнім часом приділяється певна увага.

Це питання хвилює як діячів культу (клір) та віруючих мирян, так і науковців, зокрема медиків, фізіологів та психологів.

Існують 2 полярні точки зору на молитву: 1 – молитва і релігія – це дійовий чинник і позитивно впливає на людину; 2 – молитва і релігія – це “опіум” для народу.

Відомі докази впливу молитви на хворих при клінічних спостереженнях [1], обробці спостережень передбігу захворювань у віруючих та невіруючих [16,18], за величиною аури під час молитви [5]. Але такий підхід для частини науковців, особливо тих, які сповідують 2 точку зору, є непереконливим.

Сучасна доказова медицина вимагає чітких, заснованих на достовірних статистичних результатах дослідження, доказів для оцінки явища або процесу.

Оскільки існують способи виявлення достовірного впливу на організм людини, зокрема на клітини крові, певних факторів, закріплених охоронними документами на об'єкти інтелектуальної власності [8-13], було зроблено спробу застосувати їх для вирішення цього складного питання.

Мета роботи: Поставлено завдання вивчити динаміку кількісних та якісних змін клітин крові капілярного та венозного відділів судинного русла під дією молитов у пацієнтів визначенням кількості лейкоцитів (Лц), нейтрофілів (Н), лімфоцитів (Лф), тромбоцитів (Тр) у літрі крові, показників фагоцитозу і цитохімічного дослідження лужної фосфатази нейтрофілів у мазку та у літрі крові.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося у 15 дорослих людей, які згодилися здавати кров із пальця та вени до та після читання стандартних молитов самостійно або тими особами, яким вони довіряли. Контролем служили результати обстеження 10 практично здорових осіб.

Капілярну кров забирали з пальця руки і паралельно венозну з кубітальної вени без застосування джгута для визначення кількості лейкоцитів і їх окремих форм та постановки фагоцитозу. Мазки крові брали для підрахунку лейкоцитарної формули, кількості тромбоцитів та визначення активності лужної фосфатази (ЛФ) нейтрофілів.

Кількість лейкоцитів визначали пробіковим методом, мазки фарбували за Папенгеймом-Крюковим для підрахунку лейкоцитарної формули та кількості тромбоцитів [6].

Фагоцитоз ставився за Кост і Стенко з добовою живою культурою золотистого стафілокока штам № 209 з концентрацією 1 млрд мікробних тіл у 1 мл [6].

Мазки на лужну фосфатазу нейтрофілів фарбувалися за Kaplow [17].

Результати фагоцитозу оцінювали візуально у мазку та у літрі крові за М.І. Лазориком [3, 7].

Визначали наступні показники мазка:

1. Фагоцитарний індекс (скорочене позначення ФІ) – процент активних (фагоцитуючих) нейтрофілів (1).

2. Фагоцитарне число (ФЧ) – число коків, поглинутих одним нейтрофілом (2).

Цей показник визначають діленням всіх поглинутих коків на число всіх підрахованих клітин.

Число мікробів фагоцита (ЧМФ) – число коків в одному фагоцитуючому нейтрофілі (3).

ЧМФ визначали діленням всіх поглинутих коків на число активних нейтрофілів.

Далі за запропонованими формулами визначали показники фагоцитозу в літрі крові [3, 7].

Кількість активних фагоцитів (КАФ) у літрі крові визначали за адаптованою формулою для випадків, коли лейкоцити рахують у камері Горяєва та користуються результатами підрахованої у мазку лейкоцитарної формули.

$$\text{КАФ} = \frac{\text{ЧЛ} \cdot \text{ПФ} \cdot \text{ФІ}}{100}, \quad (4)$$

де ЧЛ – число лейкоцитів у літрі крові у вигляді $\times 10^9/\text{l}$;

ПФ – процент фагоцитів з лейкоцитарної формули;

ФІ – фагоцитарний індекс – формула-показник 1.

Коли кількість лімфоцитів у літрі крові значно зростає, то фагоцити складають меншість, а ще меншою стає кількість активних фагоцитів.

Далі знаходили процент активних лейкоцитів при фагоцитозі (ПАЛ Ф), який визначає частку їх у загальній кількості. Українською мовою кажуть “відсоток”, що є перекладом слова “процент”.

способу чи препарату на пацієнта та на окремий відділ судинного русла.

Наступним етапом оцінки одержаних результатів є визначення таких показників, які дають можливість за динамікою величин показників капілярного та венозного відділів судинного русла судити про переважний вплив дій чинника на один із відділів.

Спочатку визначають величину та значення кожного показника капілярного відділу.

Для визначення абсолютної величини капілярно-некапілярної різниці АВ ККР від абсолютної величини капілярного відділу до молитов алгебраїчно віднімають абсолютної величину показника після молитов. Наприклад: ЧМФ капілярного відділу до молитов складало 21,5, після молитов – 12,2. Звідси $(21,5-12,2) = 9,3$. Отже, абсолютної величина АВ ККР ЧМФ складає 9,3, а її значення плюсово (+) і рівне +9,3.

Далі визначають процент змін капілярно-некапілярної різниці ПЗ ККР. Для з'ясування процента змін ПЗ ККР ЧМФ ділять більшу абсолютної величину порівнюваних показників на меншу абсолютної величини і множать на 100. Більша величина ЧМФ у крові до молитви, і її ділять на величину після молитви $(21,5:12,2 \times 100) = 176$. Отже, ПЗ ККР ЧМФ рівний 176%.

Значення процента змін ПЗ ККР ЧМФ визначають за значенням АВ ККР. Виходячи з того, що величина АВ ККР ЧМФ була плюсовою (+), то процент змін теж має плюсово значення і складає +176%. Це означає, що показник ЧМФ літра крові у капілярному відділі після молитов знижується на 76%. Отже, молитва викликала зниження ЧМФ на 76%.

Таким же способом визначають абсолютної величину веновенозної різниці АВ ВВР. Наприклад, величина КАФ до молитов складала $1,26 \cdot 10^9 / \text{л}$, після молитов $0,21 \cdot 10^9 / \text{л}$. Звідси $(1,26 \cdot 10^9 / \text{л} - 0,21 \cdot 10^9 / \text{л}) = 1,05 \cdot 10^9 / \text{л}$. АВ ВВР КАФ рівна $1,05 \cdot 10^9 / \text{л}$, а значення плюсово (+).

Далі визначають величини і значення ПЗ ВВР. Ділять більшу величину показника КАФ до молитов на меншу після молитов $(1,26 \cdot 10^9 / \text{л} : 1,05 \cdot 10^9 / \text{л} \times 100) = 600\%$. Величина ПЗ ВВР КАФ рівна 600%. Оскільки АВ ВВР КАФ було плюсовою, то і ПЗ ВВР КАФ теж є плюсовою і складає +600%. Це означає, що молитва викликала у венозному відділі падіння КАФ на 600%, або у 6 разів.

Запропонований комплекс показників дає можливість мінімум 4 способами оцінити об'єктивно вплив на організм того або іншого чинника.

Відомо, що при проведенні досліджень статистично значими для окремого індивідуума і достовірними вважаються зміни показників на третину (33,34%) і вище [2,15]. Ми вважаємо достовірними результати, які відрізняються на 34% і вище від вихідних, а за запропонованими показниками рівними і вищими 134%.

Аналіз одержаних результатів має яскраво виражений індивідуальний характер – він стосується окремого пацієнта, а окремі показники практично непридатні для групового аналізу (визначення середніх величин та деяких інших параметрів).

Пояснившись способом оцінки одержаних результатів, приступаємо до комплексного аналізу впливу молитов на пацієнта Ч.Я.В.

Всі результати дослідження хворого Ч.Я.В., одержані 1.02.1994р., наведені у таблиці 2.

Інтерпретація результатів.

Найбільш доцільно проводити зразу повний аналіз окремих груп показників за даними, наведеними у таблицях 1 та 2.

Кількість лейкоцитів, нейтрофілів та лімфоцитів у хворого до молитов практично не відрізняється від показників здорових осіб (табл.1) як у капілярному, так і венозному відділах.

АВ КВР лейкоцитів та лімфоцитів у хворого до молитов свідчить про наявність різниць за значенням та величиною, але процент змін ПЗ КВР є статистично недостовірний (до 123%).

В той же час показники АВ КВР Н між вмістом нейтрофілів у капілярній та венозній крові є статистично достовірним – ПЗ КВР Н +134%. Це свідчить про те, що лейкоцитів до молитов у венозній крові було на 34% менше, ніж у капілярній.

Після молитов спостерігалися зміни показників кількості лейкоцитів, нейтрофілів та лімфоцитів у літрі крові. При цьому зміна показників ПЗ КВР Лц та ПЗ КВР Лф є недостовірною, а ПЗ КВР Н складає +173%, що свідчить про різке зниження кількості нейтрофілів у венозному відділі під впливом молитви.

Молитви викликали також зміни абсолютної величин показників ККР та ВВР лейкоцитів, нейтрофілів та лімфоцитів, але вони були статистично недостовірними.

Кількісні зміни тромбоцитів у капілярному та венозному відділах хворого у порівнянні з контролем досить суттєві.

Кількість тромбоцитів у венозному відділі хворого нижча від контрольних показників, а після молитов ця різниця зникає.

ПЗ КВР Тр до молитов складає +142%, що вказує на те, що у капілярному відділі тромбоцитів більше на 42%, ніж у венозному.

Молитви викликали зростання їх вмісту у венозному відділі. ПЗ КВР Тр після молитов склав -158%, що свідчить про підвищення їх на 58%.

Динаміка показників тромбоцитів у капілярному руслі під впливом молитов була недостовірною. В той же час у венозному відділі виявлено достовірну динаміку кількості тромбоцитів під впливом молитов – ПЗ ВВР Тр -218%, що вказує на зростання їх кількості у 2 рази.

Третя група показників – показники фагоцитозу. У обстеженого частина показників фагоцитозу виявилися нижчими (ФІ, КАФ, ПАЛ Ф), а ФЧ та ЧМФ – вищими за показники контролю. Найбільш

дажливими є показники літра, бо вони більш глибоко відображають стан фагоцитозу. Саме показники літра є зниженими у хворого в обох відділах судинного русла майже у 2 рази. Зміни показників фагоцитозу найбільш вагомо відображені у значенні та величині процента змін ПЗ КВР – вони статистично значимі – від +145% (МЧ) до +173% (ФЧ).

Показник ЧМФ дещо нестандартно веде себе, що ми пояснююмо компенсацією захисту організму активними лейкоцитами при зменшенні їх кількості у судинному руслі.

Після молитов знижені показники фагоцитозу у хворого стають ще нижчими як у капілярному, так і у венозному відділах судинного русла. Така динаміка показників фагоцитозу приводить до змін капіляровенозної різниці. Після молитов показники фагоцитозу мазка та літра змінилися дуже суттєво, бо значення і процент змін КВР коливаються від +242% (ПЗ КВР ФЧ) до +433% (ПЗ КВР КАФ).

Якщо до молитви 3 показники КВР (ФЧ, ЧМФ, МЧ) мали статистично достовірну відмінність (134% і більше), то після молитов таких стало 5 із 6 і вони змінилися у 2-4 рази. Лише показник ЧМФ практично не змінився, він став навіть дещо вишим, а всі інші показники знижувалися.

Заслуговує уваги також динаміка вивчених показників фагоцитозу окремо у капілярному та окремо у венозному відділах.

ККР та ВВР за величинами та значеннями процента змін свідчать про різке зниження показників фагоцитозу після молитов як у капілярному, так і венозному відділах.

У капілярному відділі всі показники ККР мають плюсове значення і коливаються від +117% (ПЗ ККР КАФ) до +251% (ПЗ ККР ФЧ). Лише показник літра КАФ змінився недостовірно, інші показники літра знизилися від 1,5 разу (ПАЛ Ф) більш як у 2 рази (МЧ).

Таке різке зниження величин показників фагоцитозу в капілярному відділі судинного русла описане нами при вивчені фагоцитозу під час акупунктури і одержало називу лабораторної акупунктурної кризи [9].

Наявність акупунктурної лабораторної кризи дала можливість прогнозувати позитивний ефект від акупунктури [9, 10].

Одержані результати дають підставу зробити висновок, що у хворого Ч.Я.В. молитва викликала ефект, який нагадує лабораторну акупунктурну кризу. Ці зміни названо лабораторною кризою капілярного відділу судинного русла при дії молитов.

У венозному відділі судинного русла зміни показників ПЗ ВВР Лц, ПЗ ВВР Н, ПЗ ВВР Лф, ПЗ ВВР ЧМФ були недостовірними.

Всі інші показники фагоцитозу в мазку та літрі крові зазнали глибоких змін – всі вони знизилися. При цьому величини та значення процента змін ПЗ

ВВР коливаються від +387% (ФЧ) до +600% (КАФ) – більше ніж у 3-6 разів.

Явище максимальних змін у венозній крові у порівнянні зі змінами у капілярній крові описано нами при вивчені впливу мінеральних ванн. Особливо це мало місце при дії слабомінералізованих кремністих ванн [7].

Такі різкі зміни вивчених показників фагоцитозу у венозному відділі судинного русла нагадують описані вище зміни у капілярному відділі судинного русла при акупунктурі і названі лабораторною акупунктурною кризою. За аналогією є підстави назвати описаний феномен лабораторною кризою венозного відділу судинного русла при дії молитов.

Це дас підставу констатувати, що на молитву кров із венозного відділу судинного русла хворого прореагувала значно інтенсивніше, ніж кров з капілярного відділу.

Одержані результати обстеження хворого Ч.Я.В. дають підставу віднести молитву до так званих слабких чинників, які викликають значний фізіологічний та клінічний ефект.

Наявність лабораторної акупунктурної кризи дала підставу прогнозувати позитивний ефект від лікування [9]. Це давало підстави прогнозувати позитивний ефект від лікування у хворого Ч.В.Я.

Над хворим було прочитано 5 молитов, але від взяття крові під час 2-5 молитов він відмовився.

Катаанамез. Через 1,5 року стан хворого кращий. Він не лікувався стаціонарно жодного разу. Відмічено також позитивну динаміку рентгенологічних змін.

Висновок: у хворого Ч.В.Я. з післятравматичним остеоміелітом правої стегнової кістки проведено обстеження крові з капілярного та венозного відділів судинного русла з визначенням кількості лейкоцитів, тромбоцитів та показників фагоцитозу мазка та літра крові як у капілярному, так і у венозному відділах судинного русла.

Молитви викликали негайні і достовірні зміни вивчених показників кількості лейкоцитів, нейтрофілів, лімфоцитів, тромбоцитів і показників фагоцитозу мазка та літра крові як у капілярному, так і у венозному відділах судинного русла.

Наводимо виписку з документації ще одного пацієнта.

Приклад 2. Чоловік Л., 59 років з остеохондрозом хребта без виражених суб'єктивних клінічних проявів та постінфекційним гепатитом із мінімальними проявами згодився брати участь у обстеженні за умови, що він буде сам читати комплекс молитов протягом 5-7 хвилин. Пацієнт є віруочим і регулярно молиться.

Кров із пальця та вени була взята до молитов та після їх закінчення. Визначалися 3 групи показників:

1) кількість лейкоцитів, нейтрофілів та лімфоцитів;

2) показники фагоцитозу за описаною вище методикою;

3) лужна фосфатаза шлізгомібін в лейтрофілах.

Бралися мазки для визначення лейкоцитарної формулі та лужної фосфатази.

Результати обстеження та вимірювані показники наведені у табл. 3.

Інтерпретація результатів дослідження крові пацієнта Л.

Як видно з табл. 3 та табл. 1, величини вимірюваних показників кількості лейкоцитів, лейтрофілів та лімфоцитів і показників фагоцитозу пакієнта до молитов суттєво не відрізнялися від відповідних величин контрольної групи осіб. Показники ЛФ пакієнта були дещо вищими від величин контрольної групи, особливо не стосується ОК ЛФ та ПАК ЛФ. Величини більшості показників зенозного відділу були дещо вищими за величини капілярного відділу.

Після молитов вимірювані показники змінилися. При цьому вони всі без винятку стали нижчими від відповідних показників до молитов як у капілярному, так і у зенозному відділах. У зв'язку з цим змінилися величини та значення КВР. Але статистично достовірно (більше 34%) змінилися показники ПЗ КВР лімфоцитів (-169%), ПЗ КВР КАФ (+135%), ПЗ КВР МЧ (+140%), ПЗ КВР ПАК ЛФ (-137%).

Молитви викликали статистично достовірне зниження величин та значень ПЗ ККР лімфоцитів (+150%), ПЗ ККР ФЧ, ПЗ ККР КАФ, ПЗ ККР МЧ (від +134% до +141%) у капілярному відділі.

Вартими уваги є різні зміни показників ККР ЛФ як у мазку, так і у літрі крові капілярного відділу. Вони знишилися у 1,5-2 рази (від +146% до +204%).

У зенозному відділі молитви викликали також суттєві зміни. Практично у 1,5 разу знишилися показники кількості лейкоцитів та лейтрофілів, а величини та значення ПЗ ВВР показників КАФ, МЧ, ПАЛ Ф, САЕ ЛФ та ПАЛ ЛФ знишилися від +144% до +221%.

Зниження величин показників у капілярній крові у пакієнта вкладаються в лабораторну акупунктурну кризу [9] і підтверджують обґрутованість щодо назви цих змін – лабораторна криза капілярного відділу судинного русла від молитов.

Зміни показників у зенозній крові відповідають вказаним вище змінам у хворого Ч.Я.В. і дають підставу назвати їх лабораторною кризою зенозного відділу судинного русла від молитов.

Висновок: у пакієнта Л. з остеохондрозом хребта без виражених клінічних проявів та постінфекційним гепатитом з мінімальними проявами комплексу молитов, прочитаних самим пакієнтом, викликав достовірні зміни вивчених показників кількості лейкоцитів, лейтрофілів, лімфоцитів, показників фагоцитозу та активності лужної фосфатази

у мазках та у літрі крові як у капілярному, так і у зенозному відділах судинного русла. Виявлені зміни показників КВР, ККР та ВВР їх величин та значень як до молитов, так і після них. Одержані результати свідчать про суттєвий вплив молитов, які читає сам пакієнт, на організм людини, зокрема на показники кількісно-функціональних властивостей клітин крові різних відділів судинного русла.

Наведені результати обстеженнях осіб у табл. 1 та 3 дають можливість порівняти їх і пояснити виявлені особливості.

При порівнянні виявлених змін хворого Ч.Я.В. та пакієнта Л. звертає на себе увагу більш виражене зниження 5 із 6 показників фагоцитозу у зенозній крові (у 3,8-6 разів) хворого Ч.Я.В. У пакієнта Л. лише КАФ і МЧ знишилися більш ніж у 2 рази. Це частково можна пояснити наявністю виражено-го запального процесу у кістках після травми у Ч.Я.В.

Слід також врахувати, що на результати дослідження могли вплинути щоденні молитви та регулярне відвідування богослужінь пакієнтом Л. Хворий Ч.Я.В. є віруючим, але молитвам приділяє менше уваги.

Обстеження та аналіз результатів інших 13 пакієнтів проводилися за наведеними вище схемами. Одержані результати у обстеженях виявили такі ж тенденції змін вивчених показників із різним ступенем вираженості. Зміни виявлені у всіх обстеженях. Достовірними були результати у 13 осіб. У 2 осіб зміни виявлені, але показники не змінювалися більш ніж на 134%, тому їх результати вважалися недостовірними. Пошуків причин не проводилося, бо це могло викликати певні труднощі психологічного плану.

Проведені дослідження дають можливість позитивно оцінити запропоновані тести для оцінки впливу молитов на кількість та функціональні властивості клітин капілярного та зенозного відділів судинного русла.

Чим більше показників змінюються і чим вищий процент змін, тим вплив молитов більш виражений. У першу чергу перевагу надають показникам літра крові, а при їх рівності (нульова різниця) враховують зміни показників мазка.

Одержані результати обстеження доцільно представляти у вигляді таблиць. Тоді аналіз результатів обстеження є простішим.

Одержані результати свідчать, що запропонований спосіб визначення впливу молитов на пакієнта є придатним для проведення наукових досліджень та практичного використання і дає можливість оцінити вплив молитов на людину.

Запропонований спосіб оцінки впливу молитов на організм людини захищений патентом України № 80967.

Таблиця 1

Відділ	Показники				Показники контрольної групи обстежених			
	Капілярний		Венозний		X	±m	X	±m
Лейкоц. $\times 10^9/\text{л}$	6,5							
Нейтр. $\times 10^9/\text{л}$	4,29		0,59		7,06		0,6	
Лімфоц. $\times 10^9/\text{л}$	1,56		0,44		4,41		0,4	
Тромбоц. $\times 10^9/\text{л}$	286		0,3		1,81		0,29	
Фагоц.: ФІ	71,0		21		305		23	
ФЧ	3,71		3,83		69,4		3,81	
ЧМФ	5,06		0,51		3,97		0,49	
КАФ $\times 10^9/\text{л}$	3,65		0,39		5,59		0,49	
МЧх $\times 10^9/\text{л}$	19,19		0,49		3,92		0,49	
ПАЛ Ф $\times 10^9/\text{л}$	52,3		3,58		22,45		3,93	
ОК ЛФ	46,6		3,45		55,3		3,83	
ПАК ЛФ	34,8		5,32		56,6		9,72	
КАЕ ЛФ $\times 10^9/\text{л}$	1,92		4,79		37,8		6,76	
САЕ ЛФ $\times 10^9/\text{л}$	2,58		0,32		1,93		0,43	
ПАЛ ЛФ	26,32		0,39		3,13		0,75	
			3,51		27,97		5,17	

Таблиця 2

Результати обстеження Ч.Я.В.

Відділ	K	B	K	B	КВР		КВР		KKP		BVR	
	До		Після		До		Після					
	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	ПЗ	абс.	ПЗ	абс.	ПЗ	абс.	ПЗ
Лейкоц. $\times 10^9/\text{л}$	6,2	6,0	6,6	5,0	0,2	103	1,4	132	-0,4	-105	1	120
Нейтр. $\times 10^9/\text{л}$	4,29	3,2	4,41	2,55	1,09	134	2,16	173	-0,12	-103	0,65	126
Лімфоц. $\times 10^9/\text{л}$	1,56	1,92	1,81	2,25	-0,36	-123	-0,44	-124	-0,25	-116	-0,33	-117
Тромбоц. $\times 10^9/\text{л}$	234	165	228	360	69	142	-132	-158	6	103	-195	-218
Фагоц.: ФІ	30,0	33,0	21,0	8,0	-3,0	-110	13,0	263	9	143	25	413
ФЧ	6,44	4,1	2,56	1,06	2,43	157	1,5	242	3,88	251	3,04	387
ЧМФ	21,5	12,4	12,2	13,3	9,1	173	-1,1	-109	9,3	176	-0,9	-107
АФ х1												
КАФ $\times 10^9/\text{л}$	1,07	1,26	0,91	0,21	-0,19	-118	0,7	433	0,16	117	1,05	600
МЧх $\times 10^9/\text{л}$	22,8	15,7	11,2	2,81	7,1	145	8,39	398	11,6	204	12,89	559
ПАЛ Ф $\times 10^9/\text{л}$	20,4	21,1	13,8	4,24	-0,7	-103	9,56	326	6,6	148	16,86	498

Таблиця 3

Результати обстеження пацієнта Л.

Відділ	K	B	K	B	КВР		КВР		KKP		BVR	
	До		Після		До		Після					
	абс.	абс.	абс.	абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Лейкоц. $\times 10^9/\text{л}$	6,25	7,4	5,46	4,9	-1,15	-118	0,56	111	0,79	114	2,5	151
Нейтр. $\times 10^9/\text{л}$	4,25	4,34	3,83	2,89	-0,09	-102	0,94	133	0,42	111	1,45	150
Лімфоц. $\times 10^9/\text{л}$	1,69	1,84	1,13	1,91	-0,15	-109	-0,78	-169	0,56	150	-0,07	-104
Фагоц.: ФІ	76,0	78,0	59,0	63,0	-2	-103	-4	-107	17	129	15	124
ФЧ	4,77	4,64	3,5	3,6	0,13	103	-0,1	-103	1,17	136	1,04	129
ЧМФ	6,28	5,99	5,93	5,71	0,29	105	0,22	104	0,35	106	0,28	105
КАФ $\times 10^9/\text{л}$	3,28	3,85	2,45	1,82	-0,57	-117	1,17	135	0,83	134	2,03	212
МЧх $\times 10^9/\text{л}$	20,57	23,03	14,55	10,41	-2,46	112	4,14	140	6,02	141	10,41	221
ПАЛ Ф $\times 10^9/\text{л}$	52,4	52,3	45,4	37,2	0,1	100,2	8,2	122	7,0	115	15,1	141
ОК ЛФ	92	75	47	60	17	123	-17	-128	45	198	15	125
ПАК ЛФ	44	47	27	37	-3	-107	-10	-137	17	163	10	127
КАЕ ЛФ $\times 10^9/\text{л}$	1,9	2,32	1,12	1,07	-0,42	-122	0,05	105	0,78	178	0,05	105
САЕ ЛФ $\times 10^9/\text{л}$	3,97	3,7	1,95	1,78	0,27	107	0,17	110	2,02	204	1,92	208
ПАЛ ЛФ	30,4	31,5	20,8	21,8	-1,1	-104	-1,0	-105	9,6	146	9,7	144

Висновки.

1. Запропоновано і практично застосовано новий спосіб для визначення впливу молитов на пацієнта паралельним дослідженням клітин у мазку та у літрі крові капілярного та венозного відділів судинного русла, захищений патентом України на винахід.

2. Описано феномени лабораторної кризи впливом молитов у капілярному та венозному відділах судинного русла.
3. Молитва є дійовим чинником, який впливає на організм людини, зокрема на показники клітинного складу капілярного та венозного відділів судинного русла.

ЛІТЕРАТУРА

1. Святе письмо Старого та нового завіту. – Рим-Торонто: Видавництво О.О.Василіян, 1991. – 352 с.
2. Каминский А.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных. Применение статистики в науке и практической работе врача. – М.: "Медицина", 1964. – 251 с.
3. Лазорик М.И. Показатели фагоцитоза в международной системе единиц // Лабор. дело. –1984. – №3. – С. 78.
4. Лазорик М.И. Оценка цитохимических реакций форменных элементов крови // Лабор. дело. –1988. №1. – С.64-65.
5. Лазорик М.І., Павлуцький Р.В., Олашин В.В. Механізм оздоровчої дії біоенергетики молитов та літургії// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина, вип. 4. – Ужгород, 1997. – С. 113-122.
6. Кост Е.А. Справочник по клініческим лабораторним методам исследования. – М., 1975. – 383 с.
7. Лазорик М. Метод кількісної оцінки стану крові при бальнео- і рефлексотерапії та медикаментозному лікуванні. – Ужгород: Політика "Карпатського краю", 1998. – 267с.
8. А.с. US № 1681257. МКІ³ G01N33/53 Способ определения активности фагоцитоза лейкоцитов в сосудистом русле. Заявка №4446317//14. Подано 21.06.1988. Опубл. 30.09.1991. Бюл. № 36. Автор Лазорик М.И.
9. П. UA. № 15554. МПК⁴ A61H39/00. Способ прогнозування ефективності рефлексотерапії за Лазариком. A61H39/00. Заявка №96240238SU, № 96240238 UA. Подано 01.10.1993. Опубл.30.06.1997 Бюл.№ 3. Автори Лазорик М.І., Марфинець В.В.
10. П. UA. № 18517. Способ визначення мінімальної кількості сеансів рефлексотерапії. МПК⁴ A61H39/00. Заявка №4905937 SU, № 95321281 UA. Подано 29.09.93. Опубл. 25.12.1997. Бюл.№6. Автори Лазорик М.І., Марфинець В.В., Гайденко В.С.
11. П. UA. № 23082. Способ визначення функціонального стану клітин в судинному руслі МПК⁴ G01N33/48. Заявка № 94107290. Подано 18.10.94. Опубл. 30.06.1998. Бюл. № 3. Автор Лазорик М.І.
12. П. UA. № 22932. Способ визначення наявності, характеру та інтенсивності впливу чинника на активність фагоцитозу лейкоцитів судинного русла. МПК⁴ G01N33/48. Заявка №94063357. Подано 03.06.94. Опубл. 05.05.1998. Бюл. № 3. Автори Лазорик М.І., Чачанідзе Д.З., Самосюк І.З.
13. П. UA. № 40681 Способ визначення впливу лікування на формені елементи крові. МПК⁵ A61B5/145, G01N33/49. Заявка №94043454. Подано 29.04.1994. Опубл.15.08.2001. Бюл.№ 7, 2001. Автори Лазорик М.І., Чачанідзе Д.З., Чава гра М.І.
14. П. UA. №80967. МПК⁶ G01N33/48. Способ Лазорика для визначення впливу молитов на пацієнта. Заявка №20041008474. Подано 18.10.2004. Опубл. 26.11.2007. Бюл.№19. Автор Лазорик М.І.
15. Сепетлиев Д. Статистические методы исследований в научных медицинских исследованиях. -М.: Медицина, 1968. – 419 с.
16. Claudia Wallis. Healing A growing and surprising body scientific evidence said they can. //Time.-1996.-June 24.
17. Kaplow L.S // Blood. – 1955. – Vol.10. – P.1023-1029.
18. Marti Kaplan. Ambushed by spirituality//Time.-1996.-June 24.

SUMMARY

THE DYNAMICS OF THE INDICATORS OF THE CELLULAR COMPOSITION OF BLOOD UNDER THE INFLUENCE OF PRAYERS ON THE PATIENT
Lazoryk M.I.

The dynamics has been investigated and sharp iv the contents of leukocytes, neutrophils, lymphocytes and thrombocytes per litre of blood have been revealed as well as distinctive changes of activity indicators of phagocytosis and alkaline phosphatase of neutrophils in the blood smear and litre of capillary and venous blood have been discovered under the influence of prayers. The results obtained are protected by the patent for invention of UA № 80967.

Key words: blood cells, prayer