

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Фізичний факультет  
Кафедра теоретичної фізики

**В.В. Рубіш**

**КРАТНІ, КРИВОЛІНІЙНІ  
ТА ПОВЕРХНЕВІ ІНТЕГРАЛИ.  
ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ**

Методичні вказівки з вищої математики

УЖГОРОД–2015

**Рубіш В.В.** Методичні вказівки з вищої математики: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Їх обчислення та застосування – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015. – 42 с.

**Рецензенти:** Гайсак М.І. – доктор фізико-математичних наук, професор, Карбованець М.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

**Автори:** кандидат фізико-математичних наук, доцент Рубіш Василь Васильович

Затверджено і рекомендовано на засіданні кафедри теоретичної фізики УжНУ 24 травня 2011 року, протокол № 5.

Схвалено на засіданні науково-методичної ради фізичного факультету УжНУ чч ммммммм 2010 року, протокол №X.

Конспект лекцій містить короткі відомості з лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, вступу до математичного аналізу та диференціального числення.

## ЗМІСТ

<b>1. КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ</b>	<b>5</b>
1.1. Подвійні інтеграли . . . . .	5
1.1.1. Означення подвійного інтеграла та умови його існування	5
1.1.2. Властивості подвійних інтегралів . . . . .	6
1.1.3. Обчислення подвійного інтеграла . . . . .	7
1.1.4. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Подвійний інтеграл у полярних координатах . . . . .	18
1.1.5. Застосування подвійного інтеграла до розв'язання задач геометрії і механіки . . . . .	24
1.2. Потрійні інтеграли . . . . .	33
1.2.1. Поняття і умови існування потрійного інтеграла. Його геометричний та механічний зміст . . . . .	33
1.2.2. Властивості потрійних інтегралів . . . . .	35
1.2.3. Обчислення потрійного інтеграла в декартових координатах . . . . .	36
1.2.4. Заміна змінної в потрійному інтегралі . . . . .	40
<b>РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА</b> . . . . .	<b>42</b>

## ПЕРЕДМОВА

Конспект лекцій містить короткі теоретичні відомості з традиційних розділів вищої математики (лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, вступу до математичного аналізу та диференціального числення функції однієї змінної), передбачених типовою навчальною програмою Міністерства освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Конспект лекцій може бути використаний в якості довідкового матеріалу з вищої математики студентами як очної, так і заочної форми навчання.

# 1. КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ

## 1.1. Подвійні інтеграли

### 1.1.1. Означення подвійного інтеграла та умови його існування

Нехай в обмеженій і замкненій області  $D$  на координатній площині  $Oxy$  задано неперервну функцію  $z = f(x, y)$ . Розіб'ємо область  $D$  довільним чином на  $n$  частин  $D_1, D_2, \dots, D_n$ , які не мають спільних внутрішніх точок і площі яких відповідно рівні  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ . Діаметром  $d(D_i)$  області  $D_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) назвемо довжину найбільшої з хорд, що з'єднує довільні дві точки її межі. Позначимо через  $\lambda$  найбільший з діаметрів областей  $D_i$ :  $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d(D_i)$ .

У кожній з областей  $D_i$  (усередині чи на її межі) виберемо довільну точку  $P_i(\xi_i, \eta_i)$  (див. рис. 1.1) і помножимо значення функції  $z = f(P) = f(\xi, \eta)$  в точці  $P_i$  на  $\Delta S_i$ :  $f(P_i)\Delta S_i = f(\xi_i, \eta_i)\Delta S_i$ . Далі із всіх таких добутків складемо суму:

$$\sum_{i=1}^n f(P_i)\Delta S_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta S_i, \quad (1.1)$$

яка називається **інтегральною сумою** для функції  $z = f(x, y)$  в області  $D$ .

**Означення 1.1.** Якщо інтегральна сума (1.1) при  $\lambda \rightarrow 0$  має скінченну границю, яка не залежить ні від способу розбиття області  $D$  на частини  $D_i$ , ні від вибору точок  $P_i$  в них, то ця границя називається **подвійним інтегралом від функції  $f(x, y)$  по області  $D$**  і позначається:

$$\iint_D f(x, y) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta S_i, \quad (1.2)$$

де  $f(x, y)$  називається **підінтегральною функцією**,  $D$  – **областю інтегрування**, а  $dS$  – **диференціалом площі**.

У прямокутній системі координат диференціал площі  $dS$  дорівнює:  $dS = dxdy$ ; тоді подвійний інтеграл можна записати у вигляді

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_D f(x, y) dxdy.$$




Рис. 1.1. Розбиття області інтегрування  $D$  на частини  $D_i$

**Теорема 1.1** (про існування подвійного інтеграла). Якщо функція  $f(x, y)$  неперервна в обмеженій замкненій області  $D$ , то існує подвійний інтеграл  $\iint_D f(x, y) dS$ , тобто існує границя (1.2) інтегральної суми (1.1), яка не залежить ні від розбиття області  $D$  на частини  $D_i$ , ні від вибору точок  $P_i$  в них.

**Геометричний зміст подвійного інтеграла.** Подібно до того, як звичайний інтеграл від невід'ємної функції однієї змінної  $f(x)$  визначає площу фігури, обмеженої зверху її графіком, так подвійний інтеграл від невід'ємної функції  $f(x, y) \geq 0$  по області  $D$  дорівнює об'єму циліндричного тіла, обмеженого зверху поверхнею  $z = f(x, y)$ , знизу – замкненою обмеженою областю  $D$  площини  $Oxy$ , з боків – циліндричною поверхнею, напрямна якої збігається з межею області  $D$ , а твірні паралельні осі  $Oz$ :

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy. \quad (1.3)$$

Якщо у формулі (1.3) покласти  $f(x, y) \equiv 1, \forall (x, y) \in D$ , то одержимо формулу для обчислення площі  $S$  замкнутої і обмеженої області  $D$ :

$$S = \iint_D dx dy. \quad (1.4)$$

### 1.1.2. Властивості подвійних інтегралів

Сформулюємо основні властивості подвійних інтегралів.

1. Сталий множник можна виносити за знак подвійного інтеграла:

$$\iint_D C f(x, y) dx dy = C \iint_D f(x, y) dx dy, \quad C = \text{const}. \quad (1.5)$$

2. Якщо в області  $D$  функції  $f(x, y), g(x, y)$  інтегровні, то інтегровними є і функції  $f(x, y) \pm g(x, y)$ , причому

$$\iint_D (f(x, y) \pm g(x, y)) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy \pm \iint_D g(x, y) dx dy. \quad (1.6)$$

3. Якщо для інтегровних в  $D$  функцій виконується нерівність  $f(x, y) \leq g(x, y)$ , то

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy. \quad (1.7)$$

4. Якщо  $f(x, y)$  інтегровна в  $D$ , то інтегровою є і  $|f(x, y)|$ , причому

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy. \quad (1.8)$$

5. (Адитивність подвійного інтеграла.) Якщо область  $D$ , в якій задана функція  $f(x, y)$ , поділена на дві підобласті  $D_1, D_2$ , що не мають спільних внутрішніх точок, то з інтегровності функції  $f(x, y)$  у всій області випливає її інтегрованість у підобластях, і навпаки – з інтегровності функцій у підобластях  $D_1, D_2$  випливає інтегровність у  $D$ . Тоді

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy. \quad (1.9)$$

Ця властивість справедлива для довільного скінченного числа областей, що складають область  $D$  і не мають спільних внутрішніх точок.

6. (Оцінка подвійного інтеграла.) Нехай  $m$  і  $M$  – найменше і найбільше значення функції  $f(x, y)$  в області  $D$ ,  $S$  – площа цієї області. Тоді

$$m S \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq M S. \quad (1.10)$$

**Теорема 1.2** (про середнє значення функції). *Якщо функція  $f(x, y)$  неперервна в замкненій обмеженій області  $D$ , яка має площу  $S$ , то в цій області існує точка  $P(x_0, y_0)$ , що*

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(P) S.$$

Величину

$$f(P) = \frac{1}{S} \iint_D f(x, y) dx dy \quad (1.11)$$

називають **середнім значенням функції  $f(x, y)$**  в області  $D$ .

### 1.1.3. Обчислення подвійного інтеграла

При обчисленні подвійного інтеграла спочатку треба з'ясувати в напрямку якої координатної осі область  $D$  є правильною.

**Означення 1.2.** Область  $D$  називається **правильною** в напрямі осі  $Oy$  (осі  $Ox$ ), якщо довільна пряма, яка проходить через внутрішню точку області  $D$  паралельно осі  $Oy$  (осі  $Ox$ ), перетинає межу області не більше, ніж у двох точках.

Розглянемо типові випадки.

1. Область інтегрування  $D$  обмежена зліва і справа прямими  $x = a$  і  $x = b$  ( $a < b$ ), а з низу і зверху неперервними кривими  $y = \varphi_1(x)$  і  $y = \varphi_2(x)$  ( $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ ), кожна з яких перетинається з прямою  $x = X = \text{const}$  ( $a < X < b$ ) лише один раз. Визначена таким чином область  $D$  є правильною вздовж осі  $Oy$  (див. рис. 1.2 а), коротко будемо її позначати так:  $D = \{\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$ . Тоді подвійний інтеграл обчислюється за формулою

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad (1.12)$$

Праву частину формули (1.12) називають **повторним інтегралом** від функції  $f(x, y)$  по області  $D$ . Інтеграл за змінною  $y$  називають **внутрішнім**, а за змінною  $x$  – **зовнішнім**.




Рис. 1.2. а) Область  $D$  правильна в напрямку осі  $Oy$ ; б) область  $D$  правильна в напрямку осі  $Ox$ .  $M_1$  – точка входу,  $M_2$  – точка виходу з області

Для обчислення повторного інтеграла потрібно спочатку обчислити визначений інтеграл  $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$ , вважаючи  $x$  сталою. Нижньою межею інтегрування є ордината точки входу  $M_1$ :  $y_{\text{вх}} = \varphi_1(x)$ , а верхньою межею інтегрування є ордината точки виходу  $M_2$ :  $y_{\text{вих}} = \varphi_2(x)$ , які відповідають даному фіксованому значенню  $x$ . Результат обчислення цього інтеграла буде функцією тільки від  $x$ . Інтегруючи тепер цю функцію в межах від  $a$  до  $b$ , одержимо значення подвійного інтеграла.

2. Якщо область  $D$  визначена нерівностями  $c \leq y \leq d$ ,  $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$  (визначена таким чином область є правильною вздовж осі  $Ox$  (див. рис. 1.2 б), позначатимемо її  $D = \{\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$ ), причому кожна із неперервних кривих  $x = \psi_1(y)$  і  $x = \psi_2(y)$  перетинаються з горизонталлю



$y = Y = \text{const}$  ( $c < Y < d$ ) тільки в одній точці, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx, \quad (1.13)$$

де при обчисленні інтегралу  $\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$  величину  $y$  вважають сталою.

**Зауваження 1.** Якщо область  $D$  не є правильною ні в напрямку  $Ox$ , ні в напрямку  $Oy$ , то її розбивають на кілька правильних областей  $D_1, D_2, \dots, D_n$ , обчислюють подвійні інтеграли по кожній з цих областей або за формулою (1.12) або (1.13), а потім на основі властивості адитивності подвійного інтеграла підсумовують результати.

**Зауваження 2.** Якщо область інтегрування  $D$  є правильною як в напрямку осі  $Oy$ , так і  $Ox$ , то подвійний інтеграл можна обчислювати як за формулою (1.12), так і за формулою (1.13). Результат буде однаковим.

**Зауваження 3.** Якщо область  $D$  – прямокутник із сторонами, паралельними координатним осям, обмежений прямими  $x = a, x = b, y = c, y = d$  (див. рис. 1.3 а), то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx, \quad (1.14)$$

крім того, якщо підінтегральна функція має вигляд  $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ , то подвійний інтеграл може бути зведений до вигляду

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f_1(x) \cdot f_2(y) dy = \int_a^b f_1(x) dx \int_c^d f_2(y) dy. \quad (1.15)$$

**Зауваження 4.** Під час обчислення подвійного інтеграла (1.12) може статися так, що хоча б одна з функцій  $y = \varphi_1(x), y = \varphi_2(x)$  не може бути задана одним аналітичним виразом на усьому інтервалі  $x \in [a, b]$ . (Кажуть, що область не є простою в напрямку осі  $Oy$ ). Нехай, наприклад,

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \in [a, c], \\ g_2(x), & x \in [c, b], \end{cases}$$

де  $g_1(x), g_2(x)$  – інтегровні на відповідних відрізках функції;  $c$  – точка спряження (див. рис. 1.3 б). Тоді прямою  $x = c$ , що проходить через точку спряження, область  $D$  може бути поділена на дві прості в напрямку  $Oy$  підобласті  $D_1$  та  $D_2$ , причому  $D_1 = \{g_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq c\}$ , а




Рис. 1.3. а) Область інтегрування – прямокутник; б) – область, що не є простою в напрямку  $Oy$

$D_2 = \{g_2(x) \leq y \leq \varphi_2(x), c \leq x \leq b\}$ . Тоді згідно з властивістю адитивності подвійного інтеграла матимемо

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \\ &= \int_a^c dx \int_{g_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy + \int_c^b dx \int_{g_2(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \end{aligned} \quad (1.16)$$

### Алгоритм знаходження подвійного інтеграла.

1. Зображуємо криві, що обмежують область  $D$ , та заштрихуємо її.
2. Аналізуємо вигляд області  $D$  та вибираємо оптимальну послідовність інтегрування. Якщо область  $D$  проста у напрямку осі  $Oy$ , то внутрішній інтеграл беремо за змінною  $y$ , а зовнішній – за  $x$ , і навпаки – якщо область  $D$  проста у напрямку осі  $Ox$ , то внутрішнє інтегрування слід виконувати за змінною  $x$ , а зовнішнє – за  $y$ . Якщо область інтегрування не є простою в жодному напрямку, то її ділять на декілька простих в одному напрямку підобластей.
3. Встановлюємо межі інтегрування: спочатку для зовнішнього інтеграла, потім – для внутрішнього. Якщо зовнішнє інтегрування виконується за змінною  $x$  (див. рис. 1.2 а), то область проєктують на вісь  $Ox$ , отримуючи деякий відрізок  $[a, b]$ , кінці якого  $a$  та  $b$  є відповідно нижньою та верхньою межами зовнішнього інтеграла (межі зовнішнього інтеграла завжди сталі). Для знаходження меж внутрішнього інтеграла за змінною  $y$  визначаємо  $y = \varphi_1(x)$  та  $y = \varphi_2(x)$  з рівняння ліній, що обмежують область знизу та зверху. Аналогічно знаходимо інтеграл, якщо

зовнішнє інтегрування здійснюється за змінною  $y$  (область проста в напрямку  $Ox$ , рис. 1.2б). Тоді область проектуємо на вісь  $Oy$  і одержуємо межі зовнішнього інтеграла; щоб знайти межі внутрішнього інтеграла за змінною  $x$  виражають  $x = \psi_1(y)$  та  $x = \psi_2(y)$  з рівняння ліній, що обмежують область  $D$  ліворуч і праворуч.

4. Знаходимо повторний інтеграл. Спочатку обчислюємо внутрішній інтеграл за формулою Ньютона–Лейбніца (змінну зовнішнього інтеграла вважаємо сталою), а далі одержаний вираз інтегруємо за зовнішньою змінною.

**Приклад 1.1.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ , якщо областю інтегрування  $D$  є трикутник, обмежений прямими  $y = 0$ ,  $x = 2$ ,  $y = \frac{x}{2}$  (див. рис. 1.4).

*Розв'язок*




Рис. 1.4

Якщо для обчислення подвійного інтеграла скористатися формулою (1.12), то тут  $y_{вх} = \varphi_1(x) = 0$ ,  $y_{вих} = \varphi_2(x) = \frac{x}{2}$  (оскільки точка входу лежить на осі  $Ox$ , а точка виходу – на прямій  $y = \frac{x}{2}$ );  $a = 0$ ,  $b = 2$ .

Тому, застосовуючи формулу (1.12), маємо

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (x^2 + y^2) dy.$$

Обчислимо внутрішній інтеграл, в якому вважаємо  $x$  сталою:

$$\int_0^{\frac{x}{2}} (x^2 + y^2) dy = \left( x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{\frac{x}{2}} = x^2 \cdot \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \left( \frac{x}{2} \right)^3 = \frac{13}{24} x^3.$$

Відповідно,

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^2 \frac{13}{24} x^3 dx = \frac{13}{24} \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{13}{6}.$$

Використаємо тепер для обчислення подвійного інтеграла  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  формулу (1.13). Враховуючи, що в цьому випадку  $x_{\text{вх}} = \psi_1(y) = 2y$ ,  $x_{\text{вих}} = \psi_2(y) = 2$  (оскільки точка входу лежить на прямій  $y = \frac{x}{2}$  або  $x = 2y$ , а точка виходу на прямій  $x = 2$ ),  $c = 0$ ,  $d = 1$  ( $d$  – це ордината точки перетину прямих  $y = \frac{x}{2}$ ,  $x = 2$ , див. рис. 1.4), одержимо

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_{2y}^2 (x^2 + y^2) dx.$$

Так як

$$\begin{aligned} \int_{2y}^2 (x^2 + y^2) dx &= \left( \frac{x^3}{3} + y^2 x \right) \Big|_{2y}^2 = \left( \frac{8}{3} + 2y^2 \right) - \left( \frac{8y^3}{3} + 2y^3 \right) = \\ &= \frac{8}{3} + 2y^2 - \frac{14}{3}y^3, \end{aligned}$$

то

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 \left( \frac{8}{3} + 2y^2 - \frac{14}{3}y^3 \right) dy = \left( \frac{8y}{3} + \frac{2y^3}{3} - \frac{7y^4}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{13}{6}.$$

Якщо взяти до уваги геометричний зміст подвійного інтеграла, то  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  дає об'єм  $V$  циліндричного тіла, обмеженого зверху частиною параболоїда обертання  $z = x^2 + y^2$ , яка проектується на площину  $Oxy$  в трикутник  $D$ .

**Приклад 1.2.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D xy dx dy$ , якщо область інтегрування  $D$  обмежена віссю  $Ox$  і верхнім півколом  $(x-2)^2 + y^2 = 1$  (див. рис. 1.5).

Розв'язок

Запишемо рівняння ліній, які обмежують область інтегрування:  $y = 0$  – рівняння осі  $Ox$ , а  $y = \sqrt{1 - (x-2)^2}$  – рівняння верхньої частини круга




Рис. 1.5

(з центром в точці  $(2,0)$  і радіусом  $1$ ). Хоча область  $D$  є правильною в напрямку обох координатних осей, але в даному випадку зручніше вважати її правильною вздовж осі  $Ox$  ( $D = \{0 \leq y \leq \sqrt{1 - (x-2)^2}, 1 \leq x \leq 3\}$ ). Тому для обчислення подвійного інтеграла скористаємось формулою (1.12), де  $y_{вх} = \varphi_1(x) = 0$ ,  $y_{вих} = \varphi_2(x) = \sqrt{1 - (x-2)^2}$ ,  $a = 1$ ,  $b = 3$ . Тоді

$$\iint_D xy \, dx dy = \int_1^3 dx \int_0^{\sqrt{1-(x-2)^2}} xy \, dy.$$

Обчислимо внутрішній інтеграл, в якому вважаємо  $x$  сталою:

$$\int_0^{\sqrt{1-(x-2)^2}} xy \, dy = x \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{1-(x-2)^2}} = \frac{x(1 - (x-2)^2)}{2} = \frac{-x^3 + 4x^2 - 3x}{2}.$$

Відповідно,

$$\iint_D xy \, dx dy = \frac{1}{2} \int_1^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x) dx = \frac{1}{2} \left( -\frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right) \Big|_1^3 = \frac{4}{3}.$$

**Приклад 1.3.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D (x+y) \, dx dy$ , якщо область інтегрування  $D$  обмежена лініями  $x = 0$ ,  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 2 - x^2$  (рис. 1.6).

Розв'язок.

Знайдемо точки перетину ліній, які обмежують область  $D$ :

$$\left. \begin{array}{l} x = 0, \\ y = \sqrt{x} = 0, \end{array} \right\} \Rightarrow O(0,0), \quad \left. \begin{array}{l} x = 0, \\ y = 2 - x^2 = 2, \end{array} \right\} \Rightarrow B(0,2),$$

$$\left. \begin{array}{l} y = \sqrt{x}, \\ y = 2 - x^2, \end{array} \right\} \Rightarrow 2 - x^2 - \sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1 \Rightarrow A(1,1).$$




Рис. 1.6

Для обчислення подвійного інтеграла застосуємо формулу (1.12). Тут  $y_{вх} = \varphi_1(x) = \sqrt{x}$ ,  $y_{вих} = \varphi_2(x) = 2 - x^2$ ,  $a = 0$ ,  $b = 1$ . Тому

$$\iint_D (x + y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{2-x^2} (x + y) dy.$$

Обчислимо внутрішній інтеграл, в якому вважаємо  $x$  сталою:

$$\int_{\sqrt{x}}^{2-x^2} (x + y) dy = x \cdot y \Big|_{\sqrt{x}}^{2-x^2} + \frac{y^2}{2} \Big|_{\sqrt{x}}^{2-x^2} = 2 + \frac{3}{2}x - x^{3/2} - 2x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4.$$

Отже,

$$\begin{aligned} \iint_D (x + y) dx dy &= \int_0^1 \left( 2 + \frac{3}{2}x - x^{3/2} - 2x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \\ &= \left( 2x + \frac{3x^2}{4} - \frac{2x^{5/2}}{5} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{10} \right) \Big|_0^1 = \\ &= 2 + \frac{3}{4} - \frac{2}{5} - \frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{23}{15}. \end{aligned}$$

Якщо при обчисленні подвійного інтеграла  $\iint_D (x + y) dx dy$  скористатися формулою (1.13), то доведеться область інтегрування  $D$  розбити на дві частини  $D_1$  і  $D_2$  (див. рис. 1.6), оскільки лінія  $OAB$ , на якій розташовані точки виходу на окремих ділянках, задається різними рівняннями (див. зауваження 4). Згідно властивості адитивності подвійного інтеграла

$$\iint_D (x + y) dx dy = \iint_{D_1} (x + y) dx dy + \iint_{D_2} (x + y) dx dy.$$

Застосуємо формулу (1.13) до кожного з інтегралів, що стоять в правій частині останньої рівності:

$$\iint_{D_1} (x + y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{y^2} (x + y) dx,$$

тому що,  $x_{\text{вх}} = \psi_1(y) = 0$ ,  $x_{\text{вих}} = \psi_2(y) = y^2$ ,  $c = 0$ ,  $d = 1$ . Обчислимо внутрішній інтеграл, пам'ятаючи, що  $y$  – стала:

$$\int_0^{y^2} (x + y) dx = \left( \frac{x^2}{2} + yx \right) \Big|_0^{y^2} = \frac{y^4}{4} + y^3.$$

Тоді

$$\iint_{D_1} (x + y) dx dy = \int_0^1 \left( \frac{y^4}{4} + y^3 \right) dy = \left( \frac{y^5}{10} + \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{20}.$$

Аналогічно знаходимо

$$\iint_{D_2} (x + y) dx dy = \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2-y}} (x + y) dx, \text{ тому що, } x_{\text{вх}} = 0, x_{\text{вих}} = \sqrt{2-y},$$

$c = 1$ ,  $d = 2$ .

$$\int_0^{\sqrt{2-y}} (x + y) dx = \left( \frac{x^2}{2} + yx \right) \Big|_0^{\sqrt{2-y}} = \frac{2-y}{2} + y\sqrt{2-y}.$$

Відповідно

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (x + y) dx dy &= \int_1^2 \left( 1 - \frac{y}{2} + y\sqrt{2-y} \right) dy = \left( y - \frac{y^2}{4} \right) \Big|_1^2 + \int_1^2 y\sqrt{2-y} dy = \\ &= \frac{1}{4} + \int_1^2 y\sqrt{2-y} dy = \left| \begin{array}{l} \sqrt{2-y} = t, \quad dy = -2t dt, \\ y = 1 \Rightarrow t = 1, \quad y = 2 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{4} + 2 \int_0^1 (2 - t^2) t^2 dt = \frac{1}{4} + 2 \left( \frac{2t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{71}{60}. \end{aligned}$$

Таким чином, остаточно,

$$\iint_D (x + y) dx dy = \frac{7}{20} + \frac{71}{60} = \frac{23}{15}.$$

Цей приклад демонструє, що для знаходження подвійного інтеграла  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  в даному конкретному випадку зручніше застосувати формулу (1.12). Цю обставину слід мати на увазі при обчисленні подвійних інтегралів і використовувати ту з формул (1.12) чи (1.13), застосування якої приводить до менш громіздких обчислень.

**Приклад 1.4.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D (3x + 2xy) dx dy$ , якщо область інтегрування  $D$  обмежена лініями  $y = 0$ ,  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{2}(3 - x)$  (рис. 1.7).

Розв'язок.




Рис. 1.7

Знайдемо точки перетину ліній, які обмежують область  $D$ :

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2, \\ y = \frac{1}{2}(3 - x), \end{array} \right\} \Rightarrow x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 = 1, y_1 = 1; \\ x_2 = -\frac{3}{2}, y_2 = \frac{9}{4}; \end{array} \right\} \Rightarrow A(1, 1),$$

$$\left. \begin{array}{l} y = 0, \\ y = x^2, \end{array} \right\} \Rightarrow O(0, 0), \quad \left. \begin{array}{l} y = 0, \\ y = \frac{1}{2}(3 - x), \end{array} \right\} \Rightarrow 3 - x = 0 \Rightarrow B(3, 0).$$

Як видно з рис. 1.7, якщо область інтегрування  $D$  вважати правильною вздовж осі  $Oy$ , то точки виходу будуть лежати на лінії  $OAB$ , яка на проміжку  $[0, 1]$  задається рівнянням  $y = x^2$ , а на проміжку  $[1, 3]$  – рівнянням  $y = \frac{1}{2}(3 - x)$ . Тоді область  $D$  доведеться розбивати на частини  $D_1$  та  $D_2$ , що є нераціональним. В даному випадку область інтегрування вигідніше розглядати правильною вздовж  $Ox$ :  $D = \{\sqrt{y} \leq x \leq 3 - 2y, 0 \leq y \leq 1\}$ . Тоді для обчислення подвійного інтеграла  $\iint_D (3x + 2xy) dx dy$  застосуємо формулу

(1.13)

$$\iint_D (3x + 2xy) dx dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} (3 + 2y)x dx.$$



Обчислимо внутрішній інтеграл, пам'ятаючи, що  $y$  – стала:

$$\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} (3+2y)x \, dx = (3+2y) \frac{x^2}{2} \Big|_{\sqrt{y}}^{3-2y} = \frac{1}{2} (8y^3 - 14y^2 - 21y + 27).$$

Остаточно

$$\begin{aligned} \iint_D (3x + 2xy) \, dx dy &= \frac{1}{2} \int_0^1 (8y^3 - 14y^2 - 21y + 27) \, dy = \\ &= \frac{1}{2} \left( 2y^4 - \frac{14y^3}{3} - \frac{21y^2}{2} + 27y \right) \Big|_0^1 = \frac{83}{12}. \end{aligned}$$

**Приклад 1.5.** Знайти середнє значення функції  $f(x, y) = 12 - 2x - 3y$  в області  $D$ , яка обмежена прямими  $12 - 2x - 3y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ .

*Розв'язок.*

Знайдемо точки перетину ліній, які обмежують область  $D$  (див. рис. 1.8):

$$\left. \begin{array}{l} x = 0, \\ 12 - 3y = 0, \end{array} \right\} \Rightarrow A(0, 4), \quad \left. \begin{array}{l} y = 0, \\ 12 - 2x = 0, \end{array} \right\} \Rightarrow B(6, 0).$$




Рис. 1.8

Середнє значення функції  $f(x, y)$  в області  $D$  будемо шукати за формулою (1.11), де  $S$  – площа цієї області (див. (1.4)). Вважатимемо що область  $D$  правильна у напрямку осі  $Oy$ . Тоді точка входу буде лежати на прямій  $y = 0$ , точка виходу на прямій  $y = 4 - \frac{2}{3}x$ , а область інтегрування буде визначена наступним чином:  $D = \{0 \leq y \leq 4 - \frac{2}{3}x, 0 \leq x \leq 6\}$ .

Для обчислення подвійного інтеграла, що фігурує в (1.4) застосуємо формулу (1.12). Тоді

$$S = \iint_D dx dy = \int_0^6 dx \int_0^{4-\frac{2}{3}x} dy = \int_0^6 \left(4 - \frac{2}{3}x\right) dx = \left(4x - \frac{x^2}{3}\right) \Big|_0^6 = 12.$$

Підставивши одержане значення площі  $S$  в (1.11) переходимо до знаходження середнього значення функції  $f(P)$ :

$$f(P) = \frac{1}{S} \iint_D (12 - 2x - 3y) dx dy = \frac{1}{12} \int_0^6 dx \int_0^{4-\frac{2}{3}x} (12 - 2x - 3y) dy.$$

Обчислюємо внутрішній інтеграл

$$\int_0^{4-\frac{2}{3}x} (12 - 2x - 3y) dy = \left( (12 - 2x)y - \frac{3y^2}{2} \right) \Big|_0^{4-\frac{2}{3}x} = 4 \left( 6 - 2x + \frac{x^2}{6} \right)$$

і остаточно знаходимо

$$f(P) = \frac{4}{12} \int_0^6 \left( 6 - 2x + \frac{x^2}{6} \right) dx = \frac{1}{3} \left( 6x - x^2 + \frac{1}{6} \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^6 = 4.$$

#### 1.1.4. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Подвійний інтеграл у полярних координатах

Одним із методів спрощення обчислення подвійного інтеграла є метод заміни змінних у подвійному інтегралі.

Нехай функція  $f(x, y)$  неперервна в деякій замкненій і обмеженій області  $D$ , тоді існує інтеграл

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

Припустимо, що за допомогою формул

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v) \tag{1.17}$$

ми переходимо в подвійному інтегралі  $I$  до нових змінних  $u$  та  $v$ . Вважати-мемо, що з формул (1.17) однозначно можна визначити  $u$  та  $v$ :

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y). \tag{1.18}$$

Нехай множина всіх точок  $M^*(u, v)$  утворює обмежену замкнену область  $D^*$ . За допомогою формул (1.18) кожній точці  $M(x, y)$  із області  $D$  ставиться у відповідність деяка точка  $M^*(u, v)$  із області  $D^*$ . Формули (1.17) називають **формулами перетворення координат**, а формули (1.18) – **формулами оберненого перетворення**.

Справедлива наступна теорема.

**Теорема 1.3.** *Якщо перетворення (1.18) переводить замкнену обмежену область  $D$  в замкнену обмежену область  $D^*$  і є взаємно однозначним, і якщо функції (1.17) мають в області  $D^*$  неперервні частинні похідні першого порядку і відмінний від нуля визначник*

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad (1.19)$$

а функція  $f(x, y)$  неперервна в області  $D$ , то справедлива наступна формула заміни змінних:

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv. \quad (1.20)$$

Функціональний визначник (1.19) називається **визначником Якобі або якобіаном**. Таким чином, виконуючи заміну змінних в інтегралі  $I$  за формулами (1.17), ми маємо елемент площі  $dx dy$  в координатах  $x, y$  замінити елементом площі  $|J(u, v)| du dv$  в координатах  $u, v$  і стару область інтегрування  $D$  замінити відповідною їй областю  $D^*$ .

**Приклад 1.6.** *Обчислити інтеграл  $\iint_D \frac{x}{y} dx dy$ , якщо область  $D$  обмежена лініями  $xy = a^2$ ,  $xy = 2a^2$ ,  $y = x$ ,  $y = 2x$  ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ) (див. рис. 1.9 а).*

*Розв'язок.*

Безпосереднє обчислення цього інтеграла надто громіздке, тому що як в напрямку осі  $Ox$  так і в напрямку осі  $Oy$  область  $D$  потрібно спочатку розбити на три області, а потім обчислювати три подвійних інтеграли. Тому перейдемо до нових змінних  $u$  і  $v$  за формулами  $u = \frac{y}{x}$ ,  $v = xy$ . Тоді

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{v}{u}}, & y &= \sqrt{uv}; \\ \frac{\partial x}{\partial u} &= -\frac{1}{2}\sqrt{vu}^{-\frac{3}{2}}, & \frac{\partial x}{\partial v} &= \frac{1}{2\sqrt{uv}}; \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}}, & \frac{\partial y}{\partial v} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}}. \end{aligned}$$




Рис. 1.9

Обчислюємо якобіан переходу

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2}\sqrt{v}u^{-\frac{3}{2}} & \frac{1}{2\sqrt{uv}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2u}, \quad |J(u, v)| = \frac{1}{2u}.$$

Рівняння ліній набувають вигляду:  $v = a^2$ ,  $v = 2a^2$ ,  $u = 1$ ,  $u = 2$ . Область  $D$  площини  $Oxy$  перетворюється в прямокутник  $D^*$  площини  $O^*uv$  (рис. 1.9 б). Застосовуючи формулу (1.20), дістанемо

$$\iint_D \frac{x}{y} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D^*} \frac{1}{u^2} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u^2} \int_{a^2}^{2a^2} dv = \frac{a^2}{2} \int_1^2 \frac{du}{u^2} = -\frac{a^2}{2} \frac{1}{u} \Big|_1^2 = \frac{a^2}{4}.$$

Розглянемо заміну декартових координат  $x$ ,  $y$  полярними  $\rho$ ,  $\varphi$  за відомими формулами

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi \quad (0 \leq \rho < +\infty, 0 \leq \varphi \leq 2\pi).$$

Оскільки

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho, \quad |J(u, v)| = \rho, \quad (1.21)$$

то формула (1.20) набуває вигляду

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi. \quad (1.22)$$

де область  $D$  задана в декартовій системі координат  $Oxy$ , а  $D^*$  – відповідна їй область в полярній системі координат. Вираз  $\rho d\rho d\varphi$  є елементом площі

в полярних координатах. Формула (1.22) виражає правило заміни змінних у подвійному інтегралі при переході до полярних координат. (В подальшому для спрощення запису позначення  $D$  будемо вживати, як для області заданій в декартовій системі координат, так і для області заданій в полярній системі координат.)

Для обчислення подвійного інтеграла  $\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$  застосовують теж саме правило зведення до повторного інтеграла, що і у випадку змінних  $x$  і  $y$ . Нехай область  $D$  обмежена двома променями, що виходять з полюса під кутами  $\alpha$  і  $\beta$ , та двома кривими, рівняння яких у полярних координатах мають вигляд:  $\rho = \rho_1(\varphi)$  і  $\rho = \rho_2(\varphi)$ . Проведемо з полюса промінь під кутом  $\varphi$  ( $\alpha < \varphi < \beta$ ). Цей промінь перетинає криві  $\rho = \rho_1(\varphi)$  і  $\rho = \rho_2(\varphi)$  відповідно в точках  $C_1$  і  $C_2$  (рис. 1.10). Точка  $C_1$  є точкою входу, а точка  $C_2$  – точкою виходу. Для цієї області інтегрування  $D = \{\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi), \alpha \leq \varphi \leq \beta\}$  подвійний інтеграл обчислюють за формулою:




Рис. 1.10. Область інтегрування  $D$  у полярних координатах

$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_{\text{вх}}=\rho_1(\varphi)}^{\rho_{\text{вих}}=\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \quad (1.23)$$

Внутрішній інтеграл  $\int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$  береться (при постійному  $\varphi$ ) в межах від полярного радіуса точки входу ( $\rho_{\text{вх}} = \rho_1(\varphi)$ ) до полярного радіуса точки виходу ( $\rho_{\text{вих}} = \rho_2(\varphi)$ ). Результат цього інтегрування буде деякою функцією від змінної  $\varphi$ , яку потрібно проінтегрувати в межах від  $\alpha$  до  $\beta$ .

Якщо полюс належить межі області інтегрування  $D$  (як зображено на рис. 1.11 а), то для неї полярний радіус входу рівний нулю:  $\rho_{\text{вх}} = 0$  і, відповідно,

$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \quad (1.24)$$

Якщо ж область  $D$  охоплює початок координат і обмежена кривою  $\rho = \rho(\varphi)$  (рис. 1.11 б), то маємо

$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \quad (1.25)$$




Рис. 1.11

Зокрема, якщо межа області  $D$  – коло радіуса  $R$  з центром в початку координат ( $\rho(\varphi) = R$ ), то

$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho \, d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho \, d\rho. \quad (1.26)$$

**Зауваження 1.** Оскільки сума  $x^2 + y^2$  у полярних координатах має простий вигляд:  $x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = \rho^2$ , то формулу (1.22) доцільно застосовувати тоді, коли підінтегральна функція або рівняння межі області  $D$  містить цю суму.

**Приклад 1.7.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy$ , де область  $D$  є колом радіусом 2 з центром в початку координат.

*Розв'язок.*

Перейдемо в полярну систему координат. Застосовуючи формулу (1.22), одержимо

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy &= \iint_D \sqrt{4 - (\rho \cos \varphi)^2 - (\rho \sin \varphi)^2} \rho \, d\rho d\varphi \\ &= \iint_D \sqrt{4 - \rho^2} \rho \, d\rho d\varphi. \end{aligned}$$

Застосовуючи до цього інтеграла формулу (1.26), знайдемо

$$\iint_D \sqrt{4 - \rho^2} \rho \, d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \sqrt{4 - \rho^2} \rho \, d\rho.$$

Обчислення внутрішнього інтеграла дає:

$$\int_0^2 \sqrt{4 - \rho^2} \rho d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{4 - \rho^2} d(4 - \rho^2) = -\frac{(4 - \rho^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{3},$$

тому

$$\iint_D \sqrt{4 - \rho^2} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} d\varphi = \frac{16}{3}\pi.$$

Отже,

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy = \frac{16}{3}\pi.$$

**Приклад 1.8.** Обчислити подвійний інтеграл  $\iint_D \arctg \frac{y}{x} dx dy$ , де область

$D$  – частина кільця:  $x^2 + y^2 \geq 1$ ,  $x^2 + y^2 \leq 9$ ,  $y \geq \frac{x}{\sqrt{3}}$ ,  $y \leq x\sqrt{3}$  (рис. 1.12).

Розв'язок.




Рис. 1.12

Перейдемо в подвійному інтегралі до полярних координат (див. (1.22), (1.23))

$$\iint_D \arctg \frac{y}{x} dx dy = \iint_D \arctg(\operatorname{tg} \varphi) \rho d\rho d\varphi = \iint_D \varphi \rho d\rho d\varphi = \int \varphi d\varphi \int \rho d\rho.$$

Для встановлення меж інтегрування у повторному інтегралі запишемо рівняння меж області в полярній системі координат:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 = 1 &\Rightarrow \rho^2 = 1, \rho = 1; \\x^2 + y^2 = 9 &\Rightarrow \rho^2 = 9, \rho = 3; \\y = \frac{x}{\sqrt{3}} &\Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}, \varphi = \frac{\pi}{6}; \\y = x\sqrt{3} &\Rightarrow \frac{y}{x} = \sqrt{3} \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{3}, \varphi = \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

Таким чином

$$\begin{aligned}\iint_D \varphi \rho \, d\rho d\varphi &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \varphi \, d\varphi \int_1^3 \rho \, d\rho = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \varphi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_1^3 d\varphi = 4 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \varphi \, d\varphi = \\&= 4 \cdot \left. \frac{\varphi^2}{2} \right|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left( \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi^2}{36} \right) = \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

Отже,

$$\iint_D \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \, dx dy = \frac{\pi^2}{6}.$$

### 1.1.5. Застосування подвійного інтеграла до розв'язання задач геометрії і механіки

В таблиці 1.1 перераховано основні застосування подвійного інтеграла. Всі пояснення приведено у виносках до таблиці.

Табл. 1.1. Визначення деяких величин через подвійний інтеграл

Назва величини	Формула для обчислення	
	у прямокутних координатах	у полярних координатах
Площа плоскої фігури <sup>1</sup>	$S = \iint_D dx dy$	$S = \iint_D \rho d\rho d\varphi$

продовження на наступній сторінці

<sup>1</sup>В площині  $Oxy$  задана фігура, що має форму обмеженої замкненої області  $D$ .



(продовження таблиці 1.1)

Назва величини	Формула для обчислення	
	у прямокутних координатах	у полярних координатах
Об'єм циліндричного тіла <sup>2</sup>	$V = \iint_D f(x, y) dx dy$	$S = \iint_D f(\rho, \varphi) \rho d\rho d\varphi$
Площа поверхні <sup>3</sup>	$Q = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2(x, y) + f_y'^2(x, y)} dx dy$	
Маса плоскої фігури <sup>4</sup>	$m = \iint_D \gamma(x, y) dx dy$	$m = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho d\rho d\varphi$
Статичні моменти плоскої фігури, відносно осей координат	$M_x = \iint_D \gamma(x, y)y dx dy$ $M_y = \iint_D \gamma(x, y)x dx dy$	$M_x = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi$ $M_y = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho^2 \cos \varphi d\rho d\varphi$
Моменти інерції плоскої фігури, відносно осей координат і початку координат	$I_x = \iint_D \gamma(x, y)y^2 dx dy$ $I_y = \iint_D \gamma(x, y)x^2 dx dy$ $I_0 = \iint_D \gamma(x, y)(x^2 + y^2) dx dy$	$I_x = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho^3 \sin^2 \varphi d\rho d\varphi$ $I_y = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho^3 \cos^2 \varphi d\rho d\varphi$ $I_0 = \iint_D \gamma(\rho, \varphi) \rho^3 d\rho d\varphi$

продовження на наступній сторінці

<sup>2</sup>Циліндричне тіло знизу обмежене областю  $D$  площини  $Oxy$ , зверху – поверхнею  $z = f(x, y)$ , а його твірні паралельні осі  $Oz$ , функція  $f(x, y)$  неперервна та невід'ємна в області  $D$ .

<sup>3</sup>Поверхня  $\sigma$  задана рівнянням  $z = f(x, y)$  і проєктується на площину  $Oxy$  в область  $D$ , а функції  $f(x, y)$ ,  $f_x'(x, y)$ ,  $f_y'(x, y)$  неперервні в цій області.

<sup>4</sup>На площині  $Oxy$  маємо матеріальну фігуру, яка має форму обмеженої замкненої області  $D$ , в кожній точці якої густина визначається неперервною функцією  $\gamma = \gamma(x, y)$ .

(продовження таблиці 1.1)

Назва величини	Формула для обчислення	
	у прямокутних координатах	у полярних координатах
Координати центра ваги плоскої фігури	$x_c = \frac{M_y}{m}$	$y_c = \frac{M_x}{m}$

**Приклад 1.9.** Знайти площу фігури, обмеженої лініями  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 2\sqrt{x}$  і  $x = 4$ .

*Розв'язок.*

Побудуємо фігуру, обмежену даними лініями, тобто область  $D$  (рис. 1.13).




Рис. 1.13

Її площу обчислимо за формулою

$$S = \iint_D dx dy.$$

Переходячи до повторного інтеграла й обчислюючи його, одержимо:

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^{3\sqrt{x}} dy = \\ &= \int_0^4 y \Big|_{\sqrt{x}}^{3\sqrt{x}} dx = \int_0^4 (3\sqrt{x} - \sqrt{x}) dx = \\ &= 2 \int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{4x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{4}{3} 4^{\frac{3}{2}} = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

**Приклад 1.10.** Знайти площу плоскої фігури, обмеженої кардіоїдою  $\rho = a(1 + \cos \varphi)$  (рис. 1.14).

*Розв'язок.*

В даному випадку площу фігури обмеженої кардіоїдою зручно обчислювати у полярних координатах за формулою

$$S = \iint_D \rho d\rho d\varphi.$$

Враховуючи симетрію кардіоїди, область інтегрування  $D$  буде мати вигляд:  $D = \{0 \leq \rho \leq a(1 + \cos \varphi), 0 \leq \varphi \leq \pi\}$ .

Переходячи до повторного інтеграла й обчислюючи його, одержимо:




Рис. 1.14

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \rho d\rho d\varphi = 2 \int_0^\pi d\varphi \int_0^{a(1+\cos \varphi)} \rho d\rho = \\ &= 2 \int_0^\pi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{a(1+\cos \varphi)} d\varphi = a^2 \int_0^\pi (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \\ &= a^2 \int_0^\pi \left( 1 + 2 \cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi = \\ &= a^2 \left( \frac{3\varphi}{2} + 2 \sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi = \frac{3\pi}{2} a^2. \end{aligned}$$

**Приклад 1.11.** Знайти площу плоскої фігури, обмеженої лемніскатою Бернуллі  $\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}$  (1.15).

Розв'язок.

Оскільки полярний радіус  $\rho$  може набувати лише дійсних значень, то  $\cos 2\varphi$  у рівнянні лемніскати не може бути від'ємним, тобто  $\cos 2\varphi \geq 0$ . Це означає, що кут  $2\varphi$  повинен міститися або в першій, або четвертій чверті. Оскільки крива симетрична відносно полюса (див. 1.15), то достатньо побудувати її лише в першій чверті, тоді кут  $2\varphi$  задовольняє умові  $0 \leq 2\varphi \leq \frac{\pi}{2}$ . Тобто кут  $\varphi$  змінюється від  $\varphi = 0$  до  $\varphi = \pi/4$ .

Площу фігури обмеженої лемніскатою обчислюємо за формулою

$$S = \iint_D \rho d\rho d\varphi.$$

Переходячи до повторного інтеграла і враховуючи симетрію фігури відносно осей координат, одержимо:

$$S = 4 \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} \rho d\rho =$$

$$= 4 \int_0^{\pi/4} \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = 2a^2 \int_0^{\pi/4} \cos 2\varphi d\varphi = a^2 \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi/4} = a^2(1 - 0) = a^2.$$




Рис. 1.15

**Приклад 1.12.** Знайти площу фігури обмеженої колом  $\rho = 4 \sin \varphi$  та лемніскатою Бернуллі  $\rho = 2\sqrt{2} \sqrt{\cos 2\varphi}$  (див. рис. 1.16).

Розв'язок.

З системи рівнянь

$$\left. \begin{aligned} \rho &= 4 \sin \varphi, \\ \rho &= 2\sqrt{2} \sqrt{\cos 2\varphi} \end{aligned} \right\}$$

знаходимо точки перетину кола та лемніскати:  $A\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ ,  $B\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)$ .

Враховуючи симетрію фігури (див. рис. 1.16), її площу обчислюємо за формулою

$$S = 2 \left( \iint_{D_1} \rho d\rho d\varphi + \iint_{D_2} \rho d\rho d\varphi \right),$$

$D_1 = \left\{ 2\sqrt{2} \sqrt{\cos 2\varphi} \leq \rho \leq 4 \sin \varphi, \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \right\}$ ,  $D_2 = \left\{ 0 \leq \rho \leq 4 \sin \varphi, \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}$ . Переходячи до повторного інтеграла, одержимо:




Рис. 1.16

$$\begin{aligned} S &= 2 \left( \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{2\sqrt{2} \sqrt{\cos 2\varphi}}^{4 \sin \varphi} \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{4 \sin \varphi} \rho d\rho \right) = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (16 \sin^2 \varphi - 8 \cos 2\varphi) d\varphi + \\ &+ \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 16 \sin^2 \varphi d\varphi = 8 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2 \cos 2\varphi) d\varphi + 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = \\ &= 8 \left( \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi d\varphi - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi d\varphi \right) = \frac{8\pi}{3} + 4\sqrt{3} - 4. \end{aligned}$$

При обчисленні інтегралів, що містять  $\sin^2 \varphi$  застосовувалася формула пониження степеня

$$\sin^2 \varphi = \frac{1 - \cos 2\varphi}{2}.$$

**Приклад 1.13.** Знайти об'єм тіла, вирізаного із кулі радіуса  $R$  прямим круговим циліндром діаметра  $R$ , твірні якого проходять через центр кулі.

Розв'язок.

Помістимо початок координат в центр кулі (див. рис. 1.17), спрямувавши вісь  $Oz$  вздовж твірної циліндра, а вісь  $Ox$  – вздовж діаметра основи циліндра. Внаслідок симетрії тіла відносно координатних площин  $Oxy$  і  $Oxz$  достатньо знайти об'єм частини тіла, що знаходиться в першому октанті, і одержаний результат почетверити (рис. 1.18а). Відповідно,






Рис. 1.17

$$V = 4 \iint_D z \, dx dy,$$

де  $z$  – апліката точок сфери, а  $D$  – півколо  $x^2 + y^2 = Rx$  в площині  $Oxy$  радіуса  $\frac{R}{2}$  з центром в точці  $\left(\frac{R}{2}, 0\right)$  (рис. 1.18б).



а



б

Рис. 1.18

Оскільки рівняння сфери радіуса  $R$  з центром у початку координат має вигляд  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ , то в першому октанті  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  і,

відповідно,

$$V = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy.$$

Переходячи до полярних координат, одержимо

$$V = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho d\varphi.$$

Враховуючи, що  $\rho_{\text{вх}} = 0$ ,  $\rho_{\text{вих}} = R \cos \varphi$ ,  $\alpha = 0$ ,  $\beta = \frac{\pi}{2}$  (див. рис. 1.18 б), за допомогою формули (1.24) одержимо

$$V = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho d\varphi = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{R \cos \varphi} \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} \int_0^{R \cos \varphi} \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho &= -\frac{1}{2} \int_0^{R \cos \varphi} \sqrt{R^2 - \rho^2} d(R^2 - \rho^2) = -\frac{(R^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^{R \cos \varphi} = \\ &= -\frac{(R^2 - R^2 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}{3} + \frac{R^3}{3} = \frac{R^3}{3} (1 - \sin^3 \varphi), \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{R^3}{3} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi &= \frac{4}{3} R^3 \left( \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi \right) = \\ &= \left| \begin{array}{l} t = \cos \varphi, \\ dt = -\sin \varphi d\varphi, \end{array} \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi = \int_0^1 (1 - t^2) dt = \frac{2}{3} \right| = \\ &= \frac{4}{3} R^3 \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

Отже, шуканий об'єм

$$V = \frac{4}{3} R^3 \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).$$

**Приклад 1.14.** Обчислити площу частини параболоїда обертання  $z = x^2 + y^2$ , яка вирізана циліндром  $x^2 + y^2 = 4$  (рис. 1.19).

Розв'язок.

Застосуємо формулу

$$Q = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2(x, y) + f_y'^2(x, y)} \, dx dy.$$

Тут  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ;  $f_x' = 2x$ ,  $f_y' = 2y$ , тоді  $\sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$ . Отже,




Рис. 1.19

$$Q = \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \, dx dy,$$

де  $D$  – коло радіуса 2 з центром в початку координат (див. рис. 1.19). Обчислення інтеграла проводимо у полярних координатах:

$$\begin{aligned} Q &= \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \, dx dy = \\ &= \iint_D \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho \, d\rho d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho \, d\rho. \end{aligned}$$

Внутрішній інтеграл дає

$$\begin{aligned} \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho \, d\rho &= \frac{1}{8} \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \, d(1 + 4\rho^2) = \frac{1}{12} (1 + 4\rho^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \\ &= \frac{1}{12} (17\sqrt{17} - 1). \end{aligned}$$

Таким чином, шукана площа рівна

$$Q = \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} (17\sqrt{17} - 1) \, d\varphi = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1).$$

**Приклад 1.15.** Знайти координати центра ваги однорідної пластини, обмеженої параболою  $y = 4 - x^2$  та віссю  $Ox$  (рис. 1.20)

Розв'язок.

Координати центра ваги фігури знайдемо за формулами  $x_c = \frac{M_y}{m}$ ,  $y_c = \frac{M_x}{m}$ . Для цього обчислимо статичні моменти  $M_x$ ,  $M_y$ :




Рис. 1.20

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_D y \, dx dy = \int_{-2}^2 dx \int_0^{4-x^2} y \, dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4-x^2)^2 \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) \, dx = \frac{256}{15}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_y &= \iint_D x \, dx dy = \int_{-2}^2 x \, dx \int_0^{4-x^2} dy = \\ &= \int_{-2}^2 (4-x^2) x \, dx = -\frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4-x^2) \, d(4-x^2) = -\left. \frac{(4-x^2)^2}{4} \right|_{-2}^2 = 0, \end{aligned}$$

і визначимо площу фігури  $S$ :

$$S = \iint_D dx dy = \int_{-2}^2 dx \int_0^{4-x^2} dy = \int_{-2}^2 (4-x^2) \, dx = \frac{32}{3}.$$

Відповідно абсциса  $x_c$  центра ваги

$$x_c = \frac{M_y}{S} = \frac{0}{\frac{32}{3}} = 0$$

(цей результат можна було б одержати без обчислень, оскільки фігура симетрична відносно осі  $Oy$ ), а ордината  $y_c$  рівна

$$y_c = \frac{M_x}{S} = \frac{\frac{256}{15}}{\frac{32}{3}} = \frac{8}{5}.$$

Отже, координати центра ваги такі:  $x_c = 0$ ,  $y_c = \frac{8}{5}$ .



**Приклад 1.16.** Знайти моменти інерції  $I_x$ ,  $I_y$  відносно координатних осей та момент інерції  $I_0$  відносно початку координат однорідної пластини з прикладу 1.15, вважаючи, що густина  $\gamma(x, y) = 1$ .

*Розв'язок.*

Момент інерції відносно осі  $Ox$  обчислюємо за формулою (див. табл. 1.1)

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_D \gamma y^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy = \int_{-2}^2 dx \int_0^{4-x^2} y^2 dy = \frac{1}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^3 dx = \\ &= \frac{2}{3} \int_0^2 (64 - 48x^2 + 12x^4 - x^6) dx = \frac{4096}{105}. \end{aligned}$$

Аналогічно знаходимо момент інерції відносно осі  $Oy$

$$I_y = \iint_D \gamma x^2 dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \int_{-2}^2 dx \int_0^{4-x^2} x^2 dy = \int_{-2}^2 x^2(4-x^2) dx = \frac{128}{15}.$$

Момент інерції відносно початку координат можна розглядати як суму моментів  $I_x$  та  $I_y$ :

$$I_0 = \iint_D \gamma(x^2 + y^2) dx dy = I_x + I_y.$$

Тоді

$$I_0 = \frac{4096}{105} + \frac{128}{15} = \frac{1664}{35} \approx 47,5.$$

## 1.2. Потрійні інтеграли

### 1.2.1. Поняття і умови існування потрійного інтеграла. Його геометричний та механічний зміст

В основі визначення подвійного інтеграла лежало поняття площі плоскої фігури. Подібним чином при побудові загального означення потрійного інтеграла основну роль відіграє поняття об'єму тіла.

Нехай довільна функція  $u = f(x, y, z)$  визначена і обмежена в замкненій обмеженій області  $G = \mathbb{R}^3$ . Розіб'ємо область  $G$  довільним чином сіткою поверхонь на  $n$  частин  $G_i$ , які не мають спільних внутрішніх точок, і об'єми

яких дорівнюють  $\Delta V_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . У кожній частині  $G_i$  візьмемо довільну точку  $P_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ , значення функції в цій точці  $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$  помножимо на об'єм  $\Delta V_i$  і утворимо суму

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i, \quad (1.27)$$

яка називається **інтегральною сумою для функції  $f(x, y, z)$  по області  $G$** .

Нехай  $d(G_i)$  – діаметр  $G_i$ .

**Означення 1.3.** Якщо інтегральна сума (1.27) при  $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d(G_i) \rightarrow 0$  має скінченну границю  $I$ , яка не залежить ні від способу розбиття області  $G$  на частини  $G_i$ , ні від вибору в них точок  $P_i$ , то ця границя називається **потрійним інтегралом від функції  $f(x, y, z)$  по області  $G$**  і позначається одним із символів:

$$I = \iiint_G f(x, y, z) dV \quad \text{або} \quad I = \iiint_G f(x, y, z) dx dy dz.$$

Таким чином, за означенням

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i, \quad (1.28)$$

де функція  $f(x, y, z)$  називається **інтегрованою в області  $G$** ;  $G$  – **область інтегрування**,  $x, y, z$  – **змінні інтегрування**, а  $dV$  (або  $dx dy dz$ ) – **елемент об'єму**.

**Теорема 1.4** (достатня умова інтегровності функції). Якщо функція  $f(x, y, z)$  неперервна в замкненій обмеженій області  $G$ , то вона в цій області інтегровна.

**Геометричний зміст потрійного інтеграла.** Якщо всюди в області  $G$  покласти  $f(x, y, z) \equiv 1$ , то потрійний інтеграл (1.28) рівний об'єму тіла  $G$ :

$$V = \iiint_G dx dy dz. \quad (1.29)$$

**Механічний зміст потрійного інтеграла.** Коли підінтегральна функція  $f(x, y, z)$  невід'ємна в області  $G$ , то її можна розглядати як об'ємну густину  $\rho(x, y, z)$  у точці  $(x, y, z) \in G$  деякого розподілу маси по тілу  $G$ , тоді маса  $m$  цього тіла знаходиться за формулою:

$$m = \iiint_G \rho(x, y, z) dx dy dz. \quad (1.30)$$

Зауважмо, що потрійний інтеграл (1.28) існує і у випадку  $f(x, y, z) \leq 0$ , якщо виконуються умови теореми 1.4.

### 1.2.2. Властивості потрійних інтегралів

1. Сталій множник можна виносити за знак потрійного інтеграла:

$$\iiint_G C f(x, y, z) dV = C \iiint_G f(x, y, z) dV, \quad C = \text{const.} \quad (1.31)$$

2. Потрійний інтеграл від суми декількох функцій рівний сумі потрійних інтегралів від доданків, тобто:

$$\iiint_G (f(x, y, z) \pm g(x, y, z)) dV = \iiint_G f(x, y, z) dV \pm \iiint_G g(x, y, z) dV. \quad (1.32)$$

3. Якщо в області інтегрування  $f(x, y, z) \geq 0$ , то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV \geq 0. \quad (1.33)$$

4. Якщо для інтегрованих в  $G$  функцій виконується нерівність  $f(x, y, z) \geq g(x, y, z)$ , то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV \geq \iiint_G g(x, y, z) dV. \quad (1.34)$$

5. Якщо  $f(x, y, z)$  інтегровна в  $G$ , то інтегровою є і  $|f(x, y, z)|$ , причому

$$\left| \iiint_G f(x, y, z) dV \right| \leq \iiint_G |f(x, y, z)| dV. \quad (1.35)$$

6. (Адитивність потрійного інтеграла.) Якщо область інтегрування  $G$  функції  $f(x, y, z)$ , розбити на  $n$  частин  $G_1, G_2, \dots, G_n$ , які не мають спільних внутрішніх точок, то

$$\begin{aligned} \iiint_G f(x, y, z) dV &= \iiint_{G_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{G_2} f(x, y, z) dV + \\ &\quad \dots + \iiint_{G_n} f(x, y, z) dV \end{aligned} \quad (1.36)$$

7. (Оцінка потрійного інтеграла.) Якщо функція  $f(x, y, z)$  неперервна в обмеженій замкненій області  $G$ , яка має об'єм  $V$ , то

$$mV \leq \iiint_G f(x, y, z) dV \leq MV, \quad (1.37)$$

де  $m$  і  $M$  – найменше і найбільше значення функції  $f(x, y, z)$  в області  $G$ .

8. (Середнє значення функції.) Якщо функція  $f(x, y, z)$  неперервна в обмеженій замкненій області  $G$ , яка має об'єм  $V$ , то в цій області існує така точка  $P(x_0, y_0, z_0)$ , що

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = f(P) V.$$

Величину

$$f(P) = \frac{1}{V} \iiint_G f(x, y, z) dV \quad (1.38)$$

називають **середнім значенням функції**  $f(x, y, z)$  в області  $G$ .

### 1.2.3. Обчислення потрійного інтеграла в декартових координатах

Обчислення потрійного інтеграла зводиться до послідовного обчислення трьох визначених інтегралів.




Рис. 1.21

Нехай замкнена область  $G$  обмежена знизу і зверху, відповідно, поверхнями  $z = z_1(x, y)$  і  $z = z_2(x, y)$ , де функції  $z_1(x, y)$ ,  $z_2(x, y)$  визначені і неперервні в області  $D$ , яка є проекцією області  $G$  на площину  $Oxy$ , причому  $z_1(x, y) < z_2(x, y)$ ,  $(x, y) \in D$ . Із боків область  $G$  обмежена циліндричною поверхнею, твірні якої паралельні осі  $Oz$ . Кожна пряма, паралельна осі  $Oz$ , перетинає границю області  $G$  не більше ніж у двох точках (рис. 1.21).

Якщо при цьому область  $D$  є правильною, то область  $G$  називається **правильною в напрямку осі  $Oz$** . Тобто, кожна пряма, яка проходить через кожен внутрішню точку  $(x, y, 0) \in D$  паралельно осі  $Oz$ , перетинає межу області  $G$  тільки у двох

точках  $M$  і  $N$ . Точку  $M$  назвемо **точкою входу в область  $G$** , точку  $N$  – **точкою виходу з області  $G$** , а їхні аплікати позначимо, відповідно, через  $z_{\text{вх}}$  і  $z_{\text{вих}}$ . Тоді  $z_{\text{вх}} = z_1(x, y)$  буде нижньою межею, а  $z_{\text{вих}} = z_2(x, y)$  – верхньою межею інтегрування за змінною  $z$ , і для будь-якої неперервної в області  $G$  функції  $f(x, y, z)$  має місце формула

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz. \quad (1.39)$$

У внутрішньому інтегралі змінні  $x, y$  вважають сталими. Після його обчислення одержимо вираз, що залежить лише від  $x$  і  $y$ .

Якщо область  $D$  є правильною в напрямку осі  $Oy$ , тобто,

$$D = \{\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\},$$

де  $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$  – неперервні функції на відрізку  $[a, b]$ , то

$$\iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz. \quad (1.40)$$

Таким чином, із формул (1.39) і (1.40) одержимо

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz. \quad (1.41)$$

Порядок інтегрування може бути й іншим. Якщо область  $D$  правильна у напрямку осі  $Ox$ , тобто

$$D = \{\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\},$$

де  $\psi_1(y)$  і  $\psi_2(y)$  – неперервні функції на відрізку  $[c, d]$ , то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} dx \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz. \quad (1.42)$$

Зокрема, якщо областю інтегрування є паралелепіпед

$$G = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, k \leq z \leq l\},$$

то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_c^d dy \int_k^l f(x, y, z) dz. \quad (1.43)$$

У цьому випадку інтегрування виконується в будь-якому порядку, оскільки область  $G$  правильна у напрямку всіх трьох координатних осей  $Ox, Oy, Oz$ .

**Приклад 1.17.** Обчислити потрібний інтеграл  $\iiint_G (x - y - z) dx dy dz$  по області  $G$ , обмеженій площинами  $x = -1, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 2$ .

*Розв'язок.*

Оскільки область інтегрування  $G$  – паралелепіпед:  $G = \{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ , то за формулою (1.43) маємо

$$\begin{aligned} \iiint_G (x - y - z) dx dy dz &= \int_{-1}^1 dx \int_0^1 dy \int_0^2 (x - y - z) dz = \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_0^1 \left( (x - y)z - \frac{z^2}{2} \right) \Big|_0^2 dy = \\ &= 2 \int_{-1}^1 dx \int_0^1 (x - y - 1) dy = 2 \int_{-1}^1 \left( (x - 1)y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 dx = \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left( x - \frac{3}{2} \right) dx = -6. \end{aligned}$$

**Приклад 1.18.** Обчислити інтеграл

$$I = \iiint_G z dx dy dz,$$

де область  $G$  обмежена верхньою половиною еліпсоїда  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$  і площиною  $Oxy$ .

*Розв'язок.*

Проекцією області інтегрування  $G$  на координатну площину  $Oxy$  є еліпс  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ . Тому межами зміни  $x$  є числа  $-a$  і  $a$ , при фіксованому ж  $x$  змінна  $y$  змінюється від  $-\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$  до  $+\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ . Оскільки  $G$  обмежена знизу координатною площиною  $Oxy$ , а зверху – поверхнею еліпсоїда, то при фіксованих  $x$  і  $y$  апліката  $z$  буде змінюватися в межах від 0 до  $c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ .

Застосовуючи формулу (1.40), одержимо

$$I = \int_{-a}^a dx \int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}}^{+\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}} dy \int_0^{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} z dz = \frac{c^2}{2} \int_{-a}^a dx \int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}}^{+\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}} \left( 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) dy =$$

враховуючи парність підінтегральної функції

$$\begin{aligned}
 &= c^2 \int_{-a}^a dx \int_0^{+\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right) dy = \frac{2bc^2}{3a^3} \int_{-a}^a (a^2 - x^2)^{3/2} dx \\
 &= \frac{4bc^2}{3a^3} \int_0^a (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \left. \begin{array}{l} x = a \sin t \\ dx = a \cos t dt \\ t = \arcsin \frac{x}{a} \end{array} \right| = \frac{4abc^2}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \\
 &= \frac{abc^2}{3} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t)^2 dt = \frac{\pi}{4} abc^2.
 \end{aligned}$$

**Приклад 1.19.** Обчислити масу  $m$  тіла, обмеженого площинами  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y + z = 2$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$ , якщо його густина  $\rho(x, y, z) = x + 2z$  (рис. 1.22).

Розв'язок.




Рис. 1.22

Проекцією тіла на координатну площину  $Oxy$  є фігура  $OACB$ , утворена прямими  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$ . Зрозуміло, змінні  $x$  та  $y$  змінюються в межах від 0 до 1. При фіксованих  $x$ ,  $y$  точка може рухатися по вертикалі від площини  $z = 0$  до площини  $x + y + z = 2$ ; таким чином апліката  $z$  буде змінюватися в межах від 0 до  $2 - x - y$ .

Тоді згідно формули (1.30), маємо

$$m = \iiint_G \rho(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{2-x-y} (x + 2z) dz.$$

Послідовно обчислюючи інтеграли, одержимо

$$\begin{aligned}
 m &= \int_0^1 dx \int_0^1 (xz + z^2) \Big|_0^{2-x-y} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (y^2 + xy - 2x - 4y - 4) dy = \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{y^3}{3} + \frac{xy^2}{2} - 2xy - 2y^2 + 4y \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \left( -\frac{3x^2}{4} + \frac{7x}{3} \right) dx = \frac{19}{12}.
 \end{aligned}$$

### 1.2.4. Заміна змінної в потрійному інтегралі

Розглянемо потрійний інтеграл  $\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz$ , функція  $f(x, y, z)$  неперервна в просторовій області  $G$ . Нехай неперервно диференційовні функції  $x = x(u, v, w)$ ,  $y = y(u, v, w)$ ,  $z = z(u, v, w)$  здійснюють взаємно однозначне відображення замкненої обмеженої області  $G$  простору  $(x, y, z)$  на область  $G^*$  простору  $(u, v, w)$ . Тоді має місце **формула заміни змінних у потрійному інтегралі**:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{G^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw, \quad (1.44)$$

де якобіан переходу в області  $G^*$  не дорівнює нулю:

$$J = J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (1.45)$$

На практиці найчастіше застосовують перехід від декартових координат до циліндричних або сферичних координат.

Циліндричні координати  $\rho, \varphi, z$  пов'язані з декартовими  $x, y, z$  співвідношеннями:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, & y &= \rho \sin \varphi, & z &= z, \\ 0 &\leq \rho < +\infty, & 0 &\leq \varphi < 2\pi, & -\infty &< z < +\infty. \end{aligned}$$

У цьому випадку якобіан переходу рівний

$$J = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho. \quad (1.46)$$

Тоді формула заміни змінних у потрійному інтегралі (1.49) при переході до циліндричних координат має вигляд:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{G^*} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz. \quad (1.47)$$

Звернемо увагу на те, що циліндричну систему координат зручно використовувати, коли область інтегрування обмежена циліндричними, параболічними поверхнями прямолінійні твірні яких, наприклад, паралельні осі  $Oz$  та площинами перпендикулярними до площини  $Oxy$ .



При переході до сферичної системи координат

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin \theta \cos \varphi, & y &= \rho \sin \theta \sin \varphi, & z &= \rho \cos \theta, \\0 &\leq \rho < +\infty, & 0 &\leq \varphi < 2\pi, & 0 &\leq \theta \leq \pi,\end{aligned}$$

якобіан переходу рівний

$$J = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta & 0 & -\rho \sin \theta \end{vmatrix} = -\rho^2 \sin \theta. \quad (1.48)$$

Тому має місце формула:

$$\begin{aligned}\iiint_G f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{G^*} f(\rho \sin \theta \cos \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \theta) \times \\ &\times \rho^2 \sin \theta \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.\end{aligned} \quad (1.49)$$

Переходити до сферичних координат зручно, коли областю інтегрування є куля (рівняння її межі  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  у сферичних координатах має вигляд  $\rho = R$ ) або її частина, а також якщо підінтегральна функція містить вираз  $x^2 + y^2 + z^2$ .

## РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: Підручник. – Київ: Знання, 2007. – 454 с.
2. Бабич М.Д., Куприков С.І. Вища математика: Ч. 1. – Київ: Київський славістичний університет, 2003, - 64 с.
3. Призва Г.Н., Плахотник В.В., Гординський Л.Д. та ін. Вища математика: Підручник: у 2 ч. Ч. 1: Основні розділи – Київ: Либідь, 2003 – 400 с.
4. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 546 с.
5. Барковський В.В., Барковська Н.В. Матиматика для економістів. Вища математика. – Київ: Національна академія управління, 1999. – 399 с.
6. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 1993. – 648 с.
7. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Збірник задач. – Київ: Видавництво А.С.К., 2003. – 480 с.
8. Гаврильченко Х.І., Полушкін С.П., Кропив'янський П.С. та ін. Вища математика: Збірник задач: У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення. – Київ: Техніка, 2004. – 279 с.