

УДК 512.544

I. В. Шапочка (Ужгородський нац. ун-т)

ПРО ЧЕРНІКОВСЬКІ p -ГРУПИ, ФАКТОР-ГРУПА ЯКИХ ЗА МАКСИМАЛЬНОЮ ПОВНОЮ АБЕЛЕВОЮ ПІДГРУПОЮ Є АБЕЛЕВОЮ ГРУПОЮ ТИПУ (p, p)

Let H be the abelian p -group of the type (p, p) and \mathbb{Z}_p be the ring of p -adic integers. Let \mathcal{V} be the set of all indecomposable matrix \mathbb{Z}_p -representations of the group H with no more two irreducible components. The extensions of an arbitrary divisible abelian p -group M with minimality conditions by the group H , which are determined by representations from the set \mathcal{V} , have been classified up to isomorphism.

Класифікуються з точністю до ізоморфізму всі черніковські p -групи, фактор-група H яких за максимальною повною абелевою підгрупою є абелевою групою типу (p, p) і які визначаються нерозкладними матричними \mathbb{Z}_p -зображеннями групи H , що містять не більше двох незвідних компонент.

Нехай M — повна абелева p -група з умовою мінімальності. В [1, 2] за допомогою теорії цілочислових p -адичних зображень скінченних груп вивчаються черніковські p -групи $G(M, H, \Gamma)$, які є розширеннями групи M за допомогою скінченної p -групи H і які визначаються матричними зображеннями Γ групи H над кільцем \mathbb{Z}_p цілих p -адичних чисел. Зокрема з точністю до ізоморфізму класифіковані всі такі розширення, коли H — циклічна p -група порядку p^s , а Γ пробігає множину всіх матричних \mathbb{Z}_p -зображень групи H , що містять не більше k ($k \leq 3$) незвідних компонент $\Delta_1, \dots, \Delta_k$, причому у випадку $k = 3$ зображення Δ_1 є одиничним. Показано також, що задача класифікації всіх неізоморфних черніковських p -груп вигляду $G(M, H, \Gamma)$, де Γ пробігає множину всіх матричних \mathbb{Z}_p -зображень p -групи H , що містять k нееквівалентних незвідних компонент, є дикою (тобто включає задачу описання з точністю до подібності пар $n \times n$ -матриць над деяким полем для довільного натурального n), якщо виконується одна із наступних умов:

- 1) H — циклічна p -група порядку p^s , $s > 3$, $k > 4$;
- 2) H — циклічна p -група порядку p^s , $s > 2$, $k = 3$, $p > 3$ і степінь зображення Δ_i більше 1 ($i = 1, 2, 3$);
- 3) H — циклічна p -група порядку p^s , $s > 2$, $k > 3$, $p > 2$;
- 4) H — нециклічна p -група, $k > 4$.

Відзначимо, що в [3] описані всі неізоморфні черніковські p -групи вигляду $G(M, H, \Gamma)$, де Γ пробігає множину всіх цілком звідних матричних \mathbb{Z}_p -зображень циклічної p -груп H . А в [4] класифіковані з точністю до ізоморфізму всі черніковські p -групи вигляду $G(M, H, \Gamma)$, де Γ пробігає множину матричних \mathbb{Z}_p -зображень циклічної p -групи H , які є сумаю нерозкладних матричних зображень групи H , що містять не більше двох незвідних компонент.

В цій статті за допомогою теорії цілочислових p -адичних зображень скінченних груп дається описання всіх неізоморфних черніковських p -груп, фактор-група H яких за максимальною повною абелевою підгрупою є абелевою групою типу (p, p) і які визначаються нерозкладними матричними \mathbb{Z}_p -зображеннями групи H , що містять не більше двох незвідних компонент.

Нехай надалі $M^{(n)}$ — зовнішня пряма сума n екземплярів квазіциклічної p -групи C_{p^∞} , тобто

$$M^{(n)} = C_{p^\infty} \dot{+} C_{p^\infty} \dot{+} \cdots \dot{+} C_{p^\infty}, \quad (1)$$

Добре відомо [5], що група автоморфізмів групи $M^{(n)}$ ізоморфна повній лінійній групі $GL(n, \mathbb{Z}_p)$. Звідси і теорії розширень груп [5] випливає, що всяка черніковська група G , що є розширенням групи $M^{(n)}$ за допомогою скінченної групи H визначається деяким матричним \mathbb{Z}_p -зображенням $\Gamma : h \rightarrow \Gamma_h$ ($h \in H$) та деякою системою факторів $\{\mu_{u,v} \in M^{(n)} \mid u, v \in H\}$. Таку черніковську групу G будемо позначати через $G(M^{(n)}, H, \Gamma, \{\mu_{u,v}\})$.

Відомо (див. наприклад [6]), що якщо H є циклічною групою з твірним елементом a порядку s , то розширення $G(M^{(n)}, H, \Gamma, \{\mu_{u,v}\})$ еквівалентне (отже, ізоморфне) розширенню $G(M^{(n)}, H, \Gamma, \{\nu_{u,v}\})$ з більш простішою системою факторів $\{\nu_{u,v}\}$ такою, що

$$\nu_{ia, ja} = \begin{cases} 0, & \text{якщо } i + j < s; \\ m_0, & \text{якщо } i + j \geq s \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, \dots, s-1),$$

де m_0 — деякий елемент групи $M^{(n)}$ такий, що $\Gamma_a(m_0) = m_0$ (див. познач. (2)). Це дає змогу дати більш просту характеристику ізоморфізму таких розширень, зокрема як це зроблено в [1].

Розглянемо аналогічне питання ізоморфізму розширень вигляду $G(M^{(n)}, H, \Gamma, \{\mu_{u,v}\})$, у випадку коли H є абелевою p -групою типу (p, p) . Відзначимо, що задача класифікація неізоморфних розширень груп у загальному випадку вивчалась в [7].

Нехай надалі $\{c_r \mid r = 0, 1, \dots\}$ — твірні елементи групи C_{p^∞} , причому $pc_0 = 0$, $pc_r = c_{r-1}$ ($r \in \mathbb{N}$). Якщо $A = \|\alpha_{ij}\| \in GL(n, \mathbb{Z}_p)$ і $m = (m_1, \dots, m_n) \in M^{(n)}$, де

$$\alpha_{ij} = x_{ij}^{(0)} + x_{ij}^{(1)}p + x_{ij}^{(2)}p^2 + \cdots \in \mathbb{Z}_p, \quad (0 \leq x_{ij}^{(r)} < p),$$

$$m_j = y_0^{(j)}c_0 + y_1^{(j)}c_1 + \cdots + y_{k_j}^{(j)}c_{k_j} \in C_{p^\infty} \quad (0 \leq y_i^{(s)} < p),$$

то

$$A(m) = (m'_1, \dots, m'_n), \quad (2)$$

де, у свою чергу,

$$m'_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}(m_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{r=0}^{k_j} \sum_{s=0}^{k_j} x_{ij}^{(r)} y_s^{(j)} p^r c_s \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Нехай $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ — абелева група типу (p, p) і

$$\Gamma : ia + jb \rightarrow \Gamma_a^i \Gamma_b^j \quad (i, j = 0, 1, \dots, p-1)$$

— деяке матричне \mathbb{Z}_p -зображення групи H степеня n . Ведемо наступні позначення:

$$\Lambda_{q,r} = (E + \Gamma_a + \cdots + \Gamma_a^{q-1})(E + \Gamma_b + \cdots + \Gamma_b^{r-1}),$$

де E — одинична матриця порядку n , а q і r — деякі натуральні числа (додатково, за домовленістю, вважатимемо $\Lambda_{0,r} = \Lambda_{q,0} = E$); для довільного цілого числа k через k' та \bar{k} будемо позначати відповідно частку та залишок при діленні числа k на p .

Лема 1. Нехай $M^{(n)}$ — група вигляду (1), $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ — абелева група типу (p, p) та $\Gamma : ia + jb \rightarrow \Gamma_a^i \Gamma_b^j$ — деяке матричне \mathbb{Z}_p -зображення групи H . Якщо елементи α, β, γ групи $M^{(n)}$ задовільняються рівностям

$$\Gamma_a(\alpha) = \alpha, \quad \Gamma_b(\alpha) = \alpha - \Lambda_{p,1}(\gamma), \quad (3)$$

$$\Gamma_b(\beta) = \beta, \quad \Gamma_a(\beta) = \beta + \Lambda_{1,p}(\gamma), \quad (4)$$

то $\{\nu_{ia+jb, ka+lb} \mid i, j, k, l \in \{0, 1, \dots, p-1\}\}$, де

$$\nu_{ia+jb, ka+lb} = (i+k)' \alpha + (j+l)' \beta + (-(i+k)' \Lambda_{p, \overline{j+l}} + \Lambda_{k,j} \Gamma_b^l)(\gamma), \quad (5)$$

є системою факторів деякого розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою групи H , що визначається зображенням Γ групи H .

Доведення. Нескладно показати, що якщо виконуються умови леми, то для довільних елементів u, v, w групи H справедлива рівність

$$\nu_{u+v,w} + \Gamma_w(\nu_{u,v}) = \nu_{u,v+w} + \nu_{v,w}.$$

Це означає, що $\{\nu_{u,v} \mid u, v \in H\}$, де $\nu_{u,v}$ визначено рівністю (5), є системою факторів деякого розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою групи H , що визначається зображенням Γ групи H .

Лема 2. Нехай виконуються умови леми 1. Тоді довільне розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою групи H , що визначається зображенням Γ групи H , еквівалентне розширенню $G(M^{(n)}, H, \Gamma, \{\nu_{u,v}\})$, де $\{\nu_{u,v}\}$ — система факторів вигляду (5).

Доведення. Припустимо, що G є деяким розширенням групи $M^{(n)}$ за допомогою групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$, що визначається матричним зображенням $\Gamma : ia + jb \rightarrow \Gamma_a^i \Gamma_b^j$ групи H . Нехай \bar{a} і \bar{b} — представники суміжних класів групи G за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають твірним елементам a і b групи H . Тоді для довільного елемента m із $M^{(n)}$

$$\Gamma_a(m) = -\bar{a} + m + \bar{a}, \quad \Gamma_b(m) = -\bar{b} + m + \bar{b}.$$

Покладемо $\alpha = p\bar{a}$, $\beta = p\bar{b}$, $\gamma = -\bar{b} - \bar{a} + \bar{b} + \bar{a}$. Оскільки

$$p(\bar{a} + M^{(n)}) = M^{(n)}, \quad p(\bar{b} + M^{(n)}) = M^{(n)},$$

$$(\bar{a} + M^{(n)}) + (\bar{b} + M^{(n)}) = (\bar{b} + M^{(n)}) + (\bar{a} + M^{(n)}),$$

то α, β, γ є елементами підгрупи $M^{(n)}$ групи G .

Обчислимо

$$\Gamma_a(\alpha) = -\bar{a} + \alpha + \bar{a} = -\bar{a} + p\bar{a} + \bar{a} = p\bar{a} = \alpha,$$

$$\begin{aligned} \Gamma_b(\alpha) &= -\bar{b} + p\bar{a} + \bar{b} = p(-\bar{b} + \bar{a} + \bar{b}) = p(\bar{a} - \gamma) = \\ &= p\bar{a} - \Gamma_a^{p-1}(\gamma) - \cdots - \Gamma_a^2(\gamma) - \Gamma_a(\gamma) - \gamma = \alpha - \Lambda_{p,1}(\gamma). \end{aligned}$$

Аналогічно доводиться, що

$$\Gamma_b(\beta) = \beta, \quad \Gamma_a(\beta) = \beta + \Lambda_{1,p}(\gamma).$$

Отже, трійка елементів α, β, γ групи $M^{(n)}$ задовольняє рівностям (3), (4).

Далі, розглянемо представники $i\bar{a} + j\bar{b}$ суміжних класів групи G за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають елементам $ia + jb$ групи H ($i, j = 0, 1, \dots, p - 1$). Вибір цих представників задає систему факторів $\{\nu_{ia+jb, ka+lb}\}$ таку, що

$$(i\bar{a} + j\bar{b}) + (k\bar{a} + l\bar{b}) = \overline{i+k} \cdot \bar{a} + \overline{j+l} \cdot \bar{b} + \nu_{ia+jb, ka+lb}$$

($i, j, k, l = 0, 1, \dots, p - 1$). Нескладно показати, що ця система факторів є системою факторів вигляду (5). Лема доведена.

Із лем 1 та 2 випливає, що довільне розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою абелевої групи H типу (p, p) може бути задане \mathbb{Z}_p -зображенням Γ степеня n групи H та трійкою елементів α, β, γ із $M^{(n)}$, які задовольняють рівностям (3), (4). Тому надалі таке розширення будемо позначати просто через $G(\Gamma, \alpha, \beta, \gamma)$ і вважатимемо, що система факторів цього розширення є системою факторів вигляду (5). Із теорії розширень груп (див. [5,6]) слідує, що розширення $G(\Gamma, \alpha, \beta, \gamma)$ та $G(\Gamma, \hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma})$ еквівалентні тоді і тільки тоді, коли знайдуться такі елементи m_1 і m_2 групи $M^{(n)}$, що

$$\hat{\alpha} = \alpha + \Lambda_{p,1}(m_1), \quad \hat{\beta} = \beta + \Lambda_{1,p}(m_1), \quad \hat{\gamma} = \gamma + (E - \Gamma_b)(m_1) + (\Gamma_a - E)(m_2).$$

Для довільного \mathbb{Z}_p -зображення $\Gamma : h \rightarrow \Gamma_h$ степеня n абелевої групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ типу (p, p) розглянемо підгрупи $A(M^{(n)}, H, \Gamma)$, $B(M^{(n)}, H, \Gamma)$ групи $M^{(3n)}$ вигляду

$$A(M^{(n)}, H, \Gamma) = \{(\alpha, \beta, \gamma) \in M^{(3n)} \mid \Gamma_a(\alpha) = \alpha, \Gamma_b(\alpha) = \alpha - \Lambda_{p,1}(\gamma), \\ \Gamma_b(\beta) = \beta, \Gamma_a(\beta) = \beta + \Lambda_{1,p}(\gamma)\}, \quad (6)$$

$$B(M^{(n)}, H, \Gamma) = \{(\Lambda_{p,1}(m_1), \Lambda_{1,p}(m_2), (E - \Gamma_b)(m_1) + (\Gamma_a - E)(m_2)) \mid \\ m_1, m_2 \in M^{(n)}\}. \quad (7)$$

Неважко бачити, що $B(M^{(n)}, H, \Gamma)$ є підгрупою групи $A(M^{(n)}, H, \Gamma)$.

Підсумувавши все вище сказане та використавши позначення (6) і (7), можна стверджувати, що будь-яке розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою абелевої групи H типу (p, p) може бути задане матричним \mathbb{Z}_p -зображенням Γ степеня n групи H та елементом (α, β, γ) групи $A(M^{(n)}, H, \Gamma)$. Причому розширення $G(\Gamma, \alpha, \beta, \gamma)$ та $G(\Gamma, \hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma})$ еквівалентні тоді і тільки тоді, коли

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}) - (\alpha, \beta, \gamma) \in B(M^{(n)}, H, \Gamma).$$

Лема 3. *Нехай $G_1 = G(\Gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ та $G_2 = G(\Gamma, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ – розширення групи $M^{(n)}$ за допомогою абелевої групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ типу (p, p) , задані матричним \mathbb{Z}_p -зображенням Γ степеня n групи H та відповідно елементами $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ та $(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ групи $A(M^{(n)}, H, \Gamma)$. Групи G_1 та G_2 ізоморфні тоді і тільки тоді, коли знайдеться така матриця $C \in GL(n, \mathbb{Z}_p)$ і автоморфізм $\varphi \in \text{Aut } H$ ($\varphi : a \rightarrow ia + jb, b \rightarrow ka + lb$), що $C\Gamma_h C^{-1} = \Gamma_{\varphi(h)}$ для довільного $h \in H$*

$$(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1) - (\tilde{\alpha}_2, \tilde{\beta}_2, \tilde{\gamma}_2) \in B(M^{(n)}, H, \Gamma), \quad (8)$$

де

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha}_2 &= C^{-1} \left(i\alpha_2 + j\beta_2 + \left(\sum_{r=1}^{p-1} \Lambda_{ri,j} \Gamma_b^{rj} \right) (\gamma_2) \right), \\ \tilde{\beta}_2 &= C^{-1} \left(k\alpha_2 + l\beta_2 + \left(\sum_{r=1}^{p-1} \Lambda_{rk,l} \Gamma_b^{rl} \right) (\gamma_2) \right), \\ \tilde{\gamma}_2 &= C^{-1} (\Lambda_{i,l} \Gamma_b^j - \Lambda_{k,j} \Gamma_b^l) (\gamma_2).\end{aligned}$$

Доведення. Нехай групи $G_1 = G(\Gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ та $G_2 = G(\Gamma, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ ізоморфні і ψ — ізоморфне відображення групи G_1 на G_2 . Тоді з [2] (див. лему 1) випливає, що існують матриця $C \in GL(n, \mathbb{Z}_p)$ та автоморфізм φ групи H ($\varphi : a \rightarrow ia + jb, b \rightarrow ka + lb$), що $C\Gamma_h = \Gamma_{\varphi(h)}C$ для довільного елемента $h \in H$.

Нехай \bar{a} і \bar{b} — представники суміжних класів групи G_2 за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають твірним елементам a і b групи H . Розглянемо елементи $i\bar{a} + j\bar{b}, k\bar{a} + l\bar{b}$ групи G_2 . Обчислимо

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha}_2 &= p(i\bar{a} + j\bar{b}) = i\alpha_2 + j\beta_2 + \left(\sum_{r=1}^{p-1} \Lambda_{ri,j} \Gamma_b^{rj} \right) (\gamma_2), \\ \tilde{\beta}_2 &= p(k\bar{a} + l\bar{b}) = k\alpha_2 + l\beta_2 + \left(\sum_{r=1}^{p-1} \Lambda_{rk,l} \Gamma_b^{rl} \right) (\gamma_2), \\ \tilde{\gamma}_2 &= -(k\bar{a} + l\bar{b}) - (i\bar{a} + j\bar{b}) + (k\bar{a} + l\bar{b}) + i\bar{a} + j\bar{b} = (\Lambda_{i,l} \Gamma_b^j - \Lambda_{k,j} \Gamma_b^l) (\gamma_2).\end{aligned}$$

Оскільки $ia + jb, ka + lb$ є твірними елементами групи H , то групу G_2 можна записати у вигляді $G(\Gamma', \tilde{\alpha}_2, \tilde{\beta}_2, \tilde{\gamma}_2)$, де $\Gamma' : h \rightarrow \Gamma_{\varphi(h)}$ ($h \in H$). Отже, група $G_1 = G(\Gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ ізоморфна групі $G_2 = G(\Gamma', \tilde{\alpha}_2, \tilde{\beta}_2, \tilde{\gamma}_2)$, причому ізоморфізм ψ переводить один в одного суміжні класи груп G_1 та G_2 за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають одному і тому ж елементу групи H . Оскільки $C^{-1}\Gamma'_h = \Gamma_h C^{-1}$ для довільного елемента $h \in H$, то з [2] (див. лему 2) випливає, що існує ізоморфізм груп

$$G_2 = G(\Gamma', \tilde{\alpha}_2, \tilde{\beta}_2, \tilde{\gamma}_2) \cong G(\Gamma, C^{-1}(\tilde{\alpha}_2), C^{-1}(\tilde{\beta}_2), C^{-1}(\tilde{\gamma}_2)) = G_3$$

такий, що знову переводить один в одного суміжні класи груп G_2 та G_3 за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають одному і тому ж елементу групи H . Отже, розширення $G(\Gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ та $G(\Gamma, C^{-1}(\tilde{\alpha}_2), C^{-1}(\tilde{\beta}_2), C^{-1}(\tilde{\gamma}_2))$ еквівалентні. Тобто

$$(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1) - (C^{-1}(\tilde{\alpha}_2), C^{-1}(\tilde{\beta}_2), C^{-1}(\tilde{\gamma}_2)) \in B(M^{(n)}, H, \Gamma).$$

Необхідність доведена.

Навпаки, нехай існують оборотна матриця C і автоморфізм φ групи H ($\varphi : a \rightarrow ia + jb, b \rightarrow ka + lb$), що $C\Gamma_h = \Gamma_{\varphi(h)}C$ для довільного $h \in H$ і для елементів $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1), (\alpha_2, \beta_2, \gamma_2) \in A(M^{(n)}, H, \Gamma)$ виконується умова (8). Припустимо, що \bar{a} і \bar{b} (\bar{a} і \bar{b}) є представниками суміжних класів групи $G_1 = G(\Gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ ($G_2 = G(\Gamma, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$) за підгрупою $M^{(n)}$, що відповідають елементам a і b групи H . Тоді нескладно показати, що відображення $\psi : G_1 \rightarrow G_2$, задане наступним чином

$$\psi(q\bar{a} + r\bar{b} + m) = (qi + rk)\bar{a} + (qj + rl)\bar{b} + C(m),$$

де $q, r \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $m \in M^{(n)}$, є ізоморфізмом груп G_1 та G_2 . Лема доведена.

До кінця роботи введемо наступні позначення: E — одинична матриця порядку $p - 1$; $\tilde{\varepsilon}$ та $\langle 1 \rangle$ — відповідно матриця порядку $p - 1$ та $(p - 1) \times 2$ -матриця вигляду

$$\tilde{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \langle 1 \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ — матричні \mathbb{Z}_p -зображення абелевої групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ типу (p, p) вигляду

$$\Gamma_1 : a \rightarrow 1, b \rightarrow 1; \quad (9)$$

$$\Gamma_2 : a \rightarrow \tilde{\varepsilon}, b \rightarrow E; \quad (10)$$

$$\Gamma_3 : a \rightarrow \begin{pmatrix} \tilde{\varepsilon} & \langle 1 \rangle \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b \rightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (11)$$

$$\Gamma_4 : a \rightarrow \begin{pmatrix} \tilde{\varepsilon} & 0 \\ 0 & \tilde{\varepsilon} \end{pmatrix}, b \rightarrow \begin{pmatrix} \tilde{\varepsilon} & E \\ 0 & E \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Теорема 1. *Множина всіх неізоморфних черніковських p -груп, що є нерозщеплюваними розширеннями прямої суми скінченного числа екземплярів квазіцикличної p -групи $C_{p^\infty} = \langle c_0, c_1, \dots \rangle$ за допомогою абелевої групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ типу (p, p) і які визначаються нерозкладними \mathbb{Z}_p -зображеннями групи H , що містять не більше двох незвідних компонент, вичерпується наступними групами: $G_1 = G(\Gamma_1, 0, 0, c_0)$, $G_2 = G(\Gamma_2, 0, 0, v)$, $G_3 = G(\Gamma_2, \omega, 0, 0)$, $G_4 = G(\Gamma_4, \omega', 0, 0)$, $G_5 = G(\Gamma_4, 0, \omega', 0)$, де $v = (c_0, 0, 0, \dots, 0)$, $\omega = (c_0, 2c_0, 3c_0, \dots, (p-1)c_0)$ — елементи групи $M^{(p-1)}$; $\omega' = (c_0, 2c_0, \dots, (p-1)c_0, 0, \dots, 0)$ — елемент групи $M^{2(p-1)}$.*

Доведення. Нехай G — черніковська p -група, що є розширенням групи $M^{(n)}$ вигляду (1) за допомогою абелевої групи $H = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle$ типу (p, p) і яка визначається нерозкладним матричним \mathbb{Z}_p -зображенням Γ групи H , що містить не більше двох незвідних компонент. Тоді групу G можна записати у вигляді $G = G(\Gamma, \alpha, \beta, \gamma)$, де (α, β, γ) — деякий елемент групи $A(M^{(n)}, H, \Gamma)$.

Із [8] слідує, що зображення Γ групи H узагальнено еквівалентне (див. [2] означення 1) одному із зображень (9)–(12). Тоді із [2] (лема 2) випливає, що група $G = G(\Gamma, \alpha, \beta, \gamma)$ ізоморфна групі вигляду $G(\Gamma', \alpha', \beta', \gamma')$, де $\Gamma' \in \{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4\}$, причому, якщо $\Gamma'' \in \{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4\}$ і $\Gamma' \neq \Gamma''$, то групи $G(\Gamma', \alpha', \beta', \gamma')$ та $G(\Gamma'', \alpha'', \beta'', \gamma'')$ — не ізоморфні.

Далі, розглянемо окремо можливі випадки для зображення Γ' .

Нехай $\Gamma' = \Gamma_1$. Неважко бачити,

$$A(M^{(1)}, H, \Gamma_1)/B(M^{(1)}, H, \Gamma_1) = \langle (0, 0, c_0) + B(M^{(1)}, H, \Gamma_1) \rangle.$$

Звідси і леми 3 одразу одержуємо, що довільне нерозщеплюване розширення квазіцикличної p -групи $M^{(1)} = C_{p^\infty}$ за допомогою групи H , що визначається зображенням Γ_1 групи H , ізоморфне групі $G(\Gamma_1, 0, 0, c_0)$.

Нехай тепер $\Gamma' = \Gamma_2$. Нескладно обчислити, що

$$\begin{aligned} A(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2) &= \{k\omega, pm, (\varepsilon - E)m + m') \mid m, m' \in M^{(p-1)}, \\ &\quad k \in \{0, 1, \dots, p-1\}, pm' = 0\}, \\ B(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2) &= \{0, pm, (\varepsilon - E)m) \mid m \in M^{(p-1)}\}. \end{aligned}$$

Тому

$$\begin{aligned} A(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2)/B(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2) &= \\ &= \langle (0, 0, v) + B(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2) \rangle \oplus \langle (\omega, 0, 0) + B(M^{(p-1)}, H, \Gamma_2) \rangle. \end{aligned}$$

Тоді знову таки ж за лемою 3 нерозщеплюване розширення вигляду $G(\Gamma_2, \alpha', \beta', \gamma')$ ізоморфне одній із груп $G(\Gamma_2, \omega, 0, 0)$ або $G(\Gamma_2, k\omega, 0, v)$, де $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Розглянемо автоморфізм $\varphi : a \rightarrow a + kb, b \rightarrow b$ групи H . Оскільки $(\Gamma_2)_h = (\Gamma_2)_{\varphi(h)}$ для довільно $h \in H$ і $k\omega = \sum_{r=1}^{p-1} \Lambda_{r,k}(\Gamma_2)_b^{rk}(v)$, то за лемою 3 одержимо, що для довільного $l \in \{1, \dots, p-1\}$ група $G(\Gamma_2, l\omega, 0, v)$ ізоморфна групі $G(\Gamma_2, 0, 0, v)$. Неважко бачити, що група $G(\Gamma_2, \omega, 0, 0)$ не ізоморфна групі $G(\Gamma_2, 0, 0, v)$.

У випадку, коли $\Gamma' = \Gamma_3$, обчислюючи групи $A(M^{(p)}, H, \Gamma_3)$ та $B(M^{(p)}, H, \Gamma_3)$, одержимо, що

$$A(M^{(p)}, H, \Gamma_3) = B(M^{(p)}, H, \Gamma_3).$$

Це означає, що довільне розширення групи $M^{(p)}$ за допомогою групи H , яке визначається зображенням Γ_3 групи H , є розщеплюваним.

Нарешті розглянемо випадок, коли $\Gamma' = \Gamma_4$. Неважко бачити, що

$$\begin{aligned} A(M^{2(p-1)}, H, \Gamma_4)/B(M^{2(p-1)}, H, \Gamma_4) &= \\ &= \langle (\omega', 0, 0) + B(M^{2(p-1)}, H, \Gamma_4) \rangle \oplus \langle (0, \omega', 0) + B(M^{2(p-1)}, H, \Gamma_4) \rangle. \end{aligned}$$

Тоді аналогічно як у попередньому випадку одержимо, що нерозщеплюване розширення вигляду $G(\Gamma_4, \alpha', \beta', \gamma')$ ізоморфне одній із груп $G(\Gamma_4, \omega', 0, 0)$ або $G(\Gamma_2, k\omega', \omega', 0)$, де $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.

Розглянемо автоморфізм $\varphi : a \rightarrow a, b \rightarrow a + (p-1)b$ групи H та матрицю

$$C = \begin{pmatrix} E & 0 \\ E - \tilde{\varepsilon} & -E \end{pmatrix}.$$

Оскільки $C(\Gamma_4)_h = (\Gamma_4)_{\varphi(h)}C$ для довільно $h \in H$ і $C^{-1}(\omega') = \omega'$, то за лемою 3 група $G(\Gamma_4, \omega', \omega', 0)$ ізоморфна групі $G(\Gamma_4, \omega', 0, 0)$.

Далі, нехай $k \in \{2, 3, \dots, p-1\}$. Покладемо

$$i \equiv (1-k)^{-1} \pmod{p}, \quad j \equiv 1-i \pmod{p}, \quad \varphi : a \rightarrow ia + jb, \quad b \rightarrow b,$$

$$\tilde{\xi}_j = E + \tilde{\varepsilon} + \tilde{\varepsilon}^2 + \dots + \tilde{\varepsilon}^{j-1}, \quad C = \begin{pmatrix} E & S \\ 0 & E + (E - \tilde{\varepsilon})S \end{pmatrix},$$

де S — оборотна \mathbb{Z}_p -матриця порядку $p-1$, що задовольняє рівності

$$\tilde{\varepsilon}^i S + \tilde{\varepsilon}^i \tilde{\xi}_j = S \tilde{\varepsilon}.$$

Існування матриці S випливає з [9]. Оскільки $\varphi \in$ автоморфізмом групи H , $C(\Gamma_4)_h = (\Gamma_4)_{\varphi(h)}C$ для довільно $h \in H$ і $C^{-1}(ik\omega' + j\omega') = 0$, $C^{-1}(\omega') = \omega'$, то за лемою 3 група $G(\Gamma_4, k\omega', \omega', 0)$ ізоморфна групі $G(\Gamma_4, 0, \omega', 0)$.

На завершення доведення теореми, нескладно переконатися у тому, що групи $G(\Gamma_4, \omega', 0, 0)$ та $G(\Gamma_4, 0, \omega', 0)$ не ізоморфні.

Зауваження 1. Для того, щоб одержати повний список неізоморфних черниківських p -груп, фактор-група H яких за максимальною повною абелевою підгрупою є абелевою групою типу (p, p) і які визначаються нерозкладним матричними \mathbb{Z}_p -зображеннями групи H , що містять не більше двох незвідніх компонент, потрібно до переліку груп, вказаному у теоремі 1, додати групи вигляду $G(\Gamma_1, 0, 0, 0)$, $G(\Gamma_2, 0, 0, 0)$, $G(\Gamma_3, 0, 0, 0)$, $G(\Gamma_4, 0, 0, 0)$.

1. Гудивок П. М., Ващук Ф. Г., Дроботенко В. С. Черниковские p -группы и целочисленные p -адические представления конечных групп // Укр. мат. журн. – 1992. – 44, №6.– С. 742–753.
2. Гудивок П. М., Шапочка І. В. О черниковских p -группах // Укр. мат. журн. – 1999. – 51, №3.– С. 291–304.
3. Hartley B. A dual approach to Chernikov modules // Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. – 1977. – Р. 215–239.
4. Шапочка І. В. О p -группах Черникова, являющихся циклическими расширениями полных абелевых групп // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип. 7. – С. 136–139.
5. Куроши А. Г. Теория групп. – М.: Наука, 1967. – 648 с.
6. Холл М. Теория групп. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – 468 с.
7. Гольфанд Ю. А. Об изоморфизме между расширениями групп // Докл. АН СССР. Сер. мамем. – 1948. – Т. LX, №7. – С. 1123–1125.
8. Дроботенко В. С. О целочисленных представлениях примарных абелевых групп // В сб. "Алгебра и мат. логика". – К.: Киевский гос. ун-т, 1966. – С. 111–121.
9. Гудивок П. М. Представления конечных групп над коммутативными кольцами. – Ужгород: Ужгородский нац. ун-т, 2003. – 119 с.

Одержано 25.09.2007