

Нові види тахін (Diptera, Tachinidae) фауни України з низинних та гірських районів Закарпаття

Фаринець С.

Ужгородський національний університет, Україна

Відомостей про тахіни крайнього заходу України дуже мало. Наводимо список видів тахін, які на території України були невідомі і виявлені в межах Українських Карпат.

Redtenbacheria insignis Egger. Представник триби Eutherini. Дуже рідкісний вид 1♂,1♀ виявлені в квітні, травні на *Frangula alnus* L., *Euphorbia amygdaloides* L. в дубовому лісі Мукачівського району. Хазяї невідомі.

Subclytia rotundiventris Fll. Представник триби Phasiini. Тахіна виявлена у липні в с. Довге Іршавського р-ну на суцвітті *Leucanthemum vulgare* L. Паразит клопів *Aelia acuminata* (L.).

Leucostoma anthracina Mg. Представник триби Leucostomatini. Фазії виявлені в червні на *Thymus serpyllum* L. під час додаткового живлення у дубовому лісі с. Барвінок Ужгородського р-ну. Хазяї невідомі.

Ligeriella aristata Vill. Представник триби Goniini. Виявлений в дубових лісах Берегівського району в серпні на *Pastinaca sativa* L. Хазяї тахіни невідомі.

Pseudogonia parasiaca R-D. Представник триби Goniini. Зустрічається дуже рідко. На околиці м. Ужгород тахіна виявлена на початку вересня на *Eryngium planum* L. Паразитує на гусеницях ведмедиць.

Masistylum arcuatum Mik. Представник триби Goniini. Тахіна виявлена у серпні на полонині Менчул с. Кваси Рахівського району на *Thymus serpyllum* L.

Gonia sicula R-D. Представник триби Goniini. Тахіна зустрічається лише ранньою весною в дубових лісах Берегівського району. Личинки тахіни – паразити гусениць Noctuidae.

Actia dubitata Herting. Представник триби Siphonini. Цей вид переважно зустрічається в низинних районах Закарпаття. Тахіна виявлена у серпні на нектароносах під час додаткового живлення на *Heracleum sphondylium* L. Паразит личинок ширококрилої молі (Oecophoridae).

Peribaea apicalis R-D. Представник триби Siphonini. Більша частина особин цього виду виявлена у травні-вересні на нектароносах дубових лісів Берегівщини та Ужгорода. Відомий паразит гусениць багатьох видів п'ядунів.

Peribaea fasicornis (Strobl). Представник триби Siphonini. Також вид виявлений у серпні на *Pastina casativa* L., *Achillea millefolium* L. під час додаткового живлення. Паразит гусениць п'ядунів.

Bithia demotica (Egger). Представник триби Leskiini. Зустрічається дуже рідко у низинних районах та передгір'ях. Виявлений у Хустському районі с. Липецька Поляна на *Daucus carota* L. та околиці м. Виноградова на *Aegopodium podagraria* L. Хазяї тахіни невідомі.

Solieria inanis (Fallen). Представник триби Leskiini. Тахіна виявлена у липні на суцвітті *Pimpinella saxifrage* L. D. в с. Березово Хустського району. Хазяї тахіни невідомі.

Solieria fenestrata Mg. Представник триби Leskiini. Вид зустрічається дуже рідко, нами виявлений у липні на зонтичних рослинах у с. Липецька Поляна Хустського району. Хазяї тахіни невідомі.