

**Знахідки попелиць *Lachnus pallipes*(Hartig, 1841) (Hemiptera, Aphididae, Lachninae) в
Закарпатській області**

Тетяна Жебіна, Василь Чумак

Ужгородський національний університет

Попелиці *Lachnus pallipes* (Hartig, 1841), або буковий ляхнус – вид з європейським типом ареалу, поширення якого обмежене ареалом бука лісового (*Fagus sylvatica*), який є для нього кормовою рослиною; іноді заселяє коріння або пагони дубів, зокрема *Quercus rubra*, *Q. pubescens*, *Q. petreae* (Божко, 1982). В Україні зареєстрований в Харківській, Миколаївській, Київській, Полтавській областях та в Криму. В Закарпатті вид реєструвався 3.08.1957 року в околицях смт. Великий Березний (Мамонтова, 1972).

Нами *Lachnus pallipes* за останні роки зареєстровано двічі: в пралісовому масиві Угольського відділення Карпатського біосферного заповідника (21.04.2017 року), колонія локалізувалася по периметру дупла в стовбурі бука діаметром 80 см на висоті 1,3 м над рівнем ґрунту. Попелиці живилися на межі живої і мертвої тканини деревини. Координати знахідки: 48.25625541760668, 23.611878867240147.

Друга знахідка – в букових стиглих насадженнях на території Ужанського національного природного парку. В цьому випадку колонія зареєстрована у буковому лісі в околицях смт. Великий Березний (15.07. 2022р.). Координати: 48.876666, 22.467241. Колонія була локалізована на північному схилі букового лісу під корою дерева, в місті старої рани внизу стовбура, котра могла утворитися через механічне пошкодження або внаслідок дії гриба. Можливо, попелиці можуть спричиняти розростання таких ран на деревах. Серед виявлених попелиць переважали молоді безкрилі самки в оточенні мурашок *Lasius fuliginosus*¹.

¹Дякуємо за визначення мурашок Наталії Косюк