

УДК 512.544

І. В. Шапочка (Ужгородський нац. ун-т)

### ПРО УЗАГАЛЬНЕНУ ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЦІЛОЧИСЛОВИХ МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГРУПИ КЛЕЙНА

In this paper, there was found the class of integral 2-adic matrix representations of the Klein four-group for which the generalized equivalence coincides with equivalence of matrix representations.

В даній статті вияснено, для яких цілочислових 2-адичних матричних зображень групи Клейна узагальнена еквівалентність співпадає з еквівалентністю матричних зображень.

В даній статті, використовуючи описані Л. О. Назаровою [1] нееквівалентні нерозкладні матричні цілочислові зображення групи Клейна  $V = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$  ( $a^2 = e$ ,  $b^2 = e$ ), виділено клас матричних зображень групи  $V$ , для яких узагальнена еквівалентність співпадає з еквівалентністю матричних зображень. Відзначимо, що із [2] слідує, що матричні цілочислові  $p$ -адичні зображення циклічної  $p$ -групи порядку  $p^r$  ( $r \leq 2$ ) узагальнено еквівалентні тоді і тільки тоді, коли вони є еквівалентними. Нагадаємо, матричні зображення  $\Gamma : h \rightarrow \Gamma(h)$  і  $\Delta : h \rightarrow \Delta(h)$  скінченної групи  $H$  степеня  $n$  над кільцем  $Z$  називаються узагальнено еквівалентними, якщо існує оборотна матриця  $C \in GL(n, Z)$  і автоморфізм  $\varphi$  групи  $H$  такі, що  $C^{-1}\Gamma(h)C = \Delta(\varphi(h))$  для довільного елемента  $h \in H$ . Очевидно, із еквівалентності матричних зображень скінченної групи  $H$  слідує їх узагальнена еквівалентність. Обернене твердження не завжди справедливе. Наприклад, зображення  $\Gamma : a \rightarrow 1, b \rightarrow -1$  та  $\Delta : a \rightarrow -1, b \rightarrow 1$  групи Клейна  $V$  над кільцем цілих раціональних чисел є узагальнено еквівалентними, але не є еквівалентними зображеннями.

Нехай надалі  $\mathbb{Z}_2$  — кільце цілих 2-адичних чисел. Введемо наступні позначення:  $E_n$  — одинична матриця порядку  $n$ ;  $R_n, T_n$  —  $n \times (n+1)$ -матриці вигляду:  $R_n = \begin{pmatrix} 0 & E_n \end{pmatrix}$ ,  $T_n = \begin{pmatrix} E_n & 0 \end{pmatrix}$ ;  $U_n, V_n$  — матриці відповідно транспоновані до матриць  $T_n, R_n$ ;  $W_n = R_n U_n$ ;  $L_n$  —  $2 \times (n+1)$ -матриця,  $K_n$  —  $(n+1) \times 2$ -матриця відповідно вигляду:

$$L_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad K_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$L'_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad K'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Теорема 1.** Множина  $\mathfrak{M}$  всіх нерозкладних матричних  $\mathbb{Z}_2$ -зображень групи Клейна  $V = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$ , для яких узагальнена еквівалентність співпадає з еквівалентністю матричних зображень, вичерпуються наступними зображеннями:

$$\Upsilon_1 : a \rightarrow 1, \quad b \rightarrow 1;$$

$$\Upsilon_2^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_n & 0 & 0 & E_n \\ 0 & -E_n & R_n & 0 \\ 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_n \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} -E_n & 0 & T_n & 0 \\ 0 & E_n & 0 & E_n \\ 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_n \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_3^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & U_n \\ 0 & -E_n & E_n & 0 \\ 0 & 0 & E_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_n \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & V_n & 0 \\ 0 & -E_n & 0 & E_n \\ 0 & 0 & -E_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E_n \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_4 : a \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_5 : a \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_6^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & E_{n+1} \\ 0 & -E_{n+1} & U_n & 0 \\ 0 & 0 & E_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} -E_{n+1} & 0 & V_n & 0 \\ 0 & E_{n+1} & 0 & E_{n+1} \\ 0 & 0 & E_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_7^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_n & 0 & 0 & R_n \\ 0 & -E_{n+1} & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} E_n & 0 & T_n & 0 \\ 0 & -E_{n+1} & 0 & E_{n+1} \\ 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E_{n+1} \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_8 : a \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} X & E_2 \\ 0 & -X \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_9 : a \rightarrow \begin{pmatrix} X & L_1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} X & K'_1 \\ 0 & -Y \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_{10} : a \rightarrow \begin{pmatrix} Y & L_1 \\ 0 & X \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} Y & K_1 \\ 0 & -X \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_{11} : a \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & K'_1 \\ 0 & Y & L'_1 & L_1 \\ 0 & 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 & L_1 & 0 \\ 0 & Y & L_1 & L'_1 \\ 0 & 0 & -E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E_2 \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_{12} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_2 & 0 & K_1 & L_1 \\ 0 & -E_2 & K'_1 & 0 \\ 0 & 0 & Y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} E_2 & 0 & K'_1 & 0 \\ 0 & -E_2 & K_1 & K_1 \\ 0 & 0 & Y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix};$$

$$\Upsilon_{13}^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_n & 0 \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_n & 0 \\ 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n \\ 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & T_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
& b \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_n & 0 & 0 \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & R_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & R_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & E_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n \end{pmatrix}; \\
& \Upsilon_{14}^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_n & 0 \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_n & 0 \\ 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & T_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} \end{pmatrix}, \\
& b \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L_n & 0 & 0 \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & R_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & R_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} \end{pmatrix}; \\
& \Upsilon_{15}^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & U_n & 0 & K_n \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 \\ 0 & 0 & -E_n & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & U_n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix}, \\
& b \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & V_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & V_n & K_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -X \end{pmatrix};
\end{aligned}$$

$$\Upsilon_{16}^{(n)} : a \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & U_n & 0 & K_n \\ 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & U_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix},$$

$$b \rightarrow \begin{pmatrix} E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & V_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & V_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & K_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -E_{n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -X \end{pmatrix},$$

де  $n \in \mathbb{N}$ .

**Доведення.** Доведення теореми базується на приведеному в [1] списку всіх нееквівалентних нерозкладних цілочислових матричних зображень групи Клейна. Група  $\text{Aut } V$  автоморфізмів групи Клейна  $V = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$  ізоморфна групі дієдра 6-го порядку і породжується наступними автоморфізмами:

$$\nu : a \rightarrow b, b \rightarrow a; \quad \mu : a \rightarrow b, b \rightarrow ab.$$

Безпосередньою перевіркою можна показати, що для кожного нерозкладного матричного зображення  $\Gamma$  групи Клейна із множини  $\mathfrak{M}$  знайдуться такі оборотні матриці  $S$  і  $T$ , що

$$S^{-1}\Gamma(v)S = \Gamma(\nu(v)), \quad T^{-1}\Gamma(v)T = \Gamma(\mu(v)),$$

для будь-якого елемента  $v$  групи  $V$ . Тоді для довільного автоморфізма  $\varphi = \nu^i \mu^j$  групи  $V$  справедлива рівність

$$(T^j S^i)^{-1} \Gamma(v) T^j S^i = \Gamma(\varphi(v)), \quad v \in V.$$

Якщо ж нерозкладне матричне зображення  $\Delta : v \rightarrow \Delta(v)$  групи  $V$  не належить множині  $\mathfrak{M}$ , то знайдеться автоморфізм  $\varphi$  групи  $V$ , що матричні зображення  $\Delta$  та  $\Delta_\varphi : v \rightarrow \Delta(\varphi(v))$  не є еквівалентними.

Як наслідок із теореми 1 одержуємо, що у випадку, коли матричні  $\mathbb{Z}_2$ -зображення  $\Gamma$  і  $\Delta$  групи Клейна, що є сумою нерозкладних зображень із множини  $\mathfrak{M}$ , є узагальнено еквівалентним тоді і тільки тоді, коли вони є еквівалентними матричними зображеннями.

1. Назарова Л. А. Целочисленные представления четверной группы // Докл. АН СССР. – 1961. – 140 № 5. – С. 1011–1014.
2. Гудивок П. М., Ващук Ф. Г., Дроботенко В. С. Черниковские  $p$ -группы и целочисленные  $p$ -адические представления конечных групп // Укр. мат. журн. – 1992. – 44, № 26. – С. 742–753.

Одержано 08.04.2011