

Wiadomości Lekarskie



Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Rok założenia 1928

ISSN 0043-5147



CZASOPISMO JEST INDEKSOWANE W MEDLINE/PUB MED, EBSCO, INDEX COPERNICUS ORAZ MNiSW (6 pkt), SCOPUS
I POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

Polonijne Koto Lekarzy w Berdiansku – „Jeszcze raz o Berdiansku” – powstanie w roku 1996 i jest jednym z pierwszych polonijnych organizacji środowiskowych funkcjonujących na Ukrainie. Celem organizacji jest promowanie i realizacja działań o charakterze medycznym, prowadzonych na rzecz społeczności całego miasta, zrzesza 15 osób – lekarzy, którzy w Berdiansku nie posiadają własnych przychodni, a także w sposób oddany zdrowiu i życiu, jak i w sposób oddany przychodni i prywatnych zakładów medycznych, nawiązując współpracę z Poloniją Medyczną na Ukrainie i w świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia warunków gospodarczych na Ukrainie, jak również w sposób oddany zdrowiu i życiu, jak i w sposób oddany przychodni i prywatnych zakładów medycznych, nawiązując współpracę z Poloniją Medyczną na Ukrainie i w świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia

Słowa kluczowe: Koto Lekarzy w Berdiansku, współpraca, własny potencjał

Bondarewa O.

Działalność Kota Lekarzy przy PKOT „Odrodzenie” w Berdiansku wobec konfliktu wojennego na Ukrainie Wschodniej

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Wydział Udarowy Nr 22, Winnicki Obwodowy Szpital Psychoneurologiczny im. Akad. Juszczenki O. I., Winnica, Ukraina

Szczepanik J.A., Smotrycka T.W., Wyszczanski A.W., Karpenko N.W., Wyszczanski T.G., Krywenko G.O., Sinicka L.W., Kostenko T.W., Kapitanczuk I.W., Korobczuk N.W., Matijuk S.I.

Powikłania po terapii trombolitycznej w postaci obrzęku angioneurotycznego języka

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Opis: Na obwodowym oddziale udarowym wykonano już 137 procedur. Obrzęk języka obserwuje się po raz pierwszy, i częstość występowania wynosi 0,72%, co w porównaniu do posiadanych danych statystycznych jest prawie 2 razy mniejsze. Najprawdopodobniej może mieć znaczenie stan alergizacji danej osoby, jak i populacji miejscowości, którą obsługuje dane centrum udarowe.

Możliwość korekcji funkcji natrąpalnych kinerów NaCl u kurców tytoniu ta

Możliwość korekcji funkcji natrąpalnych kinerów NaCl u kurców tytoniu ta