ФЛОРА ОКОЛИЦЬ СЕЛА СОЙМИ МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ

Лемак М.В.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
вул. А.Волошина, 32, м.Ужгород, Закарпатська область, Україна
Науковий керівник:викл. Сойма А.Д.

У теперішній час, коли внаслідок техногенного впливу швидкими темпами змінюється структура природних ландшафтів, генофонд біосфери катастрофічно збіднюється. Прискореними темпами цей процес проходить і на території Карпат, що відображається у зміні флористичного складу рослинних угруповань. Тому, спостереження за станом біологічного різноманіття рослин певного регіону є однією з важливіших задач сьогодення.

Метою роботи є здійснення інвентаризації флори околиць с. Сойми Міжгірського району та з'ясувати її особливості. На основі опрацювання літературних джерел скласти конспект флори досліджуваного району. Виконати систематичний, біоморфологічний та географічний аналіз флори.

Внаслідок аналізу літературних джерел та власних гербарних зразків на досліджуваній території було виявлено 200 видів рослин, що належать до 45 родин та 157 видів. По кількості видів провідними родинами досліджуваної флори є *Asteraceae*-31 вид, *Fabacea*-17 видів, *Rosaceae*-16 видів, *Brassicaceae*-15 видів, *Caryophyllaceae* -13, *Poaceae*-11 видів, *Ranunculaceae*-8 видів, *Lamiaceae*-7 видів, і по 5 видів у родинах *Apiaceae*, *Papaveraceae*, *Salicaceae*. Решта родин представлена одним-чотирма видами.

Аналіз біоморфологічної структури флори досліджуваного району показав, що тут переважають багаторічні рослини, на долю яких припадає 53% від загальної кількості видів. На долю кущів припадає 8% від загальної кількості видів. 4%займають види, які можуть бути як однорічниками так і багаторічниками.

В результаті дослідження флори району переважають види євроазіатського типу ареалу-73 види, що складає 36,5% від загальної кількості. На другому місці знаходяться види європейського типу ареалу-43 види, що становить 21,5%. Середньоєвропейський тип ареалу представлений 15 видами (7,5%). Види космополіти у досліджуваній флорі становлять 12 видів, що складає 6%. Також, 13 видів (6,5%) є індукованими. Чотири види від загальної кількості належать до карпатського типу ареалу і у процентному відношенні становлять 2%. Медитеральний та адвентивний типу ареалу, відмічені по 5, що разом становить 5%.