Г. М. Рошко

Эколого-фаунистическая характеристика палочковидов коленчатоусых (Berytidae, Hemiptera) Закарпатья.

Материалом для работы послужили сборы автора и экспедиций кафедры зоологии Ужгородского госуниверситета за 1951—1959 гг. из всех районов Закарпатской области УССР. Литературных данных по этой группе для Закарпатья почти нет.

В результате обработки сборов нами выявлено 7 видов палочковидов коленчатоусых, относящихся к 4 родам.

1. Neides tipularius L. живет среди травостоев с Sarothamnus, Chenopodium, Galium, Achillea, Agropyron на освещенных солнцем местах. Иногда встречаются особи с укороченными крыльями. Личинки попадаются с июня по сентябрь. Зимует имаго под опавшими листьями и сухой травой. Места нахождения: с. Доманинцы—21. V. 1951, с. Ставное—16. VI. 1952, п. В. Березный—22. VI. 1953, с. Кальник—17. VIII. 1953, п. Иршава—12. VI. 1958 и др. пункты.

2. Berytinus clavipes F. обитает в предгорьях и горных речных долинах, на сухих местах между травянистыми растениями Arenaria sp, Chenopodium и под Calluna vulgaris Sal. Места нахождения: Ужгород—6. IV. 1954, п. Тячево—8. VI. 1955, п. Рахово—20. VI. 1955, п. Воловец—28. VI. 1958 и др. пункты.

3. Berytinus minor H.—S. встречается в травянистых ассоциациях с Cerastium sp. на лугах в предгорьях и горах. Редко попадаются особи с укороченными крыльями. Места нахождения: с. Кострино Великоберезнянского района—8. VI. 1952, п. В. Березный—19. VI. 1953, с. Бенедиковцы—19. VIII. 1954, г. Ужгород—3. IX. 1955 и с. Синевир—20. VII. 1959.

4. Berytinus montivagus Meу Д. живет на открытых местах среди травостоев с Medicago lupulina L. Пункты нахождения: Ужгород—22. VII. 1952, с. Чаповцы—6. IV. 1954, с. Ильница—14. VI. 1958, с. Чинадиево—15. VI. 1959.

5. Berytinus crassipes H.—S. преимущественно на сухих местах среди травянистых растений (Pulmonaria sp.) Зимует под сухими листьями и травами. Места нахождения: Ужго-

род—3. IV. 1954, с. Усть-Черна—16. VI. 1954 и с. Луково—16. VI. 1958.

9. Metatropis rufescens H.—S. живет под пологом сырого леса и среди кустарников ольхи и лещины на Circaea intermedia. Места нахождения: с. Ставное—6. VI. 1952, с. Ворочево—10. VII. 1952, с. Рафайлово—22. VIII. 1955, с. Невицкое—1. VII.1957.

7. Gampsocoris culicinus Seid. живет на видах рода Ononis L. Места нахождения: п. Тячево—6. VI. 1955, с. Мужиево—21. VI. 1957 и с. Вучковое—22. VIII. 1959.

В целом представители Berytidae являются фитофагами. Зимуют на стадии имаго. Личинки попадаются с июня по сентябрь. Движение как личинок, так и взрослых особей медленное. Летают только в теплые дни и то редко.

В зоогеографическом отношении фауну семейства Berytidae Закарпатья составляют виды европейского (N. tipularius, B. montivagus, M. rufescens), европейско-сибирского (B. clavipes, B. minor, B. crassipes) и средиземноморского распространения (G. culicinus).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кириченко А. Н. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР. Изд. АН СССР, М.—Л. 1951.

2. Рошко Г. М. Некоторые итоги изучения настоящих полужесткокрылых Закарпатья научные записки Ужгородск. ун-та, том 40, 1959.

3. Stichel M. Verzeichnis der Paläarktichen Hemiptera—Heteroptera, III Berlin—Hermsdorf, 1960.