

в 1,6 рази відносно норми, ФЧ у цей період дослідження було знижено в 1,9 рази. Показник ІА був у середньому в 1,6 рази нижче норми, ІП – у 2 рази. При вивченні концентрації ЦК було відмічено її підвищення переважно за рахунок найбільш токсигенних середньо- та дрібно-молекулярних фракцій. Так, загальна концентрація ЦК була підвищена в 1,8 рази. Концентрація фракції ІІS-І9S

ЦК була підвищена в середньому в 2,3 рази відносно норми, фракція >І9S ЦК – в 1,2 рази, <ІІS ЦК – в 2,7 рази. Виходячи з отриманих даних, слід зазначити, що доцільним є подальше вивчення стану імунної системи у хворих нідлітків на СДР та пошуки патогенетично обґрунтованої терапії.

УДК 616.89-008

О. Р. Романів

AUTODESTRUCTIVE ASPECTS OF MYOCARDIAL INFARCTION

Ukrainian Research Institute of Social and Forensic Psychiatry and Drug Abuse

Keywords: myocardial infarction, suicide, autoaggression, autodestruction

Combination of the individual patient's life as suicidal activity (thoughts, intentions, attempts) and of severe physical illness (eg myocardial infarction) show complex psychological, physiological and psychiatric interactions between them. If the majority of cardiac patients with a high probability can establish a self-destructive tendencies in the past, the role suicidology intentions expressed in these patients, their interaction with the pathogenesis of cardiac pathology is not so obvious.

In this study, we paid attention to such cases as the identification of interaction suicidology and psychosomatic phenomena in these patients will allow a more accurate understanding of key aspects of development, and therefore – and as suicide prevention activities as well and myocardial infarction. It examined 48 patients with myocardial infarction (closest to 3 weeks after emergence), which to varying degrees has been expressed suicidal mood – from occasional

suicidal thoughts at altitudes life crisis, expressed suicidal intent of suicide attempts.

The key research tool in this regard, we chose Columbia Suicide The difficulty rating scale (C-SSRS). In conjunction with the study follow-up and anamnestic information about the patient, identifying key behavioral coping strategies in difficult situations and immediate conditions of myocardial given the estimated scale made it possible to compare suyit-sydolohichnu and psychosomatic implementation autoahresyynoyi behavior one person at different times. Through this approach, we found that these behavioral strategies and motivation to help the individual overcome suyitsydolni thoughts and intentions, proved ineffective in the case of myocardial infarction. Also found some quantitative and qualitative relationship between the severity of suicidal tendencies in the past and of myocardial infarction.

УДК 616.89

К. В. Рябухін

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОШЕННЯ ДО СІМЕЙНОЇ РОЛІ МАТЕРІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

Одеський національний медичний університет

Проблема боротьби з алкоголізмом продовжує залишатися однією з найважливіших соціальних проблем у більшості країн світу. Незважаючи на значне зростання наркоманій, хронічний алкоголізм залишається домінуючим наркологічним захворюванням (П. В. Волошин, С. І. Табачников, І. В. Лінський, О. І. Мінко). Залежність від алкоголю є поширеним явищем не тільки в чоловічій популяції, це патологічне явище останнім часом поширюється і в жіночому середовищі і має негативний вплив не тільки на психологічний стан жінок, їхню особистість, але й на родинні стосунки та ставлення до ролі в сім'ї. В експериментально-психологічному дослідженні, яке проводилось із метою вивчення особливостей відношення до сімейної ролі жінок з алкоголізмом, використовувалась методика PARI (parental attitude research instrument) Е. Шеффера та Р. Белла.

Дослідження проводилось у групі з 98 жінок віком 20–48 років, які мали дітей. У результаті дослідження виявлено, що більшість матерів, які страждали на алкогольну залежність, відчували тяготіння роллю матері. Спостерігалась надмірна емоційна дистанція з дитиною (68,32%), надмірна строгість у відношенні до дитини (61,43%), фізична агресія з боку матері (53,67%). Значна кількість жінок мали відчуття самопожертвування, пов'язане з необхідністю виконувати роль матері (47,54%), при цьому спостерігалась тенденція до домінування матері в родині (38,96%), також спостерігалась значна кількість випадків пригнічення волі дитини (42,11%).

Таким чином, у родині жінок, які страждають на алкогольну залежність, спостерігаються дисгармонійні сімейні тенденції, а також фізична агресія або феномен емоційного відкидання по відношенню до дитини.