

Результати та їх обговорення. Стан хворих оцінювали через 1 рік після виникнення першого епілептичного нападу. Критеріями оцінки були: виникнення другого і наступних епілептичних нападів, тобто, діагностика симптоматичної постінсультної епілепсії, або відсутність епілептичних нападів.

У I групі другий напад виник у 22 хворих, у II – другий і подальші епілептичні напади виявлені у 43 (рис. 2).

У I групі повторні епілептичні напади зафіковані у 22 (27,1 %) хворих, у II – у 43 (53,75 %).

Висновки. Таким чином, постінсультна епілепсія – це супутнє захворювання, що ускладнює реабілітацію хворих після інсульту. За результатами нашого дослідження, у 16 % хворих, які перенесли інсульт, у строки до 6 міс виник хоча б один епілептичний напад. Другий епілептичний напад виник у 27,1 % хворих після застосування ПЕП та у 53,75 % хворих – за відсутності такої терапії. Ці результати є підставою для подальших досліджень та можливої рекомендації призначення ПЕП вже після першого епілептичного нападу у хворих, які перенесли інсульт.

Список літератури

1. Власов П. Н., Шахабасова З. С., Филатова Н. В. Эпилепсия, впервые возникшая у пожилого пациента: диагностика, дифференциальная диагностика, терапия // Фарматека. – 2010. – № 7. – С. 40–47.
2. Гехт А. Б. Современные стандарты ведения больных эпилепсией и основные принципы лечения // Consil. Med. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 2–11.
3. Гехт А. Б. Эпилепсия у пожилых // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2005. – № 11. – С. 66–67.
4. Гехт А. Б., Лебедева А. В., Рулева З. С. и др. Эпилепсия у больных инсультом // Российский медицинский журнал. – 2000. – № 2. – С. 14–17.
5. Гехт А. Б., Мильчакова Л. Е., Чурилин Ю. Ю. и др. Эпидемиология эпилепсии в России // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2006. – № 1. – С. 3.
6. Гехт А. Б., Тлапшокова Л. Б., Лебедева А. В. Постинсультная эпилепсия // Там же. – 2000. – № 9. – С. 67–70.
7. Данилова Т. В. Современные возможности диагностики факторов риска эпилепсии, развивающейся у взрослых: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Казань, 2004. – 23 с.
8. Карлов В. А. Эпилепсия. – М.: Медицина, 1992. – 384 с.
9. Прохорова Э. С. Эпилептические припадки при нарушениях мозгового кровообращения у больных гипертонической болезнью и атеросклерозом: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1982. – 23 с.
10. Adams H. P., Adams R. J., Brott T. et al. Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: a scientific statement from the Stroke Council of the American Stroke Association // Stroke. – 2003. – Vol. 34. – P. 1056–1083.
11. Adams H. P., Gregory del Zoppo, Alberts M. J. et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke // Ibid. – 2007. – Vol. 38. – P. 1655–1711.
12. Alberti A., Paciaroni M., Caso V. et al. Early seizures in patients with acute stroke: Frequency, predictive factors, and effect on clinical outcome // Vasc. Health Risk Manag. – 2008. – Vol. 4, N 3. – P. 715–720.
13. Arboix A., Comes E., Massons J. et al. Prognostic value of very early seizure for in-hospital mortality in atherothrombotic infarction // Eur. Neurol. – 2003. – Vol. 50. – P. 350–355.
14. Barolin G. S., Sherzer E. Epileptische Anfälle bei Apoplektikern // Wein Nervenhe. – 1962. – N 20. – S. 35–4714.
15. Bederson J. B., Connolly E. S., Batjer H. H. et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Stroke. – 2009. – Vol. 40. – P. 994–1025.
16. Bladin C. F., Alexandrov A. V., Bellavance A. et al. Seizures after stroke: a prospective multicenter study // Arch. Neurol. – 2000. – Vol. 57. – P. 1617–1622.
17. Broderick J., Adams H. J., Barsan W. et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a statement for the healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association // Stroke. – 1999. – Vol. 30. – P. 905–915.
18. Camilo O., Darry D., Goldstein B. Seizures and epilepsy after ischemic stroke // Ibid. – 2004. – N 7. – P. 1769–1775.