

© В.Й. Сморжевський, М.В. Костилєв, Н.Р. Присяжна, В.В. Чорний, В.А. Кондратюк, 2012

УДК 616.14 – 005.6/7 – 089

В.Й¹. СМОРЖЕВСЬКИЙ, М.В². КОСТИЛЄВ, Н.Р¹. ПРИСЯЖНА, В.В.² ЧОРНИЙ, В.А². КОНДРАТЮК
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика б/к; Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О.ОР. Шалімова НАМН України, Київ

УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ПОСТАНОВКИ ПРОТИЕМБОЛІЧНОГО КАВА-ФІЛЬТРУ. ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ

Профілактика тромбоемболії гілок легеневої артерії є однією з важливих проблем сучасної медицини. Більш ніж 30-ти річний досвід використання інтравенозних протиємболічних кава-фільтрів доказав їх можливості у профілактиці тромбоемболії гілок легеневої артерії. Ефективність застосування емболовловлюючих інтравенозних пристрій визначається не лише в кількості рецидивів тромбоемболії гілок легеневої артерії але й аналіз частоти виникнення ускладнень які повязані з їх імплантацією. Дискутабельним та мало вивченим являється проблема видалення кава-фільтру коли його неможливо вилучити ендоваскулярним методом.

Ключові слова: протиємболічні інтравенозні кава-фільтри, ускладнення, покази до видалення

Вступ. Виявлення ембологенних тромбів у системі нижньої порожнистої вени (НПВ) означає вичерпання можливостей консервативних засобів, у тому числі й фармакологічних препаратів: антикоагулянтна терапія не в змозі запобігти відриванню та міграції сформованого тромбу до легеневих артерій, а застосування тромболітиків навіть сприяє цьому. Запобігти загрозі легеневої емболії нещільно фіксованими до венозної стінки тромбами можна лише з допомогою хірургічних заходів – або видаленням тромбу, або створенням перешкоди на його шляху до легенів – від перев'язування НПВ до сучасних методів її парціальної оклюзії.

Мета дослідження. Проаналізувати ускладнення після установки кава-фільтра і особливості видалення.

Матеріали та методи. На терені України інтравенозні протиємболічні кава-фільтри імплантовані більше 1500 пацієнтам. Після установки пристрою усім їм було виконане контрольне ультразвукове дуплексне сканування венозної системи. Застосувалися режими сіро-шкального сканування, кольорового та енергетичного доплерівського картування, імпульсно-хвильової доплерографії та їх різні комбінації. В ході динамічного спостереження виконували рентгенологічне дослідження з метою оцінки стану, локалізації та положення кава-фільтра.

Показами до прямого видалення кава-фільтру були:

- безпосередня загроза життю при проксимальній міграції самого пристрію чи його фрагменту в порожнині серця

- розвиток перфорації навколішніх органів та анатомічних структур

- виразний і тривалий резистентний до знеблюючих засобів больовий синдром

- попередження небажаних наслідків

Видалено пристрій: 11 – ОСОТ, 6 – TrapEase, 1 – РЕПТЕЛА.

З них у 5 випадках кава-фільтр було імплантовано у супаренальну позицію, решта – інфрапе-

нальну. Структура ускладнень була наступною: перфорація стінок вени – у 18 (100%), перфорація дванадцятапалої кишki – 1 (5,56%), хронічний панкреатит – 1 (5,56%), тромбоз кава-фільтру – 4 (22,2%), дислокація 2 (11,1%). В усіх пацієнтів мав місце виразний больовий синдром, резистентний до анальгезуючих засобів. Хірургічним доступом у 1 випадку була серединна стернотомія із застосуванням штучного кровообігу, лапаротомія – у 11, та заочеревинний доступ зправа – у 6.

Для видалення парасолькового кава-фільтру нами була запропонована видалення парасолькового інтравенозного протиємболічного кава-фільтру (патент на корисну модель № 47893 від 25.02.2010 р.) котра дозволяє зменшити крововтрату та уникнути пошкодження стінки вени ніжками пристрію. Відносно кава-фільтру TrapEase то шляхом експозиції нижньої порожнистої вени вище і нижче локалізації пристрію і шляхом венотомії проводилось його видалення. Наявні старі та свіжі тромботичні маси видалялись і в проксимальній ділянці вени накладали шов за Спенсером. Цілісність судинної стінки відновлювали шляхом накладання судинного шва.

Результати дослідження та їх обговорення. Виявлення ембологенних тромбів у системі нижньої порожнистої вени (НПВ) означає вичерпання можливостей консервативних засобів, у тому числі й фармакологічних препаратів: антикоагулянтна терапія не в змозі запобігти відриванню та міграції сформованого тромбу до легеневих артерій, а застосування тромболітиків навіть сприятиме цьому. Запобігти загрозі легеневої емболії нещільно фіксованими до венозної стінки тромбами можна лише за допомогою хірургічних заходів – або видаленням тромбу, або створенням перешкоди на його шляху до легенів: від перев'язування НПВ до сучасних методів її парціальної оклюзії.

У 60-ті роки розпочався новий прогресивний напрямок у профілактиці ТЕЛА – парціальна оклюзія НПВ. Суть операції полягає в поділі просвіту порожнистої вени на кілька вузьких каналів,

які, зберігаючи магістральний кровотік, водночас за рахунок свого малого діаметру відіграють роль фільтрів для потенційних тромбоемболів. Першим цю операцію здійснив F.Spenser у 1959 р., запропонувавши прошивати НПВ в поперечному напрямку 3–4-ма матрацними швами з інтервалом 5 мм один від одного. Пізніше з цією ж метою було запропоновано використовувати механічний шов за допомогою УКБ-25, плікацію за допомогою зовнішнього затискача з гладеньких тефлонових клем, зовнішнього затискача із зубчастими клемами тощо.

Саме принцип парціальної оклюзії став поштовхом до розробки та впровадження механічних пристрій для затримання емболів при збереженні венозного кровотоку – кава-фільтрів (КФ) та методів їх установлення (інтраопераційних і черезшкірних).

Черезшкірна імплантация КФ дозволяє значно прискорити процедуру та зменшити вартість парціальної оклюзії НПВ у порівнянні із хірургічною плікацією а також відновити нормальній отвір вени після припинення дії факторів ризику. Основними показаннями до їх застосування є наявні ТГВ з епізодами легеневої емболії у минулому, рецидиви ТЕЛА, наявність протипоказань до проведення антикоагулянтної терапії ТГВ (кровоточі, тромбоцитопенія, метастази у центральну нервову систему, післяопераційний період та ін.) або низька ефективність останньої.

На наш час запропоновано досить багато моделей КФ (GREENFIELD, GIANTURCO-RHOEM (“пташине гніздо”), DIL, ANTHEOR(TF), GUNTHER(TULIP), LGM(VENA-TECH), SPRING, SIMON, COOK, ANGIOCOR, AMPLATZ, FILCARD INTERNATIONAL, РЭПТЭЛА, ВОЛАН, ОСОТ та ін.), для виготовлення яких використовують матеріали із виразними пружними властивостями та стійкістю до корозії – нержавіючу сталь, титан, нітінол. За формуєю КФ розподіляють на три основних типи: конус, кошіль, пташине гніздо, а за можливістю подальшого видалення – на постійні та тимчасові.

Останній розподіл інколи має досить умовний характер, оскільки внаслідок дії тенденції до уніфікації обладнання окремі сучасні моделі КФ дозволяють їх подальше ендоваскулярне вилучення навіть після довготривалої експлуатації. Однак досі у розробці та виробництві КФ домінуючою залишається інша тенденція, яка відбиває сучасні погляди на терміни дії факторів ризику ТГВ та ТЕЛА і спрямована на підвищення економічної ефективності медичних технологій імплантациї та видалення КФ. Відповідно до неї водночас відбуваються розробка та вдосконалення двох типів механічних пристрій для затримання емболів: 1) для довготривалої або навіть довічної парціальної оклюзії НПВ, коли основними вимогами є простота імплантациї, невеликий розмір та надійність фіксації; 2) для тимчасового застосування, коли

зручність видалення переважає над іншими вимогами.

Тимчасові КФ використовуються на період дії минущих факторів ризику, наприклад, після важких травм, перед великими ортопедичними втручаннями, перед оперативним видаленням венозних тромбів здухвинного та стегнового сегментів, при ознаках ТГВ наприкінці вагітності, на період проведення тромболізу.

Найбільш типовим місцем для імплантациї як постійних, так і тимчасових КФ є інфраперенальний сегмент НПВ, що мотивується, по-перше, значно більшою частотою ТГВ нижніх кінцівок; по-друге, – обмеженням величини зміщень цього сегменту НПВ обсягом рухів поперекового відділу хребцевого стовпу; по-третє, бажанням попередити порушення венозного витіку від нирок у разі затримання КФ емболів. Однак сенсом використання КФ є перекриття найбільш ймовірних шляхів центральної міграції емболів, – тому місце розташування КФ, шлях імплантациї, тип та розмір пристрію повинні обиратися індивідуально.

У випадках поширення проксимальної межі тромбу до гирла ниркових вен, наявності метагромбів ниркових вен при пухлинах нирок, у вагітних пацієнток, анатомічних аномаліях (подвоєння НПВ, низький рівень впадіння ниркових вен), при дісфункції (недостатнє розкриття, міграція, поворот з неповним перекриттям отвору НПВ) раніш встановленого інфраперенального КФ і неможливості його вилучення і заміні доцільно є супраперенальна імплантация КФ.

Визначення профілактичної ефективності КФ потребує не лише порівняння кількості рецидивів ТЕЛА, але й врахування частоти виникнення та потенційної загрози ускладнень, що пов’язані з їх імплантациєю.

До таких звичайно відносять: повний або частковий тромбоз порожнистої вени, перфорацію її стінок, зміщення КФ у вигляді проксимальної або дистальної міграції та нахилу, руйнування пристрію, кровотечу в місці венозної пункції, його тромбоз або інфікування.

Слід зазначити, що дотримання технічних аспектів імплантациї обіймає провідне місце в зменшенні частоти ускладнень. Характерною рисою літературних повідомлень є низька частота ускладнень імплантациї в установках, причетних до розробки КФ, що є обумовленим не стільки бажанням приховати недоліки, скільки скрупулезним дотриманням методики імплантациї.

Наявність значної кількості ускладнень із різним рівнем потенційної загрози потребує здійснення динамічного спостереження за пацієнтами із імплантованими КФ, тривалість та періодичність якого визначаються переважно типом пристрію (тимчасовий, постійний).

Мета динамічного огляду полягає в отриманні відповіді на два основних питання: 1) Чи перекриває КФ отвір вени? 2) Чи є НПВ прохідною? Позитивна відповідь на перше питання потребує ви-

ключення значної міграції (будь-яких зміщень у проксимальному напрямку за рівень ниркових вен при інфраперенальній та печінкових вен – при супераренальній імплантації; у випадках каудального зміщення – міграції дистальніше за джерело емболії), ангуляції (кут нахилу не повинен перевищувати 15°), руйнування та фрагментації КФ. Для отримання цієї інформації достатнім є здійснення рентгенологічного дослідження у фронтальній та сагітальній проекціях.

Друге запитання у більшості пацієнтів може бути вирішеним за допомогою дуплексного сканування. в окремих випадках (надмірна вага хворих, метеоризм) віправданим може бути проведення рентгеноконтрастної каваграфії.

Не дивлячись на високу ефективність, за даними доступних літературних джерел, унікаль-

ність методу, широкий спектр пристроїв, унікальність методу, показів, „безкровність” установки, легкість імплантації, запропоновані кава-фільтри неможливо, на даний час, назвати досконалими в звязку з значним переліком противоказів і сур'озних ускладнень пов'язаних з їх імплантациєю.

Висновки

1. Хірургічне видалення інтратенозного протиємболічного кава-фільтру є реальною проблемою котра потребує вирішення.

2. Накопичення досвіду дозволить зайняти своє місце у профілактиці тромбоемболії гілок легеневої артерії, відмовитись від постійних і пе-рейти на застосування тимчасових інтратенозних емболоуловлюючих пристроїв з адекватним медикаментозним супровідом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Бранд Я.Б., Долгов И.М., Сагиров М.А., Мазанов М.Х. Хирургическое лечение ранения правого желудочка в сочетании с аортокоронарным шунтированием / Я.Б. Бранд, И.М. Долгов, М.А. Сагиров, М.Х. Мазанов // — Кардиология. — 2009, №3. — С. 83—85.
- Никишин Л.Ф. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии с помощью кава-фильтров. Опыт 1500 имплантаций, осложнения и их лечение. / Л.Ф. Никишин, В.И. Сморжевский, А.М. Почечуев, О.М. Скулы // — Серце і судини.— №4 (Додаток). — „006.— С. 320 — 323.
- Саєнко В.Ф., Костилев М.А., Сморжевський В.Й., Поляченко Ю.В. Профілактика венозних тромбозів та емболій: 2—ге вид., доп. і перероб. / В.Ф. Саєнко, М.А. Костилев, В.Й. Сморжевський, Ю.В Поляченко.— К. Аконіт, 2003 — С.188.
- Bovyn G., Ricco J., Reynaud P., Le Blanche A. Long-duration temporary vena cava filter: A prospective 104-case multicenter study // Journal of Vascular Surgery. — 2009. — Vol. 43. — Issue 6. — P. 1222 — 1229.
- Chung I. Clinical review using inferior vena cava filters to prevent pulmonary embolism // Canadian Family Physician. — 2008. — 54. — P. 50 — 52.
- De Gregorio. Removal of retrievable inferior vena cava filters 90 days after implantation. In an ovine model: is there a time limit for removal// Arch Bronconeumol. — 2008. — 44(11). — P. 591.

V.I.SMORZHEVSKYI, M.V. KOSTYLEV, N.R. PRYSYAZHNA, V.V. CHORNYJ, V.A. KONDRATJUK

National Medical Academy for Postgraduate Education, named after P.L.Shupik, Kyiv

THE COMPLICATIONS AFTER USING INTRAVENOUS CAVA FILTERS

Prophylaxis of thromboembolic pulmonary artery branches is one of the important problems of modern medicine. More than 30 years of experience using intravenous cava filters proved their ability in preventing thromboembolic pulmonary artery branches. Efficacy of intravenous devices those detained embolism defined not only in the number of recurrent thromboembolic pulmonary artery branches but also an analysis of the incidence of complications that are associated with their implantation. Discussion and little known problem is the removal of cava filter when it is impossible to remove the endovascular method.

Keywords: intravenous cava filters, complications, indications for removal

Стаття надійшла до редакції: 4.05.2012 р.