

Ялець-андруга європейський

Telestes souffia
(Risso, 1827)

Клас
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина
Коропові – Cyprinidae



Охоронний статус: BernC: III; ЧКУ: Вразливий; HD: II; ЧКК: NT

Поширення. Річки Центральної Європи, Південної Франції та Північної Італії [1].

Україна: Закарпатська область (середня і верхня частини нижньої течії майже всіх річок; східна межа диз'юнктивного ареалу) [2].

Середовище існування та особливості біології. Прісноводна риба гірських річок [2-6]. Вибирає місця з помірною або слабкою течією. Статевої зрілості досягає у 2-3 роки (три-


валість життя – до 10 років [3; 7]) при довжині тіла самок понад 9 см, а самців – більше 5-7 см. Нерест відбувається з кінця березня – початку квітня до кінця травня – початку червня [6]. Ікра донна, відкладається на мілководдях. Плодючість самок сягає в середньому 2600 ікринок [8]). Живиться як тваринною, так і рослинною їжею [6].

Сучасний стан. На більшій частині регіону – рідкісний вид [9]. Відносно звичайний лише в Теремле-Ріцькому водосховищі [6]. Раніше на річках Тересві та Ріці становив 20-30% від загального вилову риб [10].

Стан популяції на території Закарпаття вивчений недостатньо повно. Зараз у місцевих водоймах зрідка з'являється в уловах рибалок у середніх течіях Латориці, Теремлі, Тересви, Ріки, Тиси [11].

Фактори загрози. Неконтрольований вилов, зміна гідрологічного режиму та забруднення річок [7; 8].

Рекомендовані заходи охорони. Детальне вивчення сучасного поширення й екології, контроль чистоти водойм, створення іхтіологічних заказників у місцях концентрації.



Джерела інформації:

1. Татаринів, 1973; 2. Мовчан, Смірнов, 1981; 3. Турянин, 1982; 4. Редкие..., 1988; 5. Луговой, Ковальчук, 1999-2000; 6. Kottelat, Freyhof, 2007; 7. Великопольський, Потіш, 2009; 8. Куртяк, 2009; 9. ЧКУ, 2009; 10. Потіш, Великопольський, 2010; 11. Л. Потіш (неопубл. дані).

Текст: Л. Потіш
Фото: V. Motyčka