

***Barbus barbatus***  
(Linnaeus, 1758)

**Клас**  
Променепері риби – Actinopterygii

**Ряд**  
Коропоподібні – Cypriniformes

**Родина**  
Коропові – Cyprinidae



**Охоронний статус:** ЧКУ: Вразливий;  
ЧКК: NT

**Поширення:** Європа від Англії на схід до басейну Дністра включно. Басейн Північного та Балтійського морів на південь до Піренеїв та Альп [1].

**Україна:** Басейни р.Тиса, Прут, Сірет, Дністер [1,3]. Карпати – звичайний вид.

**Сучасний стан.** Населяє як безпосередньо основні русла рік так іх притоки. Більш звичайний вид для середніх течій, де концентрується


в заглибинах та затінених ділянках. Рідше зустрічається в нижніх ділянках карпатських водойм.

**Середовище існування та особливості біології.** Осілий, зграйний вид річок з чистою, добре насиченою киснем водою, піщаним та гальковим дном. Типова донна риба [3]. Статевої зрілості досягає на 4-5 рік життя. Нереститься у травні-червні. У виловах рибалок часто зустрічаються особини з ікрою, які виловлені в липні-серпні, рідко в березні. Дорослі особини жив-

ляться личинками комах, червами, ракоподібними, ікрою зрідка мальками риб. Зрідка сягає 4 кілограмів ваги. Особливо типовою є для української ділянки русла р. Тиса від смт Вілок до держжордону із Румунією [4].

**Фактори загрози.** Зміна гідрологічного режиму, зокрема температурного, водойм внаслідок вирубування прибережних лісів. Фрагментація заселених територій внаслідок зарегулювання русел рік. Забір гравію у місцях концентрації. Браконьєрство.

**Рекомендовані заходи охорони.** Детальне вивчення екології та біології виду. Заповідання місць нерестових концентрацій, природоохоронна агітація, контроль чистоти водойм.



**Джерела інформації:**

1. Турянін, 1982;
2. Мовчан, 1993;
3. Мовчан, 2009;
4. Великопольський, Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш  
Фото: Z. Sallai