

Lota lota
(Linnaeus, 1758)

Клас

Ряд
Тріскоподібні – Gadiformes


Родина
Миневі – Lotidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий;
ЧКК: NT

Поширення. Європа, Північна Азія, Північна Америка. Відсутній у Шотландії, Піренейському, Апеннінському і Балканському півостровах, в Малій Азії, Криму і на Кавказі.

Україна: Поширений в середній і верхній течіях Дніпра, Дністра і водоймах Закарпаття [1]. Карпати – звичайний вид басейну р.Тиса [2,3,4].

Середовище існування та особливості біології. Основною умовою його існування на даній території є




наявність місць скову – в основному це нори під камінням. Після сильних злив минь виходить із нір і починає активно полювати не залежно від часу доби. Нерестовий хід в січні. Статової зрілості досягає на 3-4 році життя. Плодючість може сягати 500 тисяч ікришок. Живиться водними безхребетними, мальками риб, дорослі – рибою. Протягом теплої пори року слабоактивний. Під активності припадає на перед нерестовий період коли температура води падає до 8-10 градусів за Цельсієм.

Сучасний стан. Звичайний вид басейну р.Тиса. Поширений у всіх ділянках рік та потоків за винятком високогір'я. Основний об'єкт вилову у рибалок – любителів в пізньо-осінній та зимовий період. Багато чисельний в нижніх течіях рік Тиса, Латориця, Уж, Боржава.

Фактори загрози. Деградація придатних для нересту, оселення і кормових біотопів. Зміна гідрологічного режиму, зокрема температурного, водойм. Фрагментація заселених територій внаслідок зарегулювання русел рік. Надмірний вилов в літній період.

Рекомендовані заходи охорони. Детальне вивчення екології. Заповідання місць нерестових концентрацій, природоохоронна агітація, контроль чистоти водойм.



Джерела інформації:

1. Турянін, 1982;
2. Мовчан, 1993;
3. Щербуха, 2009;
4. Великопольський, Потіш 2009.

Текст: Л.Потіш
Фото: Z. Sallai