

Zinger zinger
(Linnaeus, 1766)

Клас
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд
Окунеподібні – Perciformes

Родина
Окуневі – Percidae

Охоронний статус: BernC: III; HD: V;
ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Дністра та Дунаю [1-3].
Україна: Зустрічається в Карпатському регіоні та в пониззі Дунаю [4; 5].

Середовище існування та особливості біології. Характерними місцями глибоководні ділянки річок із швидкою течією та твердим дном [2; 6; 7]. Реофільна риба. Статевозрілим стає на 2-4 році життя, тривалість якого сягає близько 10 років. Нереститься у квітні-травні. Живиться переважно вночі, основний корм




– донні безхребетні (личинки комах, черв'яки, рачки, молюски), ікра та мальки риб [5; 8-10].

Сучасний стан. На Закарпатті в наш час місцями відносно чисельний [11], особливо в Латориці [10], в Чернівецькій області раніше звичайний вид [12; 13]. У багатьох місцях знахідки з 1960-х рр. відсутні [4]. У наш час спорадично трапляються, як правило, поодинокі особини [14,15-17]. Зараз малочисельний [4; 7], а на окремих ділянках річок – надзвичайно рідкісний [18-20] вид.

Фактори загрози. Зарегулювання стоку річок і забруднення води [5; 7; 13; 21; 22].

Рекомендовані заходи охорони. Збереження незарегульованих ділянок річок, контроль якості води [21]. Необхідно з'ясувати сучасне поширення виду, а в місцях виявлення створити заповідні об'єкти [2; 10; 23].



Джерела інформації:

1. Маркевич, 1951; 2. Балабай, 1952;
3. Шнаревич, 1968; 4. Щербуха, 1982;
5. Турянин, 1982; 6. Редкие..., 1988;
7. Гринжевский, 1999; 8. Луговой, Ковальчук, 1999-2000; 9. Чередарик та ін., 2001; 10. Скільський та ін., 2003;
11. Хлус та ін., 2003; 12. Скільський і др., 2004; 13. Худий, 2005; 14. Скільський та ін., 2005; 15. Скільський, Мелешук, 2006; 16. Хлус та ін., 2006;
17. Леснік, 2006; 18. Матвеев, 2006;
19. Хлус, Скільський, 2006; 20. Kotlatel, Freyhof, 2007; 21. Скільський та ін., 2007; 22. ЧКУ, 2009; 23. Потіш, Великопольський, 2010.

Текст: І. Скільський, Л. Потіш
Фото: Z. Sallai