

Zinger streber
(Linnaeus, 1766)

Клас
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд
Окунеподібні – Perciformes

Родина
Окуневі – Percidae



Охоронний статус: BernC: III; HD: V;
ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Дністра та Дунаю [1–3].

Україна: Зустрічається в Карпатському регіоні та в пониззі Дунаю [4; 5].


Середовище існування та особливості біології. Глибоководні ділянки річок із швидкою течією та твердим дном [2; 6; 7]. Реофільна риба. Статевозрілим стає на 2-4 році життя, тривалість якого сягає близько 10 років. Нереститься у квітні-травні.

Живиться переважно вночі, основний корм – донні безхребетні (личинки комах, черв'яки, рачки, молюски), ікра та мальки риб [5; 8-10].

Сучасний стан. На Закарпатті в наш час місцями відносно чисельний [11], особливо в Латориці [10], в Чернівецькій області раніше звичайний вид [12; 13, 14]. У наш час спорадично трапляються, як правило, поодинокі особини [15-17]. Зараз малочисельний [4; 7], а на окремих ділянках річок – надзвичайно рідкісний [18-20] вид.

Фактори загрози. Зарегулювання стоку річок і забруднення води [5; 7; 13; 21; 22].

Рекомендовані заходи охорони. Збереження незарегульованих ділянок річок, контроль якості води [21]. Необхідно з'ясувати сучасне поширення виду, а в місцях виявлення створити заповідні об'єкти [2; 10; 23].



Джерела інформації:

1. Маркевич, 1951; 2. Балабай, 1952;
3. Шнаревич, 1968; 4. Турянин, 1982;
5. Щербуха, 1982; 6. Редкие..., 1988;
7. Луговой, Ковальчук, 1999-2000;
8. Чередарик та ін., 2001; 9. Хлус та ін., 2003; 10. Скільський та ін., 2003;
11. Скільський и др., 2004; 12. Худий, 2005; 13. Гринжевский, 1999; 14. Хлус, Скільський, 2006; 15. Скільський та ін., 2005; 16. Скільський, Мелещук, 2006;
17. Хлус та ін., 2006; 18. Леснік, 2006;
19. Матвеев, 2006; 20. Kottelat, Freyhof, 2007; 21. Скільський та ін., 2007;
22. ЧКУ, 2009; 23. Потіш, Великопольський, 2010.

Текст: Л. Потіш, І. Скільський
Фото: Z. Sallai