

## Лелека чорний

*Ciconia nigra*  
(Linnaeus, 1758)

Клас  
Птахи – Aves

Ряд  
Лелекоподібні – Ciconiiformes

Родина  
Лелекові – Ciconiidae



Охоронний статус: BernC: III; BonnC: I; BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Лісова смуга Центральної та Східної Європи, Азія, Південна Африка.

Україна: Полісся, Карпати [1].

Середовище існування та особливості біології. Населяє старі високостовбурні ліси з порівняно густим підліском, розташовані неподалік від заболочених ділянок, вологих луків і річкових долин. Живиться ри-


бою, земноводними, комахами, зрідка дрібними гризунами.

Сучасний стан популяції. Закарпаття – гніздиться, як в західній так і в східній частинах області. відомі випадки гніздування на Закарпатській рівнині [1]. Прикарпаття – Населяє Бескиди де спостерігається тенденція до стабілізації кількості гніздових пар [5]. Буковина - По всій території Чернівецької області. На гніздуванні та в репродуктивний період виявля-

ний головним чином у межах Хотинської височини і в Буковинському Передкарпатті [2].

Фактори загрози. Суцільне вирубування лісів, зокрема ділянок дерев із гніздами, меліорація, іноді – пряме переслідування людиною.

Рекомендовані заходи охорони. Необхідно провести детальне обстеження характерних місцеперебувань виду й організувати довкола нововиявлених та вже відомих гнізд спеціальні охоронні зони.



### Джерела інформації:

1. Годованець, 2006; 2. Луговой, Потіш, 1998; 3. Луговой, Потіш, 2004; 4. Бокотей, Дзюбенко, 2005; 5. Фесенко, Бокотей, 2002.

Текст: Л. Потіш  
Фото: I. Lorincz