

Підсоколик великий (чеглик)

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Клас
Птахи – Aves

Ряд
Соколоподібні – Falconiformes


Родина
Соколові – Falconidae

Охоронний статус: Bern: II; Bonn: II;
CITES: II; ЧКК: LC

Поширення. Мешкає на обширній території Євразії і Північної Африки. Віддає перевагу світлим лісам у поєднанні з відкритими ландшафтами. На більшій частині ареалу перелітний птах, зимує в Африці і тропічній Азії.

Україна: Звичайний вид.

Середовищє існування та особливості біології. Селиться в старих розріджених, переважно листяних




і мішаних лісах. Гніздиться поблизу гаявин, в перелісках між полями, на краях лісів, обов'язково поблизу широких річкових заплав [3], меліорованіх боліт, полів, лук. Займає старі гнізда воронових, хижих.

Сучасний стан. У минулому – звичайний широко розповсюджений, а сьогодні – рідкісний гніздовий вид [1]. Відомі спроби зимівлі особин виду на території регіону. На території Бескидів його чисельність оцінюють у 0,03 пари/км² [2, 1].

Фактори загрози. Достовірно не відомо. Ймовірно, трансформація життєво важливих біотопів (вирубування старих лісів, сільськогосподарське освоєння відкритих просторів); винищенння людиною; збіднення кормової бази; використання отрутохімікатів.

Рекомендовані заходи охорони. Створення заказників у місцях гніздування. Пропаганда охорони виду.



Джерела інформації:

- Горбань та ін., 2003а;
- Башта, 2003;
- Потіш 2009.

Текст: Л. Потіш
Фото: I. Lorinc