

Кібчик

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Клас
Птахи – Aves

Ряд
Соколоподібні – Falconiformes

Родина
Соколові – Falconidae



Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: II; ЄЧС: VU; BonnC: II; ЧКК: NT

Поширення. Заселяє територію Центральної та Східної Європи, частково Середню Азію від півпустель до північної тайги, однак виділяється лише два типи ландшафтів, в яких він досягає оптимальної чисельності – це середньо- і південно-тайгові ліси та незаймані степи, порізані долинами та яристими лісами чи лісо-смугами.

Україна: У степових і лісостепових районах кібчик тяжіє до неосвоєних

або відновлених ділянок степів. Населяє різновікові прируслові ліси річок Карпат.

Середовище існування та особливості біології. Прилітають у травні. До розмноження приступають пізно, що пов'язане з розмноженням великих комах. Колоніальний вид. Гнізда розташовуються на різноманітних породах дерев, переважно листяних (тополя, береза, осика). Живиться великими комахами, зрідка ловить дрібних гризунів, ящірок.


Сучасний стан. На гніздуванні неглибоко в гори може проникати річковими долинами [1]. У Beskidaх спостерігається дуже рідко, переважно на перельотах [2]. Буковина – Закарпаття – на території області мешкає в невеликій кількості в різних біотопах, уникаючи суцільних лісових масивів. Найбільша кількість виявлена в заплавах уздовж водотоку р. Тиса від с. Вілок до смт. Буштині включно [3].

Фактори загрози. Антропогенна трансформація місць, придатних для гніздування, динамічні зміни чисельності видів кормового раціону, знищення біотопів, зокрема вирубування придатних для гніздування дерев.

Рекомендовані заходи охорони. В місцях гніздування залишати старі дерева, в особливості ті, які освоєні видом, створення природоохоронних територій і охоронних зон навколо гнізд.

Джерела інформації:

1. Страутман, 1954; 2. Bashta, 2007; 3. Потіш, 2009.



Текст: Л. Потіш
Фото: М. Еней