

## Совка

*Otus scops*  
(Linnaeus, 1758)

Клас  
Птахи – Aves

Ряд  
Совоподібні – Strigiformes

Родина  
Совові – Strigidae

Охоронний статус: BernC: II; CITES: II;  
ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

**Поширення.** Південна та Центральна Європа, Північна Африка, Середня Азія. Зимує в Екваторіальній Африці.

**Україна:** Гніздиться в степовій зоні та південному лісостепу, Криму, на Закарпатті [1].

**Середовище існування та особливості біології.** Гніздовий, перелітний вид. На місцях гнідування з'являється, залежно від погодних умов, починаючи з кінця березня –



до початку травня. Селиться в старих мішаних і листяних розріджених лісах. Гніздиться в дуплах, старих гніздах сорок, штучних гніздівлях, норах. Кладка – 3-6 білих яєць; період насижування – 21-29 діб. Пташенята можуть залишатися в гнізді до трьох тижнів. Гніздо покидають неодноразово: молодші – на 2-4 дні пізніше старших. Починають літати приблизно через 30-33 дні. Осіння міграція – в кінці вересня. Живиться совка переважно комахами, рідше гризунами і дрібними птахами.

**Сучасний стан.** Ф. Страутман вважав совку рідкісним гніздовим видом Карпат, вказуючи її спостереження для букових лісів південно-східних схилів Карпат, під полонинами Кук і Боржава. В останні роки в Карпатах совка виявлена на території «Долини Нарцисів», в околицях г.Менчул Квасівський, в Угольському масиві Карпатського БЗ і в районі полонини Красна. Рідкісний гніздовий вид Карпат [1, 2].

**Фактори загрози.** Достеменно не вивчені. Ймовірно, вирубування дуплистих дерев, зменшення площ старих лісів з дуплистими деревами. Хижакство куниці.

**Рекомендовані заходи охорони.** Збереження стиглих насаджень і дуплистих дерев. Вивчення екології виду та контроль стану популяції. Виявлення та охорона місць гнідування. Приваблювання в штучні гніздівлі.

### Джерела інформації:

- Башта, Архипов, 2009;
- Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта  
Фото: М. Еней

