

УДК 519.21

DOI:10.24144/2616-7700.2018.2(33).61-69

О. М. Гопкало (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка)

**Умови обмеженості гауссового випадкового процесу з ймовірністю 1 на  $\mathbb{R}^+$  та їх застосування**

Conditions of boundedness with probability 1 for Gaussian stochastic processes on  $\mathbb{R}^+$  are found in the paper. Application of the conditions is considered.

В роботі знайдено умови обмеженості гауссових випадкових процесів на  $\mathbb{R}^+$  з ймовірністю 1 та розглянуто застосування даних умов.

**1. Вступ.** Нехай  $(\Omega, F, P)$  — стандартний ймовірнісний простір,  $S$  — деяка непорожня параметрична множина,  $\xi = (\xi(t), t \in S)$  — випадковий процес, заданий на  $(\Omega, F, P)$ .

Робота присвячена знаходженню умов, за яких  $\xi(t)$  — обмежений на  $\mathbb{R}^+$  процес з ймовірністю 1, тобто  $P(\sup_{t \in \mathbb{R}^+} |\xi(t)| < \infty) = 1, t \in \mathbb{R}^+$ .

Ця задача є нетривіальною. Подібним задачам, а саме дослідженню поведінки супремума на нескінченності, присвячено багато робіт, зокрема роботи [3] – [6].

Робота є актуальною, оскільки знайдені результати можна застосовувати для знаходження розв'язків рівнянь математичної фізики.

**2. Базові визначення.** У цьому розділі наведемо кілька означень та тверджень, які будуть використані при доведенні основних результатів.

**Означення 1** (див. [1]). Нехай  $S$  деяка непорожня множина. Функція  $\rho : S * S \rightarrow [0, \infty)$  називається псевдометрикою, якщо вона задовольняє наступним умовам:

1.  $\rho(t, s) = \rho(s, t), t, s \in S$ ;
2.  $\rho(t, s) \leq \rho(t, v) + \rho(v, s), t, v, s \in S$ ;
3. якщо  $t = s$ , то  $\rho(t, s) = 0$ , але якщо  $\rho(t, s) = 0$ , то не обов'язково  $t = s$ .

Таким чином, простір  $(S, \rho)$  називається псевдометричним, якщо для нього виконуються всі аксіоми метричного простору за винятком однієї, а саме: з того, що  $\rho(s, t) = 0$  не випливає, що  $t = s$ .

Наприклад, нехай  $\xi(t), t \in T$  — процес другого порядку,  $\rho(t, s) = (\mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2)^{\frac{1}{2}}, t, s \in T$ . Легко бачити, що всі аксіоми метрики для  $\rho(t, s)$  виконуються, але коли  $\rho(t, s) = 0$ , то  $\xi(t) = \xi(s)$  з ймовірністю одиниця, але не обов'язково  $t$  дорівнює  $s$ . Отже,  $(T, \rho)$  — псевдометричний простір.

Тепер нехай  $(S, \rho)$  — псевдометричний простір.

**Означення 2** (див. напр. [1], [2]). Систему замкнених куль  $\mathbb{B} = \{B\}, B \subset S$ , радіуси яких не більші за  $\varepsilon$ , називають  $\varepsilon$ -покриттям множини  $S$ , якщо  $\cup_{B \in \mathbb{B}} B = S$ .

**Означення 3** (див.напр. [1], [2]). Множину  $Q \subset S$  називають  $\varepsilon$ -сіткою в множині  $S$  відносно псевдометрики  $\rho$ , якщо для будь-якої точки  $x \in S$  існує хоч одна точка  $y \in Q$ , така що  $\rho(x, y) \leq \varepsilon$ .

**Означення 4** (див. [1], [2]). Якщо існує скінченне  $\varepsilon$ -покриття множини  $S$ , то позначимо  $N_\rho(S, \varepsilon)$  число елементів у найменшому  $\varepsilon$ -покритті цієї множини. Крім того, покладемо  $N_\rho(S, \varepsilon) = +\infty$ , якщо не існує скінченного  $\varepsilon$ -покриття множини  $S$ . Таку функцію  $N_\rho(S, \varepsilon)$  називають метричною масивністю множини  $S$  відносно псевдометрики  $\rho$ .

**Означення 5** (див. [1]). Функція

$$H_\rho(S, \varepsilon) = \begin{cases} \ln N_\rho(S, \varepsilon), & \text{якщо } N_\rho(S, \varepsilon) < \infty, \\ +\infty, & \text{якщо } N_\rho(S, \varepsilon) = +\infty \end{cases}$$

називається метричною ентропією відносно метрики  $\rho$ .

Нехай  $\xi(x)$ ,  $x \geq 0$  — центрований сепарабельний гауссовий процес,  $x \in S$ . На  $S$  розглянемо псевдометрику  $\rho(x, y) = (\mathbb{E}(\xi(x) - \xi(y))^2)^{\frac{1}{2}}$ .

Введемо умови:

1.  $\varepsilon_0 = \sup_{x \in S} (\mathbb{E}(\xi(x))^2)^{\frac{1}{2}} < +\infty$ .
2. Простір  $(S, \rho)$  — сепарабельний та процес  $\xi(x)$  — сепарабельний на  $(S, \rho)$ .

Позначимо  $N(\varepsilon) = N_\rho(S, \varepsilon)$ ,  $H(\varepsilon) = \ln N(\varepsilon)$ .

Наступна теорема доведена в [1] (ст. 106, заув. 4.3) для субгауссових процесів. Оскільки гауссові процеси є субгауссовими з  $\phi^*(x) = \frac{x^2}{2}$  та  $\tau(\xi) = \mathbb{E}\xi^2(x)$ , то для гауссових процесів теорема має наступний вигляд:

**Теорема 1** (див. [1]). Нехай  $X = (X(t), t \in S)$  — деякий сепарабельний гауссовий процес. Якщо виконуються умови 1. – 2., та  $I(\varepsilon_0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_0} \sqrt{H(\varepsilon)} d\varepsilon < +\infty$ , де  $H(\varepsilon)$  — метрична ентропія множини  $S$  відносно  $\rho$ , то  $\forall \lambda > 0, \forall u > 8I(\varepsilon_0)$  має місце нерівність:

$$\mathbb{P}\{\sup_{t \in S} |X(t)| \geq u\} \leq 2A(u),$$

де

$$A(u) = \exp\left\{-\frac{1}{2\varepsilon_0^2}(u - \sqrt{8uI(\varepsilon_0)})^2\right\}.$$

### 3. Оцінки розподілу супремума випадкового гауссового процесу на $\mathbb{R}^+$ .

Нехай  $\xi(x)$ ,  $x \geq 0$  — центрований сепарабельний гауссовий процес такий, що виконуються умови:

A1.  $\mathbb{E}\xi(x)\xi(y) = R(x, y)$ ,  $x \in S, y \in S$ , де  $S = [0, \infty)$ .

A2. Нехай  $\{B_k; k = 0, 1, \dots\}$  — послідовність розбиттів множини  $S$  на підмножини  $B_k = [b_k; b_{k+1})$ , де  $b_{k+1} > b_k, b_0 = 0, b_k \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$ .  $H_k(u)$  — метрична ентропія множини  $B_k$  відносно псевдометрики  $\rho(x, y) = (\mathbb{E}(\xi(x) - \xi(y))^2)^{\frac{1}{2}}$ ; та  $\forall v > 0, k > 0$  виконується умова Дадлі:  $\int_0^v \sqrt{H_k(u)} du < \infty$ .

Знайдемо умови, за яких

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| < \infty\} = 1$$

та отримаємо оцінки розподілу випадкової величини  $\sup_{x \geq 0} |\xi(x)|$ .

**Теорема 2.** Нехай  $\xi(x), x \geq 0$  — гауссовий процес, для якого виконуються умови A1 та A2,  $\rho(x, y) = (\mathbf{E}(\xi(x) - \xi(y))^2)^{\frac{1}{2}}$ .

Тоді при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} I(\varepsilon_{0k}) = \varepsilon^*$ , де  $\varepsilon_{0k} = \sup_{t \in B_k} [\mathbf{E}(\xi(t))^2]^{1/2}$ ;  $I(v) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^v \sqrt{H_k(u)} du, v > 0$ , справеджується нерівність:

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2A_k(\varepsilon), \quad (1)$$

де

$$A_k(\varepsilon) = \exp\left\{-\frac{1}{2\varepsilon_{0k}^2}(\varepsilon - \sqrt{8\varepsilon I(\varepsilon_{0k})})^2\right\}. \quad (2)$$

Якщо при деякому  $\hat{\varepsilon} \geq \varepsilon^*$  збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} A_k(\hat{\varepsilon})$ , то при всіх  $\varepsilon \geq \hat{\varepsilon}$  збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} A_k(\varepsilon)$  та при  $\varepsilon \geq \hat{\varepsilon}$  має місце нерівність:

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} A_k(\varepsilon)$$

та

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| < \infty\} = 1.$$

**Доведення.** Розглянемо послідовність  $(b_k) : b_k \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty; b_0 = 0, b_{k+1} > b_k; B_k = [b_k, b_{k+1}]$ . Тоді

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} = \mathbf{P}\left\{\bigcup_{k=0}^{\infty} \sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\right\} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{P}\{\sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\}. \quad (3)$$

З теореми 1 випливає, що, якщо  $\varepsilon_{0k} < \infty; I(\varepsilon_{0k}) < \infty$  та якщо  $\xi(x)$  — сепарабельний, то:

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2A_k(\varepsilon) \quad (4)$$

де

$$A_k(\varepsilon) = \exp\left\{-\frac{1}{2\varepsilon_{0k}^2}(\varepsilon - \sqrt{8\varepsilon I(\varepsilon_{0k})})^2\right\}.$$

при  $\varepsilon > 8I(\varepsilon_{0k})$ .

Отже, з (3) та (4) випливає, що при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} I(\varepsilon_{0k})$ :

$$\mathbf{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2A(\varepsilon),$$

де  $A(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(\varepsilon)$ .

Доведемо, що  $A(\varepsilon) \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0$ . Оскільки  $A_k(\varepsilon) < A_k(\hat{\varepsilon})$  при  $\hat{\varepsilon} \leq \varepsilon$ , то з того, що  $\sum_{k=0}^{\infty} A_k(\hat{\varepsilon}) < \infty$ , випливає, що  $\sum_{k=0}^{\infty} A_k(\varepsilon) < \infty$ . Треба довести, що для будь-якого  $\delta$  при досить великих  $\varepsilon$ :  $A(\varepsilon) < \delta$ .

Нехай  $M \in \mathbb{N}$ . Тоді

$$A(\varepsilon) = \sum_{k=0}^M A_k(\varepsilon) + \sum_{k=M+1}^{\infty} A_k(\varepsilon) \leq \sum_{k=0}^M A_k(\varepsilon) + \sum_{k=M+1}^{\infty} A_k(\hat{\varepsilon}).$$

Вибираємо  $M$  таке, що  $\sum_{k=M+1}^{\infty} A_k(\hat{\varepsilon}) \leq \frac{\delta}{2}$  та  $C$  таке, що при  $\varepsilon > C, k \leq M$ :  $A_k(\varepsilon) < \frac{\delta}{2(M+1)}$ . Тоді

$$A(\varepsilon) \leq \sum_{k=0}^M \frac{\delta}{2(M+1)} + \frac{\delta}{2} \leq \delta.$$

Отже,

$$A(\varepsilon) \rightarrow 0, \text{ при } \varepsilon \rightarrow \infty,$$

тому ряд  $A(\varepsilon)$  збігається при всіх  $\varepsilon > \max(C, \hat{\varepsilon})$ .

**Наслідок 1.** *Нехай виконуються умови теореми 2, але замість умови A2 виконується умова:*

$$\sup_{t,s \in B_k, |t-s| \leq h} (\mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2)^{\frac{1}{2}} \leq \sigma_k(h) \quad (5)$$

де  $\sigma_k(h)$  — монотонно зростаюча неперервна функція,  $\sigma_k(0) = 0$  та умова

$$\hat{I}(\varepsilon_{0k}) < \infty, k \geq 0,$$

де

$$\hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln(1 + \frac{b_{k+1} - b_k}{2\sigma_k^{-1}(u)})} du. \quad (6)$$

Тоді при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} \hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \hat{\varepsilon}^*$  справджується нерівність:

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2\hat{A}_k(\varepsilon),$$

де

$$\hat{A}_k(\varepsilon) = \exp\left\{-\frac{1}{2\varepsilon_{0k}^2}(\varepsilon - \sqrt{8\varepsilon\hat{I}(\varepsilon_{0k})})^2\right\}.$$

Якщо при деякому  $\hat{\varepsilon} \geq \hat{\varepsilon}^*$  збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\hat{\varepsilon})$ , то при всіх  $\varepsilon \geq \hat{\varepsilon}$  збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon)$  та при  $\varepsilon \geq \hat{\varepsilon}$  має місце нерівність:

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon) \quad (7)$$

та

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| < \infty\} = 1.$$

**Доведення.** Функція  $\sigma_k(h)$  — монотонно зростаюча неперервна функція,  $\sigma_k(0) = 0$ , залежить від  $b_k$  та  $b_{k+1}$ . Тоді

$$N_k(u) \leq \frac{b_{k+1} - b_k}{2\sigma_k^{-1}(u)} + 1$$

та

$$H_k(u) \leq \ln\left(\frac{b_{k+1} - b_k}{2\sigma_k^{-1}(u)} + 1\right). \quad (8)$$

$$\varepsilon_{0k} = \sup_{t \in B_k} [\mathbb{E}(\xi(t))^2]^{1/2},$$

що випливає з умов A1 - A2.

Тоді умова (5) виконується, при  $\forall t, s \in B_k : |t - s| \leq h$  та

$$I(\varepsilon_{0k}) \leq \hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln\left(1 + \frac{b_{k+1} - b_k}{2\sigma_k^{-1}(u)}\right)} du.$$

Тоді з (1) випливає

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon)$$

при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} \hat{I}(\varepsilon_{0k})$ .

Далі доведення наслідку повторює доведення теореми 2.

**Теорема 3.** *Нехай виконуються умови наслідку 1, але замість умови (5) виконуються умови:  $E\xi(x)\xi(y) = R(x, y) = \int_0^{+\infty} f(x, u)f(y, u)dF(u)$ , де  $F(u)$  – деяка функція розподілу,  $f(x, u), x \geq 0, u \geq 0$  така вимірна функція, що  $\int_0^{+\infty} (f(x, u))^2 dF(u) < \infty$  та для якої виконується нерівність  $|f(t, u) - f(s, u)| \leq \hat{\sigma}_k(h)g(u, b_k), \forall t, s \in B_k : |t - s| \leq h$  та  $Z_k = \int_0^{\infty} g(u, b_k)dF(u) < \infty, g(u, b_k) > 0$ .*

*Якщо виконується умова:*

$$\hat{I}(\varepsilon_{0k}) < \infty, \quad k \geq 0,$$

де

$$\hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln\left(1 + \frac{b_{k+1} - b_k}{2\hat{\sigma}_k^{-1}\left(\frac{u}{Z_k}\right)}\right)} du.$$

то при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} \hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \hat{\varepsilon}^*$  справджується нерівність:

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \in B_k} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2\hat{A}_k(\varepsilon),$$

де

$$\hat{A}_k(\varepsilon) = \exp\left\{-\frac{1}{2\varepsilon_{0k}^2}(\varepsilon - \sqrt{8\varepsilon\hat{I}(\varepsilon_{0k})})^2\right\}. \quad (9)$$

Якщо при деякому  $\hat{\varepsilon} \geq \hat{\varepsilon}^*$  збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\hat{\varepsilon})$ , то при всіх  $\varepsilon \geq \hat{\varepsilon}$  має місце нерівність:

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon) \quad (10)$$

та

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| < \infty\} = 1.$$

**Доведення.** Легко бачити, що

$$\varepsilon_{0k} = \sup_{t \in B_k} [E(\xi(t))^2]^{1/2} = \sup_{t \in B_k} \left[ \int_0^{\infty} f(t, u)^2 dF(u) \right]^{1/2} = \sup_{t \in B_k} [R(t, t)]^{1/2},$$

що випливає з умов A1 - A2 та умов теореми 3.

$$\begin{aligned} E(\xi(t) - \xi(s))^2 &= E(\xi(t))^2 - 2E\xi(t)\xi(s) + E(\xi(s))^2 = R(t, t) - 2R(t, s) + R(s, s) = \\ &= \int_0^{\infty} (f(t, u)^2 - 2f(t, u)f(s, u) + f(s, u)^2) dF(u) = \int_0^{\infty} (f(t, u) - f(s, u))^2 dF(u). \end{aligned}$$

Тоді умова (5) матиме вигляд:

$$\sup_{t,s \in B_k, |t-s| \leq h} (\mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2)^{\frac{1}{2}} \leq \hat{\sigma}_k(h) Z_k \quad (11)$$

де  $\hat{\sigma}_k(h)$  — монотонно зростаюча неперервна функція,  $\hat{\sigma}_k(0) = 0$ ;  $g(u, b_k) > 0$ ,  $\forall k \geq 0$  та  $\sqrt{\int_0^\infty g^2(u, b_k) dF(u)} = Z_k < \infty$  при

$$|f(t, u) - f(s, u)| \leq \hat{\sigma}_k(h) g(u, b_k)$$

$\forall t, s \in B_k: |t - s| \leq h$ .

Тоді  $\sigma_k(h) = Z_k \hat{\sigma}_k(h)$  та  $\sigma_k^{-1}(h) = \hat{\sigma}_k^{-1}(\frac{h}{Z_k})$  та

$$I(\varepsilon_{0k}) \leq \hat{I}(\varepsilon_{0k}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\theta \varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln(1 + \frac{b_{k+1} - b_k}{2\hat{\sigma}_k^{-1}(\frac{u}{Z_k})})} du$$

Тоді з (1) випливає

$$\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| > \varepsilon\} \leq 2 \sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon_{0k})$$

при  $\varepsilon > 8 \max_{k \geq 0} \hat{I}(\theta \varepsilon_{0k})$ .

**Приклад 1.** Нехай в умовах теореми 3 функція розподілу  $f(t, u)$  має вигляд:  $f(t, u) = \frac{\cos tu}{c(t)}$ , причому функцію  $c(t)$  виберемо такою, що  $c(t)$  — зростаюча,  $c(t) \geq 1$ ;  $c(t) \rightarrow \infty$ ;  $t \rightarrow \infty$  та  $|c(t) - c(s)| \leq C|t - s|^\alpha$ ;  $\alpha \leq 1$ ;  $C = \text{const}$ .

Оцінимо  $\mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2$  на відрізку  $[b_k; b_{k+1}]$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2 &= \int_0^\infty (f(t, u) - f(s, u))^2 dF(u) \leq \\ &\leq \int_0^\infty \left( \frac{|2 \sin u(t - s)|}{c(t)} + \frac{|c(t) - c(s)|}{c(t)c(s)} \right)^2 dF(u). \end{aligned} \quad (12)$$

Оскільки  $|\sin u(t - s)| \leq |u(t - s)|^\alpha$ ;  $0 < \alpha \leq 1$ , то з (12) випливає

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2 &\leq \int_0^\infty \left( \frac{2|u|^\alpha |t - s|^\alpha}{c(b_k)} + \frac{C|t - s|^\alpha}{c^2(b_k)} \right)^2 dF(u) \leq \\ &\leq |t - s|^{2\alpha} \int_0^\infty \left( \frac{2|u|^\alpha}{c(b_k)} + \frac{C}{c^2(b_k)} \right)^2 dF(u) \end{aligned} \quad (13)$$

Припустимо, що  $\int_0^\infty u^{2\alpha} dF(u) < \infty$ .

Отже, отримано, що  $|f(t, u) - f(s, u)| \leq \hat{\sigma}_k(h) g(u, b_k)$ , де  $\hat{\sigma}_k(h) = h^\alpha = |t - s|^\alpha$ ,  $g(u, b_k) = \frac{2|u|^\alpha}{c(b_k)} + \frac{C}{c^2(b_k)}$ . Звідси маємо:

$$(\mathbb{E}(\xi(t) - \xi(s))^2)^{\frac{1}{2}} \leq h^\alpha \left( \int_0^\infty \left( \frac{2|u|^\alpha}{c(b_k)} + \frac{C}{c^2(b_k)} \right)^2 dF(u) \right)^{\frac{1}{2}} = h^\alpha Z_k,$$

де  $Z_k = \left( \int_0^\infty (g(u, b_k))^2 dF(u) \right)^{\frac{1}{2}}$ .

Тоді за теоремою 3 отримуємо:  $\sigma_k(h) = Z_k \hat{\sigma}_k(h)$ ;  $\sigma_k^{-1}(x) = (\frac{x}{Z_k})^{1/\alpha}$ ,

$$\varepsilon_{0k} = \sup_{t \in B_k} [\mathbb{E}(\xi(t))^2]^{1/2} = \sup_{t \in B_k} \left[ \int_0^\infty \frac{\cos^2 tu}{c^2(t)} dF(u) \right]^{1/2} \leq \frac{1}{c(b_k)} \int_0^\infty dF(u) = \frac{F(+\infty)}{c(b_k)}$$

$$\begin{aligned} \hat{I}(\varepsilon_{0k}) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln \left( 1 + \frac{b_{k+1} - b_k}{2 \left( \frac{x}{Z_k^2} \right)^{1/\alpha}} \right)} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \sqrt{\ln \left( 1 + \frac{(b_{k+1} - b_k)(Z_k^2)^{1/\alpha}}{2} \frac{1}{x^{1/\alpha}} \right)} dx \end{aligned}$$

Як відомо,  $\ln(1+x) \leq \frac{x^\beta}{\beta}$ ;  $0 < \beta \leq 1$  при  $x > 0$ . Тому

$$\begin{aligned} \hat{I}(\varepsilon_{0k}) &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} \left[ \left( \frac{(b_{k+1} - b_k) Z_k^{2/\alpha}}{2x^{1/\alpha}} \right)^\beta \frac{1}{\beta} \right]^{1/2} dx = \\ &= \frac{(b_{k+1} - b_k)^{\beta/2} Z_k^{2\beta/2\alpha}}{2\sqrt{\beta}} \int_0^{\varepsilon_{0k}} x^{-\frac{\beta}{2\alpha}} dx. \end{aligned}$$

Інтеграл  $\int_0^{\varepsilon_{0k}} x^{-\frac{\beta}{2\alpha}} dx$  – збігається, якщо  $\beta \leq 2\alpha$ . Отже, маємо:

$$\hat{I}(\varepsilon_{0k}) \leq \frac{(b_{k+1} - b_k)^{\beta/2} Z_k^{2\beta/2\alpha}}{2\sqrt{\beta}} \frac{\varepsilon_{0k}^{1-\beta/2\alpha}}{1-\beta/2\alpha} = R_k \frac{\varepsilon_{0k}^{1-\beta/2\alpha}}{1-\beta/2\alpha},$$

$$\text{де } R_k = \frac{(b_{k+1} - b_k)^{\beta/2} Z_k^{2\beta/2\alpha}}{2\sqrt{\beta}}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \hat{A}_k(\varepsilon) &\leq \exp \left\{ -\frac{1}{2\varepsilon_{0k}^2} (\varepsilon - \sqrt{8\varepsilon \hat{I}(\varepsilon_{0k})})^2 \right\} \leq \\ &\leq \exp \left\{ -\frac{c^2(b_k)}{2F^2(+\infty)} \left( \varepsilon - \sqrt{8\varepsilon R_k * \frac{\varepsilon_{0k}^{1-\beta/2\alpha}}{1-\beta/2\alpha}} \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

Залишилося довести збіжність ряду  $\sum_{k=0}^\infty \hat{A}_k(\varepsilon)$ . Якщо цей ряд збігається, то  $\mathbb{P}\{\sup_{x \geq 0} |\xi(x)| < \infty\} = 1$ .

Покладемо  $\alpha = \beta$ . Тоді

$$\hat{A}_k(\varepsilon) = \exp \left\{ -\frac{c^2(b_k)}{2F^2(+\infty)} \left( \varepsilon - \sqrt{8\varepsilon R_k \left( \frac{F(+\infty)}{c(b_k)} \right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{2}} \right)^2 \right\}$$

$$Z_k = \left( \int_0^\infty \left( \frac{2|u|^\alpha}{c(b_k)} + \frac{C}{c^2(b_k)} \right)^2 dF(u) \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{c(b_k)} \left( \int_0^\infty (2|u|^\alpha + C)^2 dF(u) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Припустимо, що виконується умова:  $\int_0^\infty u^{2\alpha} dF(u) < \infty$ .

Покладемо  $\left( \int_0^\infty (2|u|^\alpha + C)^2 dF(u) \right)^{\frac{1}{2}} = S$ . Звідси  $Z_k = \frac{S}{c(b_k)}$ . Беремо  $b_k = \exp\{k\}$ . Тоді  $R_k$  матиме вигляд:

$$R_k = \frac{(e^{k+1} - e^k)^{\alpha/2} S}{2\sqrt{\alpha}c(e^k)} = \frac{e^{\alpha k/2}(e-1)^{\alpha/2} S}{2\sqrt{\alpha}c(e^k)}$$

$$\hat{A}_k(\varepsilon) = \exp \left\{ -\frac{c^2(e^k)}{2F^2(+\infty)} \left( \varepsilon - \left[ 8\sqrt{2}\varepsilon \frac{e^{\alpha k/2}(e-1)^{\alpha/2} S}{2\sqrt{\alpha}c(e^k)} \sqrt{\frac{F(+\infty)}{c(e^k)}} \right]^{\frac{1}{2}} \right)^2 \right\}$$

Якщо  $\frac{e^{\frac{\alpha k}{2}}}{(c(e^k))^{3/2}} \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ , то, якщо ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{c^2(b_k)}{2F^2(+\infty)} \right\}$  збігається, то, для досить великих  $\varepsilon$ , збігається ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \hat{A}_k(\varepsilon)$ .

Нехай  $\exp \left\{ -\frac{c^2(b_k)}{2F^2(+\infty)} \right\} = \frac{1}{k^2}$ ; тоді

$$c^2(b_k) = 2 \ln k * 2F^2(+\infty);$$

$$c(b_k) = 2F(+\infty)\sqrt{\ln k} \leq \hat{C}(\ln k)^{1/2}, \text{ де } \hat{C} - \text{деяка константа}$$

$$b_k = \exp\{k\}; e^k = t; c(t) \geq \hat{C}(\ln \ln t)^{1/2}.$$

Отже, ми показали, що гауссовий процес  $\xi(t)$  такий, що  $E\xi(t) = 0$ ,  $E\xi(t)\xi(s) = \int_0^{\infty} \frac{\cos tu \cos su}{c(t)c(s)} dF(u)$ ,  $t, s \geq 0$  буде обмежений на  $\mathbb{R}^+$  з ймовірністю 1, якщо виконуються умови:

– для деякого  $\alpha$ ,  $0 < \alpha < 1$ :  $\int_0^{\infty} u^{2\alpha} dF(u) < \infty$

–  $c(t)$  – така функція, що  $c(t) \geq 1$ ,  $c(t)$  – монотонно зростає;  $|c(t) - c(s)| \leq C|t - s|^\alpha$ ;  $\alpha \leq 1$ ;  $C = \text{const}$ , та для досить великих  $t$ :  $c(t) \geq C(\ln \ln t)^{1/2}$ .

Наприклад, враховуючи те, що  $\frac{e^{\frac{\alpha k}{2}}}{(c(e^k))^{3/2}} \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ , ми можемо покласти  $c(t) = t^\alpha$  при  $t > 1$ .

Розглянемо задачу Коші на нескінченній прямій:  
у фазовій площині

$$\Omega = \{(t, x) | 0 < t < +\infty, -\infty < x < +\infty\}$$

знайти обмежений розв'язок рівняння теплопровідності:

$$\begin{cases} u_t(t, x) = a^2 u_{xx}(t, x); \\ u(0, x) = \xi(x), x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (14)$$

де  $\xi(x)$  – відома, неперервна обмежена на всій осі функція. Вважаємо, що  $u(t, x)$  при  $t = 0$  неперервна, тобто

$$\lim_{t \rightarrow 0, x \rightarrow x_0} u(t, x) = \xi(x_0).$$

Застосуємо результати знайдені вище для знаходження розв'язків задачі (14) з випадковими початковими умовами.

**Теорема 4.** Нехай  $\xi(x), x \geq 0$  – центрований гауссовий процес, для якого виконується наступна умова:

$$\sup_{t \geq 0} |\xi(t)| < \infty$$



з ймовірністю 1.

Тоді

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \xi(v) \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp -\frac{(v-x)^2}{4a^2t} dv$$

є обмеженим розв'язком задачі Коші (14).

**Наслідок 2.** Нехай  $\xi(x)$  такий процес, що при  $x \geq 0$  для  $\xi(x)$  виконуються умови теорем доведених вище, а при  $x \leq 0$  :  $\xi(x) = \xi(-x)$ . Тоді виконуються умови теореми 4.

1. *Buldygin V. V., Kozachenko Yu. V.* Metric Characterization of Random Variables and Random Processes. – American Mathematical Society, Providence, RI, 2000. – 257 p.
2. *Козаченко Ю. В.* Случайные процессы в пространствах Орлича I // Теория вероятностей и математическая статистика – 1984. – № 30 – С. 92–107.
3. *Kozachenko Yu., Slyvka-Tylyshchak A.* The Cauchy problem for the heat equation with a random right part from the space  $Sub_{\phi}(\Omega)$  // Applied Mathematics – 2014. – No. 5 – P. 2318–2333.
4. *Kozachenko Yu., Melnicov A., Mishura Yu.* On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion // Statistics . A Journal of theoretical and applied statistics – 2015. – Vol. 49, No. 1. – P. 35–62.
5. *Kozachenko Yu., Dozzi M., Mishura Yu., Ralchenko K.* Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation // Statistical Inference for Stochastic processes – 2018. – Vol. 21, No. 1. – P.21–52.
6. *Kozachenko Yu., Orsingher E., Sakhno L., Vasylyk O.* Estimates for functional of solution to Higher-Order Heat-Type equation with random initial condition // Journal of statistical physics first online –Sep. 2018. – Vol. 72, No. 6. – P.1641–1662.

Одержано 18.09.2018