


## Дрімлюга звичайна

*Caprimulgus europaeus*  
(Linnaeus, 1758)

Клас  
Птахи – Aves

Ряд  
Дрімлюгоподібні – Caprimulgiformes

Родина  
Дрімлюгові – Caprimulgidae



Охоронний статус: BernC: II; BD: I;  
ЧКУ: VU

Поширення. Євразія. Зимує в Африці.

Україна: Поширений на всій території.

Середовище існування та особливості біології. Селиться у світлих листяних і мішаних лісах, поблизу галевин і річкових долин. Прилітає в середині травня. Гнізда не будує, яйця відкладає просто на лісову підстилку чи пеньок. Кладка – переваж-


но 2 плямистих яйця, з'являється з по-ловини травня. Період насиджування – 16-18 діб. Пташенята покидають гніздо у віці 23-24 дні. Осінній відліт – у вересні. Живиться дрімлюга нічними комахами, яких ловить на льоту, рідко – на землі.

Сучасний стан. Рідкісний гніздовий вид, у минулому – досить поширений на території регіону [1, 2]. В останні десятиліття, очевидно, його чисельність зменшилася і зараз він трапля-

ється значно рідше. Спостереження відомі з багатьох регіонів Українських Карпат, насамперед – з передгір'їв і низькогір'я [3, 4].

Фактори загрози. Загибель кладок і пташенят внаслідок надмірної рекреації та збирання грибів і ягід у місцях гніздування, використання отрутохімікатів на полях.

Рекомендовані заходи охорони. Охорона місць гніздування виду.



### Джерела інформації:

- Страутман, 1954;
- Татаринов, 1973;
- Бокотей та ін., 2005;
- Потіш, 2009.