

ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА ТА КІЛЬКІСТЬ
ОКРЕМИХ ФОРМ ЛЕЙКОЦИТІВ ЛІТРА КРОВІ
РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СУДИННОГО РУСЛА
ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ РЕВМАТИЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Ст. 2 курсу Тарасюк К.В.

Науковий керівник: доц. Лазорик М.І.

В мазках крові, взятих з пальця (капілярний відділ судинного
русла, вени (венозний відділ) та крові, взятої за методикою акад. В.П.

Казначєєва (артеріальний відділ), котрі фарбувалися за Папенгеймом-Крюковим, рахували лейкоцитарну формулу. На основі результатів визначення кількості лейкоцитів в літрі крові та даних лейкоцитарної формули визначали кількість окремих форм лейкоцитів в системі СІ.

Обстежено 10 практично здорових (контроль) та 20 хворих остеохондрозом хребта і деформуючим остеоартрозом до початку лікування.

Виявлено різницю кількості окремих форм лейкоцитів як в мазку, так і в літрі крові при порівнянні результатів різних відділів судинного русла як у здорових, так і у хворих. Різниці показників були більш вираженими при порівнянні результатів капілярного та венозного відділів, при цьому у хворих вони були достовірними.