

## ПРО ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ НЕЛІНІЙНИХ АВТОНОМНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ У КРИТИЧНОМУ ВИПАДКУ

І. І. Король

Ужгород. нац. ун-т

Україна, 88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46

*We suggest a new numerical-analytical algorithm for studying periodic solutions of nonlinear autonomous systems of ordinary differential equations in the critical case.*

*Предложен новый численно-аналитический алгоритм исследования периодических решений нелинейных автономных систем обыкновенных дифференциальных уравнений в критическом случае.*

Дану роботу присвячено дослідженню існування періодичних розв'язків нелінійної автономної системи диференціальних рівнянь з виділеною лінійною частиною

$$\frac{dx}{dt} = Jx + g(x), \quad x, g \in \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

у випадку, коли всі розв'язки відповідної лінійної диференціальної системи мають деякий спільний період  $T$ , а період розв'язку нелінійної системи або збігається з  $T$ , або близький до нього. Аналогічні питання розглядалися у багатьох роботах (див., наприклад, [1–5]). Інструментом дослідження є модифікація чисельно-аналітичного методу [6, 7], особливість якої полягає в тому, що обмеження на матрицю Ліпшица стосуються не всієї правої частини, а лише нелінійності  $g(x)$ .

**1.  $T$ -періодичні розв'язки нелінійної системи.** Розглянемо нелінійну автономну систему звичайних диференціальних рівнянь (1), у якій  $J$  —  $(n \times n)$ -вимірна дійсна стала матриця, така, що відповідна лінійна однорідна система

$$\frac{dx}{dt} = Jx \quad (2)$$

має  $n$  нетривіальних розв'язків періоду  $T = 2\pi/\nu$ . Будемо досліджувати питання існування та наближеної побудови періодичних розв'язків системи (1), період яких збігається з періодом  $T$  розв'язків відповідної лінійної системи (2). Зрозуміло, що власні значення матриці  $J$  дорівнюють нулю або є суто уявними. Оскільки таку матрицю перетворенням подібності завжди можна звести до канонічної кососиметричної матриці, то без обмеження загальності можемо вважати, що

$$J = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \nu_1 \\ -\nu_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & \nu_q \\ -\nu_q & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\}, \quad \nu_i: \nu. \quad (3)$$

Припускаємо, що в області  $x \in D \subset \mathbb{R}^n$ ,  $D = \{x \mid 0 \leq r \leq \|x\| \leq R\}$ ,  $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$ ,

виконуються такі умови:

А) функція  $g(x)$  є визначеною, неперервною і задовольняє умови обмеженості і Ліпшиця з невід'ємними сталими  $M$  і  $K$  :

$$\|g(x)\| \leq M, \quad \|g(x') - g(x'')\| \leq K\|x' - x''\|; \quad (4)$$

В)  $MT \leq R - r$ ,  $qK < 1$ , де  $q = \sqrt{\frac{2}{15}}T$ .

Згідно з [6, 7]  $T$ -періодичний розв'язок системи (1) будемо шукати як границю рекурентної послідовності

$$x_{m+1}(t, \xi) = x_0(t, \xi) + \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ g(x_m(s, \xi)) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} g(x_m(\sigma, \xi)) d\sigma \right\} ds, \quad (5)$$

$$x_0(t, \xi) = e^{Jt}\xi, \quad m = \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Необхідні та достатні умови існування  $T$ -періодичного розв'язку системи (1) містять наступні леми.

**Лема 1.** Нехай нелінійна автономна диференціальна система (1) має  $T$ -періодичний розв'язок  $\varphi(t) = \varphi(t, \xi^*)$ . Тоді його початковим значенням є  $\varphi(0) = \xi^*$ , де  $\xi^*$  таке, що

$$\int_0^T e^{-Js} g(\varphi(s, \xi^*)) ds = 0. \quad (6)$$

Доведення відповідного твердження у випадку лінійних крайових умов загального вигляду можна знайти в [4].

**Лема 2.** Нехай  $\xi = \xi^*$  і функція  $\varphi(t) = \varphi(t, \xi^*)$  задовольняють алгебраїчне рівняння (6) і інтегральне рівняння

$$x(t) = e^{Jt}\xi + \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ g(x(s)) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} g(x(\sigma)) d\sigma \right\} ds. \quad (7)$$

Тоді  $\varphi(t)$ ,  $\varphi(0) = \xi^*$ , є  $T$ -періодичним розв'язком автономної диференціальної системи (1).

**Доведення.** Нехай функція  $\varphi(t, \xi)$  є розв'язком інтегрального рівняння (7), тоді

$$\varphi(t, \xi) = e^{Jt}\varphi(0) + \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ g(\varphi(s, \xi)) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} g(\varphi(\sigma, \xi)) d\sigma \right\} ds.$$

З того, що  $\xi = \xi^*$  і  $\varphi(t) = \varphi(t, \xi^*)$  задовольняють рівняння (6), випливає, що виконується тотожність

$$\varphi(t) \equiv e^{Jt}\varphi(0) + \int_0^t e^{J(t-s)} f(s, \varphi(s)) ds,$$

тобто  $\varphi(t)$  є  $T$ -періодичним розв'язком системи (1).

Лему доведено.

На підставі нерівності Коші – Буняковського для довільної неперервної вектор-функції  $f(t)$ ,  $t \in [a, b] \subseteq [0, T_0]$ , отримуємо наступні оцінки:

$$\begin{aligned} \left\| \int_a^b e^{J(t-s)} f(s) ds \right\| &\leq \sqrt{b} \sqrt{\int_a^b \|e^{J(t-s)} f(s)\|^2 ds} \leq \\ &\leq \sqrt{b} \sqrt{\int_a^b \langle e^{J(t-s)} f(s), e^{J(t-s)} f(s) \rangle ds} \leq \sqrt{b-a} \sqrt{\int_a^b \|f(s)\|^2 ds}, \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ f(s) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} f(\sigma) d\sigma \right\} ds \right\| &\leq \\ &\leq \left(1 - \frac{t}{T}\right) \left\| \int_0^t e^{J(t-s)} f(s) ds \right\| + \frac{t}{T} \left\| \int_t^T e^{J(t-s)} f(s) ds \right\| \leq \\ &\leq \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t \|f(s)\|^2 ds} + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T \|f(s)\|^2 ds}. \end{aligned} \quad (9)$$

Крім того, з результатів [7] маємо

$$r_m(t) \leq q^{m-1} r_1(t),$$

де

$$\begin{aligned} r_m(t) &= \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t r_{m-1}^2(s) ds} + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T r_{m-1}^2(s) ds}, \\ r_0(t) &= 1, \quad m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Беручи до уваги (4), (9), оцінюємо відхилення першого наближення:

$$\begin{aligned} \|x_1(t, \xi) - x_0(t, \xi)\| &= \\ &= \left\| \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ g(x_0(s, \xi)) ds - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} g(x_0(\sigma, \xi)) d\sigma \right\} ds \right\| \leq \end{aligned}$$

$$\leq \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t \|g(x_0(s, \xi))\|^2 ds} + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T \|g(x_0(s, \xi))\|^2 ds} \right\} \leq$$

$$\leq r_1(t)M \leq \frac{MT}{2}. \quad (10)$$

Оскільки  $\|x_0(t, \xi)\| = \|\xi\|$ , то, вибираючи довільну точку  $\xi$  з області

$$D_0 = \left\{ \xi \mid 0 \leq r + \frac{MT}{2} \leq \|\xi\| \leq R - \frac{MT}{2} \right\}, \quad D_0 \subset D,$$

з (10) за правилом трикутника одержуємо нерівності

$$\|x_1(t, \xi)\| \leq \|x_1(t, \xi) - x_0(t, \xi)\| + \|x_0(t, \xi)\| \leq R,$$

$$\|x_1(t, \xi)\| \geq \|x_0(t, \xi)\| - \|x_1(t, \xi) - x_0(t, \xi)\| \geq r.$$

Таким чином,  $x_1(t, \xi) \in D$ . Шляхом індукції можна переконатися, що при всіх  $m \in \mathbb{N}$

$$\|x_m(t, \xi) - x_0(t, \xi)\| \leq Mr_1(t) \leq \frac{MT}{2},$$

а отже,  $r \leq \|x_m(t, \xi)\| \leq R$ , і всі члени послідовності (5) належать області  $D$ .

За допомогою (4), (9) оцінимо різницю сусідніх членів послідовності (5):

$$\|x_{m+1}(t, \xi) - x_m(t, \xi)\| =$$

$$= \left\| \int_0^t e^{J(t-s)} \left\{ (g(x_m(s, \xi)) - g(x_{m-1}(s, \xi))) ds - \right. \right.$$

$$\left. \left. - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} (g(x_m(\sigma, \xi)) - g(x_{m-1}(\sigma, \xi))) d\sigma \right\} ds \right\| \leq$$

$$\leq \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t \|g(x_m(s, \xi)) - g(x_{m-1}(s, \xi))\|^2 ds} + \right.$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T \|g(x_m(s, \xi)) - g(x_{m-1}(s, \xi))\|^2 ds} \Big\} \leq \\
 & \leq K \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t \|x_m(s, \xi) - x_{m-1}(s, \xi)\|^2 ds} + \right. \\
 & \left. + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T \|x_m(s, \xi) - x_{m-1}(s, \xi)\|^2 ds} \right\}. \tag{11}
 \end{aligned}$$

Таким чином, з (10), (11) одержуємо

$$\begin{aligned}
 & \|x_2(t, \xi) - x_1(t, \xi)\| \leq \\
 & \leq K \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t \|x_1(s, \xi) - x_0(s, \xi)\|^2 ds} + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T \|x_1(s, \xi) - x_0(s, \xi)\|^2 ds} \right\} \leq \\
 & \leq KM \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \sqrt{t} \sqrt{\int_0^t r_1^2(s) ds} + \frac{t}{T} \sqrt{T-t} \sqrt{\int_t^T r_1^2(s) ds} \right\} \leq KM r_2(t) \leq qKM r_1(t).
 \end{aligned}$$

Методом математичної індукції отримуємо оцінку

$$\|x_{m+1}(t, \xi) - x_m(t, \xi)\| \leq (qK)^m M r_1(t),$$

а тому для всіх  $m \in \mathbb{N}$ ,  $j \geq 1$  маємо

$$\begin{aligned}
 \|x_{m+j}(t, \xi) - x_m(t, \xi)\| & \leq \sum_{k=0}^{j-1} \|x_{m+k+1}(t, \xi) - x_{m+k}(t, \xi)\| \leq \\
 & \leq \sum_{k=0}^{j-1} (qK)^{m+k} M r_1(t) \leq (qK)^m \sum_{k=0}^{j-1} (qK)^k M r_1(t). \tag{12}
 \end{aligned}$$

З (12) і умови В випливає, що послідовність (5) рівномірно збігається при  $m \rightarrow \infty$  в області  $(t, \xi) \in \mathbb{R} \times D_0$  до граничної функції  $x^*(t, \xi)$ . Переходячи до границі при  $j \rightarrow \infty$ , одержуємо оцінку

$$\|x^*(t, \xi) - x_m(t, \xi)\| \leq \frac{(qK)^m}{1 - qK} M r_1(t). \tag{13}$$

Як границя  $T$ -періодичних функцій  $x_m(t, \xi)$ , функція  $x^*(t, \xi)$  також є  $T$ -періодичною і при  $t = 0$  набуває початкового значення  $x^*(0, \xi) = x_0$ . Переходячи в (5) до границі при

$m \rightarrow \infty$ , бачимо, що гранична функція  $x^*(t, \xi)$  є розв'язком інтегрального рівняння (7), а тому, згідно з лемами 1, 2, є  $T$ -періодичним розв'язком системи (1) тоді і тільки тоді, коли

$$\Delta(\xi) = 0, \quad (14)$$

де  $\Delta(\xi) \stackrel{\text{df}}{=} \int_0^T e^{-Js} g(x^*(s, \xi)) ds$ . Таким чином, можемо сформулювати наступний результат.

**Теорема 1.** Нехай система (1) задовольняє умови А, В. Тоді:

1) послідовність функцій  $x_m(t, \xi)$  вигляду (5) при  $m \rightarrow \infty$  рівномірно збігається відносно  $(t, \xi) \in \mathbb{R} \times D_0$  до граничної функції  $x^*(t, \xi)$  і при всіх натуральних  $m$  справджуються оцінки збіжності (13);

2) гранична функція  $x^*(t, \xi)$  є  $T$ -періодичною по  $t$  і набуває початкового значення  $x^*(0, \xi) = \xi$ ;

3) функція  $x^*(t) = x^*(t, \xi^*)$  є  $T$ -періодичним розв'язком системи диференціальних рівнянь (1) тоді і тільки тоді, коли точка  $\xi = \xi^*$  є розв'язком рівняння (14).

Зробити висновки щодо наявності періодичних розв'язків системи (1) можна і не знаходячи граничну функцію  $x^*(t, \xi)$ . Наступне твердження містить конструктивні достатні умови існування періодичних розв'язків, для перевірки яких досить знати лише наближені розв'язки  $x_m(t, \xi)$ .

**Теорема 2.** Нехай для системи (1) справджуються припущення А, В і, крім того:

1) існує опукла, замкнена область  $D_1 \subset D_0$  така, що при деякому фіксованому натуральному  $m$  в області  $D_1$  міститься єдина особлива точка  $\xi = \xi_m$  ненульового індексу відображення  $\Delta_m(\xi) : D_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ :

$$\Delta_m(\xi) = \int_0^T e^{-Js} g(x_m(s, \xi)) ds;$$

2) на границі  $\partial D_1$  області  $D_1$  виконується нерівність

$$\inf_{\xi \in \partial D_1} |\Delta_m(\xi)| > \frac{(qK)^{m+1}}{1 - qK} TM.$$

Тоді система (1) має  $T$ -періодичний розв'язок  $x = x^*(t) = x^*(t, \xi^*)$  з початковим значенням  $x(0) = \xi^*$ , де  $\xi^* \in D_1$ .

**Доведення.** При  $m \geq 1$  з (4), (8), (13) отримуємо оцінки

$$\begin{aligned} \|\Delta(\xi) - \Delta_m(\xi)\| &= \left\| \int_0^T e^{-Js} (g(x^*(s, \xi)) - g(x_m(s, \xi))) ds \right\| \leq \\ &\leq \sqrt{T} \sqrt{\int_0^T \|g(x^*(s, \xi)) - g(x_m(s, \xi))\|^2 ds} \leq \\ &\leq KM \frac{(qK)^m}{1 - qK} \sqrt{T} \sqrt{\int_0^T r_1^2(s) ds} \leq \frac{(qK)^{m+1}}{1 - qK} TM. \end{aligned}$$

Далі, як і при доведенні теореми 3.1 [8], встановлюємо гомотопність полів  $\Delta(\xi)$  і  $\Delta_m(\xi)$ , що і завершує доведення теореми.

**2. Побудова розв'язків з періодами, близькими до  $T$ .** Актуальним є питання існування і наближеної побудови періодичних розв'язків нелінійної системи (1), період  $T_1$  яких незначно відрізняється від періоду  $T$  розв'язків відповідної лінійної системи (2). Оскільки  $T_1$  невідомий, то будемо шукати його у вигляді  $T_1 = (1 + \delta)T$ , де  $\delta$  — невідомий малий параметр. З огляду на те, що (1) є автономною системою, одну з координат  $\xi_1, \dots, \xi_n$  можемо взяти рівною нулю [1, 2]. Без обмеження загальності покладемо  $\xi_n = 0$ . Тоді для побудови розв'язку нелінійної системи (1) нам потрібно знайти  $n$  невідомих:  $\xi_\delta \in \mathbb{R}^n$ ,  $\xi_\delta = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \delta)$ .

За допомогою заміни незалежної змінної

$$t = (1 + \delta)\tau \tag{15}$$

одержуємо задачу знаходження періодичного з відомим фіксованим періодом  $T$  розв'язку автономної системи

$$\frac{dx}{d\tau} = Jx + f(x, \delta), \quad f(x, \delta) = g(x) + \delta(Jx + g(x)), \tag{16}$$

щодо якої припускаємо, що в області  $t \in \mathbb{R}$ ,  $x \in D$ ,  $|\delta| \leq \delta_0$  виконується умова А і, крім того,

$$B_1) M_\delta T \leq R - r, \quad qK_\delta < 1, \quad \text{де } M_\delta = M + \delta_0(M + \|J\|R), \quad K_\delta = K + \delta_0(K + \|J\|).$$

Згідно з викладеним вище,  $T$ -періодичний розв'язок системи (16) будемо шукати як границю рекурентної послідовності

$$\tilde{x}_{m+1}(\tau, \xi_\delta) = \tilde{x}_0(\tau, \xi_\delta) + \int_0^\tau e^{J(\tau-s)} \left\{ f(\tilde{x}_m(s, \xi_\delta), \delta) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} f(\tilde{x}_m(\sigma, \xi_\delta), \delta) d\sigma \right\} ds, \tag{17}$$

$$\tilde{x}_0(\tau, \xi_\delta) = e^{J\tau} x_0, \quad x_0 = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0), \quad m = \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Неважно переконатися, що справедливими є наступні твердження.

**Лема 3.** Нехай нелінійна автономна диференціальна система (16) має  $T$ -періодичний розв'язок  $\varphi(\tau) = \varphi(\tau, \xi_\delta^*)$ . Тоді існує  $\xi_\delta^* = (\xi_1^*, \dots, \xi_{n-1}^*, \delta^*)$  таке, що

$$\int_0^T e^{-Js} f(\varphi(s, \xi_\delta^*), \delta^*) ds = 0 \quad (18)$$

і  $\varphi(\tau)$  набуває початкового значення  $\varphi(0) = (\xi_0^*, \dots, \xi_{n-1}^*, 0)$ .

**Лема 4.** Нехай  $\xi_\delta = \xi_\delta^*$  і функція  $\varphi(\tau) = \varphi(\tau, \xi_\delta^*)$  задовольняють алгебраїчне рівняння (18) і інтегральне рівняння

$$x(\tau) = e^{J\tau} x_0 + \int_0^\tau e^{J(\tau-s)} \left\{ f(x(s), \delta) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} f(x(\sigma), \delta) d\sigma \right\} ds. \quad (19)$$

Тоді  $\varphi(\tau)$ ,  $\varphi(0) = (\xi_1^*, \dots, \xi_{n-1}^*, 0)$ , є  $T$ -періодичним розв'язком автономної диференціальної системи (16).

**Теорема 3.** Нехай система (16) задовольняє умови  $A, B_1$ . Тоді:

1) послідовність функцій  $\tilde{x}_m(t, \xi_\delta)$  вигляду (17) при  $m \rightarrow \infty$  рівномірно збігається відносно  $(t, \xi_\delta) \in \mathbb{R} \times D_\delta$ ,  $\xi_\delta = (x_0, \delta)$ ,

$$D_\delta = D_1 \times I_\delta, \quad D_1 = \{x_0 \mid 0 \leq r + M_\delta T \leq \|x_0\| \leq R - M_\delta T\}, \quad D_1 \subset \mathbb{R}^{n-1}, \quad I_\delta = [-\delta_0, \delta_0],$$

до граничної функції  $\tilde{x}^*(\tau, \xi_\delta)$  і при всіх натуральних  $m$  справджуються оцінки збіжності

$$\|\tilde{x}^*(\tau, \xi_\delta) - \tilde{x}_m(\tau, \xi_\delta)\| \leq \frac{(qK_\delta)^m}{1 - qK_\delta} M_\delta r_1(\tau); \quad (20)$$

2) гранична функція  $\tilde{x}^*(\tau, \xi_\delta)$  є  $T$ -періодичною по  $t$  і набуває початкового значення  $\tilde{x}^*(0, \xi_\delta) = (x_0, 0)$ ;

3) функція  $\tilde{x}^*(\tau) = \tilde{x}^*(\tau, \xi_\delta^*)$  є  $T$ -періодичним розв'язком системи диференціальних рівнянь (1) тоді і тільки тоді, коли точка  $\xi = \xi_\delta^* = (x_0^*, \delta^*)$  є розв'язком рівняння

$$\int_0^T e^{-Js} f(\tilde{x}^*(s, \xi_\delta), \delta) ds = 0.$$

**Теорема 4.** Нехай для системи (16) справджуються припущення  $A, B_1$  і, крім того:

1) існує опукла, замкнена область  $D'_\delta = D'_1 \times I'_\delta$ ,  $D'_1 \subset D_1$ ,  $I'_\delta \subset I_\delta$  така, що при деякому фіксованому натуральному  $m$  наближене визначальне рівняння  $\tilde{\Delta}_m(\xi_\delta) = 0$ , де

$$\tilde{\Delta}_m(\xi_\delta) = \int_0^T e^{-Js} f(\tilde{x}_m(s, \xi_\delta), \delta) ds, \quad \tilde{\Delta}_m(\xi_\delta) : D_\delta \rightarrow \mathbb{R}^n,$$



має в області  $D'_\delta$  єдиний розв'язок  $\xi_\delta = \xi_{\delta m}$  ненульового індексу;  
 2) на границі  $\partial D'_\delta$  області  $D'_\delta$  виконується нерівність

$$\inf_{\xi_\delta \in \partial D'_\delta} |\tilde{\Delta}_m(\xi_\delta)| > \frac{(qK_\delta)^{m+1}}{1 - qK_\delta} TM_\delta.$$

Тоді система (1) має  $T$ -періодичний розв'язок  $x = x^*(\tau) = x^*(\tau, \xi^*)$  з початковим значенням  $x(0) = x_0^*, x_0^* \in D'_1$ .

Враховуючи заміну (15), одержуємо  $T_1 = (1 + \delta^*)T$ -періодичний розв'язок  $x^*(t)$  задачі (1).

**3. Квазілінійні автономні системи.** Розглянемо квазілінійну автономну систему звичайних диференціальних рівнянь

$$\frac{dx}{dt} = Jx + \varepsilon g(x, \varepsilon), \quad (21)$$

де  $\varepsilon$  — малий додатний параметр,  $\varepsilon \in [0, \varepsilon_0]$ ,  $\varepsilon_0 \ll 1$ ,  $t \in \mathbb{R}$ ,  $x, g \in \mathbb{R}^n$ ,  $J$  — стала  $(n \times n)$ -вимірна матриця вигляду (3) і функція  $g(x, \varepsilon)$  задовольняє умову А в області  $(x, \varepsilon) \in D \times [0, \varepsilon_0]$ .

Розглянемо питання існування і наближеної побудови  $T_1 = T_1(\varepsilon)$ -періодичного розв'язку системи (21),  $T_1(\varepsilon) = (1 + \varepsilon\alpha(\varepsilon))T$ . Виконуючи заміну незалежної змінної  $t = (1 + \varepsilon\alpha(\varepsilon))\tau$ ,  $\alpha(0) = \alpha^0$ ,  $\alpha \in I_\alpha = [-\bar{\alpha}, \bar{\alpha}]$ , переходимо до задачі знаходження періодичного з відомим фіксованим періодом  $T$  розв'язку автономної системи

$$\frac{dx}{d\tau} = Jx + \varepsilon h(x, \varepsilon), \quad h(x, \varepsilon) = \alpha(\varepsilon)Jx + (1 + \varepsilon\alpha(\varepsilon))g(x, \varepsilon), \quad (22)$$

який при  $\varepsilon = 0$  перетворюється на один з  $T$ -періодичних розв'язків  $x(t) = e^{Jt}x_0$ ,  $x_0 = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0)$ , породжуючої для (22) лінійної однорідної системи (2).

З метою відшукання  $T$ -періодичного розв'язку системи (22) побудуємо рекурентну послідовність

$$\bar{x}_{m+1}(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon) = \bar{x}_0(\tau, \xi_\alpha) + \varepsilon \int_0^\tau e^{J(\tau-s)} \left\{ h(\bar{x}_m(s, \xi_\alpha, \varepsilon), \varepsilon) - \frac{1}{T} \int_0^T e^{J(s-\sigma)} h(\bar{x}_m(\sigma, \xi_\alpha, \varepsilon), \varepsilon) d\sigma \right\} ds,$$

$$\bar{x}_0(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon) = e^{J\tau}x_0, \quad \xi_\alpha = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \alpha), \quad \alpha = \alpha(\varepsilon), \quad m = \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Зрозуміло, що в області  $(\tau, x, \alpha, \varepsilon) \in \mathbb{R} \times D \times I_\alpha \times [0, \varepsilon_0]$  при достатньо малому  $\varepsilon_0$  мають місце нерівності

$$\varepsilon_0 M_\alpha T \leq R - r, \quad \varepsilon_0 q K_\alpha < 1,$$

де  $M_\alpha = \bar{\alpha} \|J\| R + (1 + \varepsilon_0 \bar{\alpha}) M$ ,  $K_\alpha = \bar{\alpha} \|J\| + (1 + \varepsilon_0 \bar{\alpha}) K$ , а тому твердження, аналогічні теоремам 1 і 2, справджуються і для системи (22), і при цьому відповідні оцінки мають вигляд

$$\|\bar{x}^*(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon) - \bar{x}_m(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon)\| \leq \varepsilon_0 \frac{(\varepsilon_0 q K_\alpha)^m}{1 - \varepsilon_0 q K_\alpha} M_\alpha r_1(\tau),$$

$$\inf_{\xi \in \partial D_\alpha} \|\bar{\Delta}_m(\xi_\alpha)\| > \frac{(\varepsilon_0 q K_\alpha)^{m+1}}{1 - \varepsilon_0 q K_\alpha} T M_\alpha,$$

$$\text{де } \bar{x}^*(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon) = \lim_{m \rightarrow \infty} \bar{x}_m(\tau, \xi_\alpha, \varepsilon),$$

$$\bar{\Delta}(\xi_\alpha) = \int_0^T e^{-Js} h(\bar{x}^*(s, \xi_\alpha, \varepsilon), \varepsilon) ds,$$

$$\bar{\Delta}_m(\xi_\alpha) = \int_0^T e^{-Js} h(\bar{x}_m(s, \xi_\alpha, \varepsilon), \varepsilon) ds, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Наступне твердження дозволяє робити висновки про існування періодичного розв'язку з аналізу наближеного визначального рівняння вже при  $m = 0$ .

**Теорема 5.** Нехай система (22) задовольняє умову  $A$  і відображення

$$\bar{\Delta}_0(\xi_\alpha) = \int_0^T e^{-Js} h(\bar{x}_0(s, \xi_\alpha), \varepsilon) ds$$

має в області  $D'_\alpha \subset D_\alpha$ ,  $D'_\alpha = D'_1 \times I'_\alpha$ ,  $D_\alpha = D_1 \times I_\alpha$ ,  $D'_1 \subset D_1$ ,  $I'_\alpha \subset I_\alpha$ , ізольовану особливу точку  $\xi_\alpha = \xi_{0\alpha}$  ненульового індексу.

Тоді існує  $\varepsilon_1$  таке, що при всіх  $0 < \varepsilon < \varepsilon_1$  система (21) має  $T_1(\varepsilon) = (1 + \varepsilon \alpha^*(\varepsilon))T$ -періодичний розв'язок, який при  $\varepsilon = 0$  перетворюється на  $T$ -періодичний розв'язок  $x(t) = e^{Jt} \xi^*$ ,  $x(0) = \xi^*$ ,  $\xi^* \in D'_\alpha$ , породжуючої лінійної однорідної системи (2).

**Доведення** аналогічне до доведення теореми 3 [7].

1. Самойленко А. М., Ронто Н. И. Численно-аналитические методы исследования решений краевых задач. — Киев: Наук. думка, 1985. — 224 с.
2. Boichuk A. A., Samoilenko A. M. Generalized inverse operators and Fredholm boundary value problems. — Utrecht; Boston: VSP, 2004. — 318 p.
3. Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Чуйко С. М. Периодические решения нелинейных автономных систем в критических случаях // Укр. мат. журн. — 2005. — 57, № 9. — С. 1180–1186.
4. Бойчук А. А. Нелинейные краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений // Там же. — 1998. — 50, № 2. — С. 162–171.
5. Ле Лыонг Тай. Численно-аналитический метод исследования автономных систем дифференциальных уравнений // Там же. — 1978. — 30, № 3. — С. 309–317.
6. Король І. І., Перестюк М. О. Ще раз про чисельно-аналітичний метод послідовних періодичних наближень А. М. Самойленка // Там же. — 2006. — 58, № 4. — С. 472–489.
7. Король І. І. Про періодичні розв'язки одного класу систем диференціальних рівнянь // Там же. — 2005. — 57, № 4. — С. 483–495.
8. Самойленко А. М., Ронто Н. И. Численно-аналитические методы в теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. — Киев: Наук. думка, 1992. — 279 с.

Одержано 22.04.08