

## Нові знахідки *Pterostichus melas* (Creutzer, 1799) (Coleoptera: Carabidae) в Українських Карпатах

Дєдусь В.<sup>1</sup>, Коваль Н.<sup>1,2</sup>, Різун В.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ужгородський національний університет, Україна;

<sup>2</sup> Ужанський національний природний парк, Україна;

<sup>3</sup> Державний природознавчий музей НАН України, Україна

Рід *Pterostichus* (Coleoptera: Carabidae) налічує більш ніж 1000 видів у світовій фауні, які поширені здебільшого в Голарктиці, але також досягають Орієнтальної та Неотропічної областей. В Європі цей рід налічує близько 190 видів.

*Pterostichus melas* (Creutz.) віднесений Б. Бураковським зі співавторами (Burakowski et al., 1974) до мезофільних видів і поширений у середній і південній Європі (за нашими даними вид є мезо-термофільним). В Україні трапляється по всій території, на півночі – рідше. У Карпатах: Покутсько-Буковинські Карпати, Красна, Боржава, Рівна, Вулканічний хребет і Закарпатська низовина (Різун, 2003). З передгір'їв проникає у пояс букових лісів (Пономарчук, 1963). Трапляється рідко, віддає перевагу відкритим місцям.

На території Ужанського національного природного парку виявлений за допомогою ґрунтових пасток у двох локалітетах на висотах 900-1100 м н.р.м.: 1) 21.06.2018 р., 1 екз. І 2.08.2018 р., 2 екз. На вершині хребта Стінка в межах верхньої межі лісу і на вторинних луках (N49.005174, E22.563827, с. Жорнава 7 км WNW, Великоберезнянський р-н); 2) 20.08.2018 р., 2 екз. І 12.08.2018 р., 3 екз. На вершині хребта Явірник в межах верхньої межі лісу і на вторинних луках (N48.904787, E22.557093, с. Кострино, 4 км SSW, Великоберезнянський р-н). За літературними даними цей вид на території Ужанського НПП траплявся лише на відкритих біотопах річкових долин на висоті до 500 м н.р.м. (Мателешко, 2008). Не виключено, що виявлення *Pterostichus melas* (Creutz.) на значних висотах 900-1100 м н.р.м. пов'язане із потеплінням клімату протягом останнього десятиліття.