

Попередній огляд жуків стафілінід під родини Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) Південного сходу України

Глотов С.

Державний природознавчий музей НАН України, Україна

Підродина Aleocharinae є однією з найбільших підродин жуків-стафілінід. На сьогоднішній день у світовій фауні нараховується більше 16 500 видів, що належать до 62 триб та 1310 родів (Klimaszewski та ін., 2018), у той же час, за деякими оцінками, ще декілька десятків тисяч видів алеохарін і досі лишаються не описаними. Представники підродини широко поширені в усіх природних зонах планети та населяють практично всі наземні природні та антропогенні біотопи. Личинки та імаго активно заселяють лісову та лугову підстилку, рослинні та тваринні рештки, екскременти тварин, гриби успішно співіснують з іншими тваринами, мешкаючи в печерах, норах ссавців, гніздах птахів та гуртосімейних комах. Окремі представники роду *Aleochara* виступають в ролі ендопаразитів личинок та лялечок двокрилих та пильщиків.

Дослідження фауни представників підродини Aleocharinae проводились протягом 2004-2014 років, за загальновідомими методиками ентомологічних досліджень, було опрацьовано як власні збори, так і матеріали музейних та фондових колекцій.

У результаті проведених досліджень у фауні регіону виявлено 156 видів, що належать до 44 родів та 13 триб. Наявність існування 152 видів з 38 родів підтверджено власними зборами та матеріалами з фондових колекцій, і лише 4 види на сьогодні лишаються відомими лише за літературними джерелами. Уперше для фауни регіону наведено 148 видів, серед яких 23 види (*Aleochara roubali*, *Atheta aquatica*, *A. aquatilis*, *A. ermischi*, *A. ravilla*, *A. macrocera*, *A. marcida*, *A. ganglbaueri*, *A. excisa*, *A. subtilis*, *Brundinia marina*, *Philhygra parca*, *P. volans*, *Alevonota rufotestacea*, *Gyrophana pseudonana*, *Pellasilis*, *Calodera cochlearis*, *Ocalea latipennis*, *Oxypoda longipes*, *O. nigricornis*, *O. vittata*, *O. vicina*, *Gnypeta brinki*) уперше наведені для фауни України. Серед виявлених видів 33 види є широко поширеними в регіоні і відомі по багаточисленним знахідках у власних зборах так в колекційному матеріалі, у тому числі: *Aleochara curtula*, *A. intricata*, *A. erythroptera*, *A. bipustulata*, *A. tristis*, *Amischa analis*, *Amischa bifoveolata*, *Atheta crassicornis*, *A. longicornis*, *A. fungifungi*, *A. liturata*, *A. nigrigula*, *Dinaraea aequata*, *D. angustula*, *Nehemitropia lividipennis*, *Philhygrae longatula*, *P. hygrobia*, *Plataraea brunnea*, *Falagria sulcatula*, *Gyrophana joyi*, *G. joyioides*, *G. manca*, *G. affinis*, *D. canaliculata*, *Pella limbata*, *P. similis*, *Myllaena intermedia*, *Oxypoda acuminate*, *O. abdominalis*, *O. vicina*, *O. togata*, *Dacryla fallax*, *Tachyusa nitidula*. Решта 119 видів відомі за поодинокими знахідками.