

Пропозиції до списку пралісових реліктових сапроксилобіонтних видів жуків Українських Карпат

Чумак В.О., Чумак М.В.

Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Важливим завданням натеper є підготовка переліку пралісових реліктових сапроксилобіонтних видів твердокрилих регіону Українських Карпат. До такого переліку пропонуємо внести 30 видів категорії 1 та 39 видів категорії 2.

Види категорії – 1. Aderidae: *Phytobaenus amabilis* Sahlb., 1834; Buprestidae: *Acmaeodera degener* (Scop., 1763), *Dicerca aenea* (L., 1761), *Eurythyrea austriaca* (L., 1767), *E. quercus* (Hbst., 1780), *Buprestis splendens* F., 1775; Catopidae: *Dreposcia umbrina* (Er., 1837); Cleridae: *Dermestoides sanguinicollis* (F., 1787), Cononothidae: *Agnathus decoratus* Germ., 1825; Elateridae: *Brachygonus ruficeps* (Muls.Guillb., 1855), *Lacon lepidopterus* (Panz., 1801), *L. querceus* (Hbst., 1784), *Limoniscus violaceus* (Müll., 1821); Erotylidae: *Triplax elongata* Lacord., 1842, *T. melanocephala* (Latr., 1804), *Dacne notata* (Gm., 1788); Eucnemidae: *Nematodes filum* (F., 1801); Histeridae: *Platysoma deplanatum* (Gyll., 1808); Laemophloeidae: *Laemophloeus muticus* (F., 1781); Melandryidae: *Dircaea australis* Fairm., 1856; Oedemeridae: *Ditylus laevis* (F., 1787); Peltidae: *Peltis grossa* (L., 1758); Rhysodidae: *Omoglymmius germari* (Ganglb., 1892) *Rhysodes sulcatus* (F., 1787); Tenebrionidae: *Bolitophagus interruptus* Ill., 1800, *Platydemus dejeanii* Cast.Brulle, 1831, *Corticeus suturalis* Payk., 1800, *C. bicoloroides* (Roub., 1933), *Neatus picipes* (Hbst., 1797); Trogositidae: *Temnochila caerulea* (Ol., 1790).

Види категорії – 2. Alleculidae: *Allecula rhenana* Bach, 1856; Bothrideridae: *Teredus cylindricus* (Ol., 1790); Buprestidae: *Dicerca berlinensis* (Hbst., 1779), *Dicerca alni* (Fisch., 1823); Cerambycidae: *Cerambyx cerdo* L., 1758, *Rosalia alpina* (L., 1758); Cryptophagidae: *Cryptophagus confusus* Bruce, 1934; Cucujidae: *Pediacus dermestoides* (F., 1792); Derodontidae: *Derodontus macularis* (Fuss, 1850); Elateridae: *Ampedus tristis* (L., 1758), *Ampedus elegantulus* (Schönh., 1817), *Ischnodes sanguinicollis* (Panz., 1793), *Megapenthes lugens* (Redt., 1842), *Elater ferrugineus* L., 1758, *Crepidophorus mutilatus* (Rosh., 1847); Endomychidae: *Leiesthes seminigra* (Gyll., 1808); Erotylidae: *Triplax collaris* (Schall., 1783); Eucnemidae: *Xylophilus testaceus* (Hbst., 1806); Histeridae: *Abraeus parvulus* Aubé, 1842; Lucanidae: *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenw., 1785), *Aesalus scarabaeoides* (Panz., 1794); Melandryidae: *Mycetoma suturale* (Panz., 1797), *Eustrophus dermestoides* (F., 1792), *Xylita livida* (Sahlb., 1834), *Phryganophilus ruficollis* (F., 1798); Mycetophagidae: *Mycetophagus ater* (Rtt., 1879), *M. decempunctatus* F., 1801; Nitidulidae: *Ipidia binotata* Rtt., 1875; Scarabaeidae: *Protaetia affinis* (Andersch, 1797), *Osmoderma eremita* (Scop., 1763); Scolytidae: *Rhyncolus reflexus* Boh., 1838, *Rh. sculpturatus* Waltl, 1839; Staphylinidae: *Sepedophilus binotatus* (Grav., 1802); Tenebrionidae: *Mycetochara flavipes* (F., 1792), *Neomida haemorrhoidalis* (F., 1787), *Corticeus fasciatus* F., 1790; Zopheridae: *Rhopalocerus rondanii* (Villa, 1833), *Synchita separanda* (Rtt., 1882), *Colydium filiforme* F., 1792.