

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАУКОВИЙ ВІСНИК
УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

серія

МАТЕМАТИКА І ІНФОРМАТИКА

Випуск 1 (22)

Ужгород 2011

ББК 22.1+72.4 (4УКР)

У-33

УДК 51+001

Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. /
Редкол.: П. М. Гудивок (гол. ред.) та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ
"Говерла", 2011. – Вип. 22. – 216 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор — Гудивок П. М., доктор фізико-математичних наук,
професор.

Заст. головн. редактора — Маринець В. В., доктор фізико-математичних наук,
професор.

Відповідальний секретар — Король І. І., доктор фізико-математичних наук,
доцент.

Члени редакційної колегії:

Бабич М. Д., доктор фізико-математичних наук, професор;

Бовді А. А., доктор фізико-математичних наук, професор;

Волошин О. Ф., доктор технічних наук, професор;

Головач Й. Г., доктор технічних наук, професор;

Гусак Д. В., доктор фізико-математичних наук, професор;

Задирака В.К., член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук, професор;

Козаченко Ю. В., доктор фізико-математичних наук, професор;

Кузка О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Маляр М. М., кандидат технічних наук, доцент;

Моца А. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Перестюк М. О., академік НАН України,

доктор фізико-математичних наук, професор;

Ронто М. Й., доктор фізико-математичних наук, професор.

Рекомендовано до друку Вченою радою Ужгородського національного
університету, протокол №10 від 26.05.2011.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №7972 від 9.10.2003 року, видане Державним комітетом телебачення
і радіомовлення України.

Засновник і видавець – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет».

Виходить два рази на рік.

Збірник наукових праць видається з 1994 року.

Адреса редакційної колегії: Україна, 88016 Ужгород, вул. Університетська, 14,
математичний факультет УжНУ. Тел. (факс): (0312) 642725.

© П. М. Гудивок,

І. І. Король, упорядкування, 2011

© Ужгородський національний університет, 2011

УДК 517.946

В. В. Маринець, О. Ю. Питьовка (Ужгородський національний університет, Мукачівський державний університет)

ОДИН ПІДХІД ПОВУДОВИ ДВОСТОРОННІХ НАБЛИЖЕНЬ ДО РОЗВ'ЯЗКУ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ У ВИПАДКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО - ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ

Modification of two-sides method for boundary-value problem of approaching integration of differential equations of hyperbolic type is built.

Будується одна модифікація двостороннього методу прискореної збіжності наближеного інтегрування крайової задачі для диференціально - функціональних рівнянь гіперболічного типу.

У роботах [1, 2] досліджуються крайові задачі для квазілінійних рівнянь другого порядку гіперболічного типу, коли область відшукування розв'язку розглядуваної задачі обмежена "вільними" кривими та характеристиками заданого диференціального рівняння [3].

У даній роботі узагальнюються одержані результати в [1, 2] і дається один підхід побудови двостороннього методу прискореної збіжності наближеного інтегрування досліджуваної задачі.

Нехай $y = g_i(x)$ ($x = k_i(y)$), $i = 1, 2$ — задані "вільні" криві, причому $g'_1(x) < 0$, $x \in (x_1, x_0)$, $g_1(x_k) = y_k$, $k = 0, 1$, $g'_2(x) > 0$, $x \in (x_0, x_2)$, $g_2(x_0) = y_0$, $g_2(x_2) = y_1$, $x_1 < x_0 < x_2$, $y_0 < y_1 < y_2$. Розглянемо область $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, де $D_1 = \{(x, y) \mid x \in (x_1, x_0), y \in (g_1(x), y_1)\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x \in [x_0, x_2], y \in (g_2(x), y_1)\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid x \in (x_1, x_0), y \in [y_1, y_2]\}$.

Позначимо: $L_2u(x, y) := u_{xy}(x, y) + a_1(x, y)u_x(x, y) + a_2(x, y)u_y(x, y)$, $f[u(x, y)] := f(x, y, u(x, y), u(x, \theta(x, y)))$, $\theta(x, y) := y - \tau(x, y)$, де $\tau(x, y) \geq 0$ — задана неперервна функція, яка визначає початкову множину $\bar{E} = \bar{E}_1 \cup \bar{E}_2$, $\bar{E}_1 = \{(x, \bar{y}) \mid x \in [x_1, x_0], y - \tau(x, y) \leq \bar{y} \leq g_1(x), (x, y) \in \bar{D}_1 \cup \bar{D}_3\}$, $\bar{E}_2 = \{(x, \bar{y}) \mid x \in [x_0, x_2], y - \tau(x, y) \leq \bar{y} \leq g_2(x), (x, y) \in \bar{D}_2\}$.

Постановка задачі: в просторі функцій $C^*(\bar{D}) := C^{(1,1)}(D) \cap C^{(0,1)}(\bar{D})$ знайти розв'язок рівняння

$$L_2u(x, y) = f[u(x, y)], \quad (1)$$

який задовольняє умови

$$u(x, g_1(x)) = \varphi_1(x), \quad u_y(x, g_1(x)) = \psi(x), \quad x \in [x_1, x_0], \quad (2)$$

$$\psi(x) \in C[x_1, x_0], \quad \varphi_1(x) \in C'[x_1, x_0],$$

$$u(x, g_2(x)) = \varphi_2(x), \quad x \in [x_0, x_2], \quad \varphi_2(x) \in C'[x_0, x_2], \quad (3)$$

$$u(x_1, y) = \varphi(y), \quad y \in [y_1, y_2], \quad \varphi(y) \in C'[y_1, y_2], \quad (4)$$

причому виконуються умови узгодженості

$$\varphi_1(x_0) = \varphi_2(x_0), \quad \varphi_1(x_1) = \varphi(y_1), \quad \varphi'(y_1) = \psi(x_1), \quad (5)$$

а

$$u(x, y) |_{\bar{E}} = \Phi(x, y), (x, y) \in \bar{E}, \quad (6)$$

де $\Phi(x, y) \in C'(\bar{E})$ — задана функція. Очевидно

$$\begin{aligned} \Phi(x, g_1(x)) &= \varphi_1(x), \Phi_y(x, g_1(x)) = \psi(x), x \in [x_1, x_0], \\ \Phi(x, g_2(x)) &= \varphi_2(x), x \in [x_0, x_2]. \end{aligned} \quad (7)$$

Розв'язок задачі (1) — (7) $u(x, y) = u_s(x, y)$, $(x, y) \in \bar{D}_s$, $s = 1, 2, 3$, де $u_1(x, y)$ — розв'язок задачі Коші (1), (2), (6) при $(x, y) \in \bar{D}_1$, $u_2(x, y)$ — розв'язок задачі Дарбу (1), (3), (5), (6) при $(x, y) \in \bar{D}_2$ і $u_2(x_0, y) = u_1(x_0, y)$, $y \in [y_0, y_1]$, а $u_3(x, y)$ — розв'язок задачі Гурса (1), (4), (5) при $(x, y) \in \bar{D}_3$ і $u_3(x, y_1) = u_1(x, y_1)$, $x \in [x_1, x_0]$.

Вважаємо, що $a_1(x, y) \in C^{(1,0)}(D)$, $a_2(x, y) \in C^{(0,1)}(D)$, а $f[u(x, y)] \in C(\bar{B})$, $f: \bar{B} \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{B} \subset \mathbb{R}^4$.

Неважко показати, що якщо

$$a_{1x}(x, y) = a_{2y}(x, y), (x, y) \in \bar{D}, \quad (8)$$

то задачу (1) — (7) можна подати в еквівалентній інтегральній формі

$$\begin{aligned} u_1(x, y) &= \begin{cases} \Phi(x, y), (x, y) \in \bar{E}_1, \\ \omega_{1,1}(x, y) + T_1 F[u_1(\xi, \eta)], (x, y) \in \bar{D}_1, \end{cases} \\ \omega_{1,i}(x, y) &:= \varphi_i(x) \exp\left(\int_y^{g_i(x)} a_1(x, \eta) d\eta\right) + \\ &+ \int_{g_i(x)}^y K(x, y; k_1(\eta), \eta) [\psi(k_1(\eta)) + a_1(k_1(\eta), \eta) \varphi_1(k_1(\eta))] d\eta, i = 1, 2, \end{aligned} \quad (9)$$

$$K(x, y; \xi, \eta) := \exp\left(\int_x^\xi a_2(\tau, \eta) d\tau + \int_y^\tau a_1(x, \tau) d\tau\right),$$

$$F[u_s(x, y)] := f[u_s(x, y)] + (a_{2y}(x, y) + a_1(x, y) a_2(x, y)) u_s(x, y), s = 1, 2, 3,$$

$$T_1 F[u_1(\xi, \eta)] := \int_{g_1(x)}^y \int_{k_1(\eta)}^x K(x, y; \xi, \eta) F[u_1(\xi, \eta)] d\xi d\eta, (x, y) \in \bar{D}_1,$$

$$\begin{aligned} u_2(x, y) &= \begin{cases} \Phi(x, y), (x, y) \in \bar{E}_2; \\ \omega_{2,2}(x, y) + T_2 F[u_2(\xi, \eta)], (x, y) \in \bar{D}_2, \end{cases} \\ \omega_{2,2}(x, y) &:= \omega_{1,2}(x, y) + T_{1,1} F[u_1(\xi, \eta)], \end{aligned} \quad (10)$$

$$T_{1,1} F[u_1(\xi, \eta)] := \int_{g_2(x)}^y \int_{k_1(\eta)}^{x_0} K(x, y; \xi, \eta) F[u_1(\xi, \eta)] d\xi d\eta,$$

$$T_2 F[u_2(\xi, \eta)] := \int_{g_2(x)}^y \int_{x_0}^x K(x, y; \xi, \eta) F[u_2(\xi, \eta)] d\xi d\eta, (x, y) \in \bar{D}_2,$$

$$u_3(x, y) = \begin{cases} \Phi(x, y), & (x, y) \in \bar{E}_1; \\ \omega_{3,3}(x, y) + T_3 F[u_3(\xi, \eta)], & (x, y) \in \bar{D}_3, \end{cases}$$

$$\omega_{3,3}(x, y) := \int_{y_1}^y K(x, y; x_1, \eta) [\varphi'(\eta) + a_1(x_1, \eta)\varphi(\eta)] d\eta +$$

$$+ \omega_{1,1}(x, y_1) \exp\left(\int_y^{y_1} a_1(x, \eta) d\eta\right) + T_{1,2} F[u_1(\xi, \eta)] d\xi d\eta, \quad (11)$$

$$T_{1,2} F[u_1(\xi, \eta)] := \int_{g_1(x)}^{y_1} \int_{k_1(\eta)}^x K(x, y; \xi, \eta) F[u_1(\xi, \eta)] d\xi d\eta,$$

$$T_3 F[u_3(\xi, \eta)] := \int_{y_1}^y \int_{x_1}^x K(x, y; \xi, \eta) F[u_3(\xi, \eta)] d\xi d\eta, \quad (x, y) \in \bar{D}_3.$$

Згідно постановки задачі $u_1(x_0, y) = u_2(x_0, y)$ і $u_1(x, y_1) = u_3(x, y_1)$ при $(x, y) \in \bar{D}$, а отже $u_{1y}(x_0, y) = u_{2y}(x_0, y)$, $u_{1x}(x, y_1) = u_{3x}(x, y_1)$, $(x, y) \in \bar{D}$.

Поскільки $(x, y_1 - \tau(x, y_1)) \in \bar{D}_1 \cup E_1$, тобто $u_3(x, y_1 - \tau(x, y_1)) = u_1(x, y_1 - \tau(x, y_1))$, то із (9) – (11) легко перекопатись у справедливості в області \bar{D} рівностей

$$u_{3y}(x, y_1) - u_{1y}(x, y_1) = 0, \quad x \in [x_1, x_0],$$

$$u_{2x}(x_0, y) - u_{1x}(x_0, y) = [\varphi'_2(x_0) - \varphi'_1(x_0) +$$

$$+ (g'_1(x_0) - g'_2(x_0))\psi(x_0)] \exp\left(\int_y^{y_0} a_1(x_0, \eta) d\eta\right), \quad y \in [y_0, y_1]. \quad (12)$$

Таким чином справедлива наступна

Лема 1. Нехай $f[u(x, y)] \in C(\bar{B})$, $a_1(x, y) \in C^{(1,0)}(\bar{D})$, $a_2(x, y) \in C^{(0,1)}(\bar{D})$ і виконується умова (8), а

$$\varphi'_2(x_0) - \varphi'_1(x_0) + (g'_1(x_0) - g'_2(x_0))\psi(x_0) = 0. \quad (13)$$

Тоді, якщо задача (1) – (7) має розв'язок, то він належатиме просторові $C^*(\bar{D})$ (буде регулярним). У супротивному випадку має місце рівність (12) і $u(x, y) \in C^{(1,1)}(D \setminus I) \cap C^{(0,1)}(\bar{D})$, $I = \{(x, y) \mid x = x_0, y \in [y_0, y_1]\}$ (розв'язок буде іррегулярним).

Означення 1. Будемо говорити, що $F[u(x, y)] \in C_1(\bar{B})$, якщо функція $F[u(x, y)]$ задовольняє наступні умови [4]:

1) $F[u(x, y)] \in C(\bar{B})$,

2) в просторі функцій $C(\bar{B}_1)$, $\bar{B}_1 \subset \mathbb{R}^6$, $\text{Пр}_{xOy} \bar{B}_1 = \bar{D}$, існує така функція $H(x, y, u(x, y), u(x, \theta(x, y)); v(x, y), v(x, \theta(x, y))) := H[u(x, y), v(x, y)]$, що

а) $H[u(x, y); u(x, y)] \equiv F[u(x, y)]$,

б) для довільної з простору $C(\bar{D})$ пари функцій $u(x, y), v(x, y) \in \bar{B}_1$, які задовольняють умову $u(x, y) \geq v(x, y)$, $(x, y) \in \bar{D}$, в області \bar{B}_1 виконується нерівність

$$H[u(x, y); v(x, y)] \geq H[v(x, y); u(x, y)], \quad (x, y) \in \bar{D}, \quad (14)$$

3) функція $H[u(x, y); v(x, y)]$ в області \bar{B}_1 задовольняє умову Ліпшица, тобто, для всяких з простору $C(\bar{D})$ функцій $u_i(x, y), v_i(x, y) \in \bar{B}_1, i = 1, 2$, виконується умова

$$\begin{aligned} |H[u_1(x, y); v_1(x, y)] - H[u_2(x, y); v_2(x, y)]| \leq & L(|u_1(x, y) - u_2(x, y)| + \\ & + |u_1(x, \theta(x, y)) - u_2(x, \theta(x, y))| + |v_1(x, y) - v_2(x, y)| + \\ & + |v_1(x, \theta(x, y)) - v_2(x, \theta(x, y))|) \end{aligned}$$

де L — стала Ліпшица.

Очевидно, якщо функція $F[u(x, y)] \in C(\bar{B})$ і має обмежені частинні похідні першого порядку по всім своїм аргументам, розпочинаючи з третього, в області \bar{B} , то вона завжди належить просторові $C_1(\bar{B})$.

Встановимо достатні умови існування та єдиності регулярного (ірегулярного) розв'язку задачі (1) — (7) в області \bar{D} .

Нехай $Z_{p,s}(x, y), V_{p,s}(x, y) \in C(\bar{D})$ належать області $\bar{B}_1, s = 1, 2, 3, p \in \mathbb{N}$.

Введемо позначення:

$$W_{p,s}(x, y) := Z_{p,s}(x, y) - V_{p,s}(x, y),$$

$$f_s^p(x, y) := H[Z_{p,s}(x, y); V_{p,s}(x, y)], f_{p,s}(x, y) := H[V_{p,s}(x, y); Z_{p,s}(x, y)],$$

$$\alpha_{p,s}^*(x, y) := Z_{p,s}(x, y) - \omega_{s,s}^p(x, y) - T_s f_s^p(\xi, \eta), \quad (15)$$

$$\beta_{p,s}^*(x, y) := V_{p,s}(x, y) - \omega_{s,s,p}(x, y) - T_s f_{p,s}(\xi, \eta),$$

$$s = 1, 2, 3, p = 0, 1, 2, \dots, (x, y) \in \bar{D}_s,$$

$$\omega_{1,1}^p(x, y) = \omega_{1,1,p}(x, y) = \omega_{1,1}(x, y), \forall p = 0, 1, 2, \dots, (x, y) \in \bar{D}_1,$$

$$\omega_{2,2}^p(x, y) := \omega_{1,2}(x, y) + T_{1,1} f_1^p(\xi, \eta),$$

$$\omega_{2,2,p}(x, y) := \omega_{1,2}(x, y) + T_{1,1} f_{p,1}(\xi, \eta), (x, y) \in \bar{D}_2,$$

$$\omega_{3,3}^p(x, y) := \omega_{1,1}(x, y_1) \exp\left(\int_y^{y_1} a_1(x, \eta) d\eta\right) +$$

$$+ \int_{y_1}^y K(x, y; x_1, \eta) [\varphi'(\eta) + a_1(x_1, \eta) \varphi(\eta)] d\eta + T_{1,2} f_1^p(\xi, \eta),$$

$$\omega_{3,3,p}(x, y) := \omega_{1,1}(x, y_1) \exp\left(\int_y^{y_1} a_1(x, \eta) d\eta\right) +$$

$$+ \int_{y_1}^y K(x, y; x_1, \eta) [\varphi'(\eta) + a_1(x_1, \eta) \varphi(\eta)] d\eta + T_{1,2} f_{p,1}(\xi, \eta), (x, y) \in \bar{D}_3,$$

$$\bar{Z}_{p,s}(x, y) := Z_{p,s}(x, y) - d_{p,s}(x, y) W_{p,s}(x, y),$$

$$\bar{V}_{p,s}(x, y) := V_{p,s}(x, y) + q_{p,s}(x, y) W_{p,s}(x, y), (x, y) \in \bar{D}_s,$$

$$F_s^p(x, y) := H[\bar{Z}_{p,s}(x, y); \bar{V}_{p,s}(x, y)], F_{p,s}(x, y) := H[\bar{V}_{p,s}(x, y); \bar{Z}_{p,s}(x, y)]$$

$d_{p,s}(x, y), q_{p,s}(x, y) \in C(\overline{D}_s)$ — довільні функції, які задовольняють умови

$$\begin{aligned} 0 \leq d_{p,s}(x, y) \leq 0,5; \quad 0 \leq q_{p,s}(x, y) \leq 0,5, \\ (x, y) \in \overline{D}_s, \text{ для всіх } p \in \mathbb{N}, s = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (16)$$

Побудуємо послідовності функцій $\{Z_{p,s}(x, y)\}$ та $\{V_{p,s}(x, y)\}$ згідно формул [5]

$$\begin{aligned} Z_{p+1,s}(x, y) &= \begin{cases} \Phi(x, y), & (x, y) \in \overline{E}_s, \\ \Omega_{s,s}^p(x, y) + T_s F_s^p(\xi, \eta), & (x, y) \in \overline{D}_s, \end{cases} \quad s = 1, 2, 3, \\ V_{p+1,s}(x, y) &= \begin{cases} \Phi(x, y), & (x, y) \in \overline{E}_s, \quad \overline{E}_3 \equiv \overline{E}_1, \\ \Omega_{s,s,p}(x, y) + T_s F_{p,s}(\xi, \eta), & (x, y) \in \overline{D}_s, \end{cases} \quad s = 1, 2, 3, \\ \Omega_{s,s}^p(x, y) &= \omega_{s,s}^p(x, y) \Big|_{f_s^p(x,y)=F_s^p(x,y)}, \\ \Omega_{s,s,p}(x, y) &= \omega_{s,s,p}(x, y) \Big|_{f_{p,s}(x,y)=F_{p,s}(x,y)}, \end{aligned} \quad (17)$$

де за нульове наближення $Z_{0,s}(x, y), V_{0,s}(x, y) \in \overline{B}_1$ вибираємо довільні функції з простору $C(\overline{D}_s)$, які задовольняють умови

$$\begin{aligned} W_{0,s}(x, y) \geq 0, \quad \alpha_{0,s}^*(x, y) \geq 0, \quad \beta_{0,s}^*(x, y) \leq 0, \quad (x, y) \in \overline{D}_s, \\ Z_{0,s}(x, y) \Big|_{\overline{E}_s} = V_{0,s}(x, y) \Big|_{\overline{E}_s} = \Phi(x, y), \quad s = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (18)$$

Надалі функції $Z_{0,s}(x, y)$ та $V_{0,s}(x, y)$, які задовольняють умови (18) і належать \overline{B}_1 , будемо називатимемо функціями порівняння задачі (1) — (7).

Із (15) та (17) при $(x, y) \in \overline{D}_s, s = 1, 2, 3$ випливає справедливість формул:

$$Z_{p,s}(x, y) - Z_{p+1,s}(x, y) = \alpha_{p,s}(x, y) := Z_{p,s}(x, y) - \Omega_{s,s}^p(x, y) - T_s F_s^p(\xi, \eta), \quad (19)$$

$$V_{p,s}(x, y) - V_{p+1,s}(x, y) = \beta_{p,s}(x, y) := V_{p,s}(x, y) - \Omega_{s,s,p}(x, y) - T_s F_{p,s}(\xi, \eta),$$

$$W_{p+1,s}(x, y) = \Omega_{s,s}^p(x, y) - \Omega_{s,s,p}(x, y) + T_s(F_s^p(\xi, \eta) - F_{p,s}(\xi, \eta)), \quad (20)$$

$$\alpha_{p+1,s}(x, y) = \Omega_{s,s}^p(x, y) - \Omega_{s,s}^{p+1}(x, y) + T_s(F_s^p(\xi, \eta) - F_s^{p+1}(\xi, \eta)), \quad (21)$$

$$\beta_{p+1,s}(x, y) = \Omega_{s,s,p}(x, y) - \Omega_{s,s,p+1}(x, y) + T_s(F_{p,s}(\xi, \eta) - F_{p+1,s}(\xi, \eta)).$$

В силу (16), (18) маємо

$$V_{0,s}(x, y) \leq \overline{V}_{0,s}(x, y) \leq \overline{Z}_{0,s}(x, y) \leq Z_{0,s}(x, y), \quad (x, y) \in \overline{D}_s, \quad s = 1, 2, 3,$$

а отже, на підставі (14) $F_s^0(x, y) - F_{0,s}(x, y) \geq 0$ для всіх $(x, y) \in \overline{D}_s, s = 1, 2, 3$, якщо тільки $Z_{0,s}(x, y), V_{0,s}(x, y) \in \overline{B}_1$. Відмітимо, якщо $\alpha_{0,s}^*(x, y) \geq 0, \beta_{0,s}^*(x, y) \leq 0$, то і $\alpha_{0,s}(x, y) \geq 0, \beta_{0,s}(x, y) \leq 0$ при $(x, y) \in \overline{D}_s, s = 1, 2, 3$. Але тоді із (19), (20) при $p = 0$ одержуємо $Z_{0,s}(x, y) - Z_{1,s}(x, y) \geq 0, V_{0,s}(x, y) - V_{1,s}(x, y) \leq 0, W_{1,s}(x, y) \geq 0$, тобто

$$V_{0,s}(x, y) \leq V_{1,s}(x, y) \leq Z_{1,s}(x, y) \leq Z_{0,s}(x, y), \quad (x, y) \in \overline{D}_s, \quad s = 1, 2, 3,$$

а отже, $Z_{1,s}(x, y), V_{1,s}(x, y) \in \bar{B}_1$.

Вибираємо функції $d_{0,s}(x, y), q_{0,s}(x, y)$, які задовольняють умови (16), таким чином, щоб при $(x, y) \in \bar{D}_s$ виконувались умови [6]

$$Z_{0,s}(x, y) - Z_{1,s}(x, y) - d_{0,s}(x, y)W_{0,s}(x, y) \geq 0,$$

$$V_{0,s}(x, y) - V_{1,s}(x, y) + q_{0,s}(x, y)W_{0,s}(x, y) \leq 0.$$

Тоді в силу (14) $F_s^0(x, y) - F_s^1(x, y) \geq 0, F_{0,s}(x, y) - F_{1,s}(x, y) \leq 0, (x, y) \in \bar{D}_s$.

Але в такому разі із (21) при $p = 0$ маємо $\alpha_{1,s}(x, y) \geq 0, \beta_{1,s}(x, y) \leq 0, (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3$.

Приймаючи функції $Z_{1,s}(x, y), V_{1,s}(x, y)$ за вихідні і повторюючи вище наведені міркування, методом математичної індукції переконаємось, що якщо функції $d_{p,s}(x, y), q_{p,s}(x, y), (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3, p \in \mathbb{N}$ на кожному кроці ітерації (17) вибирати таким чином, щоб виконувались умови

$$Z_{p,s}(x, y) - Z_{p+1,s}(x, y) - d_{p,s}(x, y)W_{p,s}(x, y) \geq 0,$$

$$V_{p,s}(x, y) - V_{p+1,s}(x, y) + q_{p,s}(x, y)W_{p,s}(x, y) \leq 0, \quad (22)$$

$$(x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3, p \in \mathbb{N},$$

то в області \bar{B}_1 мають місце нерівності

$$V_{p,s}(x, y) \leq V_{p+1,s}(x, y) \leq Z_{p+1,s}(x, y) \leq Z_{p,s}(x, y), \quad (23)$$

$$\alpha_{p,s}(x, y) \geq 0, \beta_{p,s}(x, y) \leq 0, (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3, \text{ для всіх } p \in \mathbb{N}$$

Зауважимо, що для всіх $p \in \mathbb{N}$ $\alpha_{p,s}(x, y) \geq \alpha_{p,s}^*(x, y) \geq 0, \beta_{p,s}(x, y) \leq \beta_{p,s}^*(x, y) \leq 0, (x, y) \in \bar{D}_s$.

Лема 2. Якщо $F[u(x, y)] \in C_1(\bar{B})$ і в області \bar{B}_1 існують функції порівняння $Z_{0,s}(x, y)$ та $V_{0,s}(x, y) \in C(\bar{D}_s), s = 1, 2, 3$, тоді множина функцій $d_{p,s}(x, y), q_{p,s}(x, y), (x, y) \in \bar{D}_s$, які задовольняють нерівності (16), (22), не порожня.

Дійсно, покладемо на кожному кроці ітерації (17)

$$d_{p,s}(x, y) = \begin{cases} \alpha_{p,s}^*(x, y)\rho_{p,s}^{-1}(x, y), & W_{p,s}(x, y) \neq 0, \\ 0, & W_{p,s}(x, y) = 0, \end{cases} (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3,$$

$$q_{p,s}(x, y) = \begin{cases} -\beta_{p,s}^*(x, y)\rho_{p,s}^{-1}(x, y), & W_{p,s}(x, y) \neq 0, \\ 0, & W_{p,s}(x, y) = 0, \end{cases} (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3,$$

$$\rho_{p,s}(x, y) = \alpha_{p,s}^*(x, y) - \beta_{p,s}^*(x, y) + W_{p,s}(x, y), p \in \mathbb{N}.$$

Очевидно, таким чином вибрані функції $d_{p,s}(x, y), q_{p,s}(x, y)$ задовольняють умови (16), а в силу (19)

$$Z_{p,s}(x, y) - Z_{p+1,s}(x, y) - d_{p,s}(x, y)W_{p,s}(x, y) \geq \alpha_{p,s}(x, y)(1 - W_{p,s}(x, y)\rho_{p,s}^{-1}(x, y)) \geq 0,$$

$$V_{p,s}(x, y) - V_{p+1,s}(x, y) + q_{p,s}(x, y)W_{p,s}(x, y) \leq \beta_{p,s}(x, y)(1 - W_{p,s}(x, y)\rho_{p,s}^{-1}(x, y)) \leq 0,$$

$$\text{для всіх } (x, y) \in \bar{D}_s, s = 1, 2, 3, p \in \mathbb{N}.$$

Отже, справедлива наступна

Теорема 1. Нехай $F[u(x, y)] \in C_1(\overline{B})$, коефіцієнти $a_i(x, y)$ задовольняють умову (8), а в області \overline{B}_1 існують функції порівняння задачі (1) – (7) $Z_{0,s}(x, y)$, $V_{0,s}(x, y) \in C(\overline{D}_s)$, $s = 1, 2, 3$.

Тоді для послідовностей функцій $\{Z_{p,s}(x, y)\}$ та $\{V_{p,s}(x, y)\}$, які побудовані згідно закону (17), де $d_{p,s}(x, y)$, $q_{p,s}(x, y) \in \overline{D}_s$, $s = 1, 2, 3$, задовольняють умови (16), (22), в області \overline{B}_1 справедливі нерівності (23).

Покажемо, що побудовані таким чином послідовності функцій $\{Z_{p,s}(x, y)\}$ та $\{V_{p,s}(x, y)\}$ збігаються рівномірно в області \overline{D}_s , $s = 1, 2, 3$, до єдиного розв'язку відповідного інтегрального рівняння (9) – (11). В силу виконання в області \overline{B}_1 нерівностей (23), для цього достатньо показати, що $\lim_{p \rightarrow \infty} W_{p,s}(x, y) = 0$, $(x, y) \in \overline{D}_s$, $s = 1, 2, 3$.

Нехай

$$\max_s \left\{ \sup_{\overline{D}_s} W_{0,s}(x, y), \sup_{\overline{D}_s} W_{0,s}(x, \theta(x, y)) \right\} \leq d, \quad Q = \sup_{\overline{D}} (1, y - y_0 + x - x_1),$$

$$\max_{p,s} \sup_{\overline{D}_s} (1 - d_{p,s}(x, y) - q_{p,s}(x, y)) \leq q, \quad \sup_{\overline{D} \times \overline{D}} K(x, y; \xi, \eta) \leq 0, 25K.$$

Тоді із (20) методом математичної індукції переконаємось у справедливості оцінок

$$\max_s \sup_{\overline{D}_s} W_{p,s}(x, y) \leq \frac{[LKQq(y - y_0 + x - x_1)]^p}{p!} d, \quad (24)$$

а отже,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} Z_{p,s}(x, y) = \lim_{p \rightarrow \infty} V_{p,s}(x, y) = u_s(x, y), \quad (x, y) \in \overline{D}_s, \quad s = 1, 2, 3.$$

Перейшовши у формулах (17) до границі, коли $p \rightarrow \infty$ переконаємось, що граничні функції $u_s(x, y)$ є розв'язками відповідних інтегральних рівнянь (9) – (11) при $(x, y) \in \overline{D}_s$, $s = 1, 2, 3$.

Теорема 2. Нехай $F[u(x, y)] \in C_1(\overline{B})$, коефіцієнти $a_i(x, y)$, $i = 1, 2$ задовольняють умову (8) і в області \overline{B}_1 існують функції порівняння задачі (1) – (7) $Z_{0,s}(x, y)$, $V_{0,s}(x, y) \in C(\overline{D}_s)$, $s = 1, 2, 3$.

Тоді послідовності функцій $\{Z_{p,s}(x, y)\}$ та $\{V_{p,s}(x, y)\}$, побудовані згідно закону (17), де $d_{p,s}(x, y)$, $q_{p,s}(x, y) \in C(\overline{D}_s)$, $s = 1, 2, 3$, задовольняють умови (16), (22):

а) збігаються рівномірно до єдиного розв'язку відповідного інтегрального рівняння (9) – (11) при $(x, y) \in \overline{D}_s$, $s = 1, 2, 3$;

б) мають місце оцінки (24);

в) в області \overline{B}_1 виконуються нерівності

$$V_{p,s}(x, y) \leq V_{p+1,s}(x, y) \leq u_s(x, y) \leq Z_{p+1,s}(x, y) \leq Z_{p,s}(x, y), \quad (25)$$

$$(x, y) \in \overline{D}_s, \quad s = 1, 2, 3,$$

для всіх $p \in \mathbb{N}$, де $u_s(x, y)$ – єдиний розв'язку відповідного інтегрального рівняння (9) – (11) при $(x, y) \in \overline{D}_s$,

г) збіжність ітераційного методу (17), (16), (22) не повільніша збіжності двостороннього методу Пікара (коли $d_{p,s}(x, y) = q_{p,s}(x, y) \equiv 0$).

Доведення. Єдиність розв'язку інтегральних рівнянь (9) – (11) при $(x, y) \in \bar{D}_s$, $s = 1, 2, 3$, доводиться методом від супротивного.

Доведемо справедливість нерівностей (25). З цією метою припустимо, що в деякій точці $(x, y) \in \bar{D}_s$ для деякого номера p , наприклад, $u_s(x, y) > Z_{p,s}(x, y)$.

Тоді в силу (23) для всіх $n \in \mathbb{N}$ в розглядуваній точці $(x, y) \in \bar{D}_s$

$$u_s(x, y) > Z_{p,s}(x, y) \geq Z_{p+1,s}(x, y),$$

а отже, в даній точці послідовність функцій $\{Z_{p+n,s}(x, y)\}$ при $n \rightarrow \infty$ не збігається до розв'язку $u_s(x, y)$, що протирічить доведеному. Аналогічно доводяться всі інші нерівності (25).

Нехай $Z_{p,s}(x, y), V_{p,s}(x, y) \in \bar{B}_1$ – двосторонні наближення до розв'язків відповідних інтегральних рівнянь (9) – (11) при $(x, y) \in \bar{D}_s$, $s = 1, 2, 3$, побудовані за деяким методом і вони задовольняють умови $W_{p,s}(x, y) \geq 0$, $\alpha_{p,s}^*(x, y) \geq 0$, $\beta_{p,s}^*(x, y) \leq 0$.

Позначимо через $Z_{p+1,s}^*(x, y), V_{p+1,s}^*(x, y)$ наступні наближення, побудовані згідно двостороннього методу Пікара. Тоді при $(x, y) \in \bar{D}_s$, в силу (14), (16), маємо

$$Z_{p+1,s}^*(x, y) - Z_{p+1,s}(x, y) = \omega_{s,s}^p(x, y) - \Omega_{s,s}^p(x, y) + T_s(f_s^p(\xi, \eta) - F_s^p(\xi, \eta)) \geq 0,$$

$$V_{p+1,s}^*(x, y) - V_{p+1,s}(x, y) = \omega_{s,s,p}(x, y) - \Omega_{s,s,p}(x, y) + T_s(f_{p,s}(\xi, \eta) - F_{p,s}(\xi, \eta)) \leq 0,$$

тобто збіжність методу (17), (16), (22) не повільніша збіжності двостороннього методу Пікара.

Зауважимо, що в залежності від вибору функцій $d_{p,s}(x, y)$ та $q_{p,s}(x, y)$ в алгоритмі (17), (16), (22) ми отримаємо різні модифікації двостороннього методу.

Наслідок 1. Нехай коефіцієнти рівняння (1) $a_1(x, y) \in C^{(1,0)}(D)$, $a_2(x, y) \in C^{(0,1)}(D)$ задовольняють умову (8) і виконуються вимоги теореми 2.

Тоді розв'язок крайової задачі (1) – (7) в області \bar{D} існує і він єдиний, причому при виконанні умови (13) він буде регулярним, в супротивному випадку – іррегулярним.

Наслідок 2. Нехай $\varphi_i(x) = \varphi(y) = \psi(x) = 0$, $i = 1, 2$, $F[u(x, y)] \in C_1(\bar{B})$, причому $F[u(x, y)] \equiv H[u(x, y); 0]$.

Тоді, якщо $F[0] \leq (\geq) 0$ в області \bar{B} , то розв'язок задачі (1) – (7) при $(x, y) \in \bar{D}_s$ задовольняє нерівність $u(x, y) \leq (\geq) 0$.

Розглянемо поряд із рівнянням (1) рівняння вигляду

$$L_2 Z(x, y) = f_1(x, y, Z(x, y), Z(x, \theta(x, y))) := f_1[Z(x, y)], \tag{26}$$

$$f_1 : \bar{B} \rightarrow \mathbb{R}, \bar{B} \in \mathbb{R}^4.$$

Надалі будемо вважати, що праві частини рівнянь (1), (26) задовольняють наступні умови:

$$1) f[u(x, y)] \in C_1(\bar{B}),$$

- 2) функція $f_1[Z(x, y)] \in C(\bar{B})$ і в області \bar{B} має обмежені частинні похідні першого порядку по $Z(x, y)$ і $Z(x, \theta(x, y))$, які задовольняють умови

$$\frac{\partial f[Z(x, y)]}{\partial Z(x, y)} + a_{2y}(x, y) + a_1(x, y)a_2(x, y) \geq 0, \quad \frac{\partial f[Z(x, y)]}{\partial Z(x, \theta(x, y))} \geq 0, \quad (27)$$

- 3) для всякої з простору $C^*(\bar{D})$ функції $V(x, y) \in \bar{B}$

$$f_1[V(x, y)] \geq (\leq) f[V(x, y)]. \quad (28)$$

Теорема 3. Нехай коефіцієнти $a_i(x, y)$, $i = 1, 2$ задовольняють умову (8), а праві частини рівнянь (1), (26) $f[u(x, y)]$ та $f_1[Z(x, y)]$ задовольняють вище наведені умови 1)-3) і в області \bar{B}_1 існують функції порівняння задач (1) – (7), (26), (2) – (7).

Тоді для розв'язків цих задач при $(x, y) \in \bar{D}$ виконуються нерівності

$$u(x, y) \geq (\leq) Z(x, y) \quad (29)$$

Доведення. Згідно теореми 2 і наслідку 1 розв'язки задач (1) – (7), (26), (2) – (7) існують і вони є єдині (регулярні або іррегулярні), а отже, позначивши $W(x, y) := Z(x, y) - u(x, y)$ і використавши теорему Лагранжа про скінченні прирости, матимемо

$$W_{xy}(x, y) + a_1(x, y)W_x(x, y) + a_2(x, y)W_y(x, y) =$$

$$= b_1(x, y)W(x, y) + b_2(x, y)W(x, \theta(x, y)) + f_1[u(x, y)] - f[u(x, y)],$$

де $b_i(x, y)$, $i = 1, 2$ – частинні похідні першого порядку від функції $f_1[Z(x, y)]$ відповідно по $Z(x, y)$ та $Z(x, \theta(x, y))$ при деяких їх фіксованих значеннях, що належать \bar{B} , $(x, y) \in \bar{D}$.

Очевидно, функція $W(x, y)$ задовольняє однорідні умови (2) – (6), а

$$F[W(x, y)] \equiv [b_1(x, y) + a_{2y}(x, y) + a_1(x, y)a_2(x, y)W(x, y) +$$

$$+ b_2(x, y)W(x, \theta(x, y)) + f_1[u(x, y)] - f[u(x, y)],$$

тобто в силу (27), (28) $F[0] \geq (\leq) 0$. На підставі наслідку 2 $W(x, y) \geq (\leq) 0$ при $(x, y) \in \bar{D}$, тобто справедливі нерівності (29).

1. Маринець В.В., Маринець Т.Й., Добридень А.В. Про одну неklasичну задачу теорії рівнянь гіперболічного типу // Праці Міжнародного симпозіуму "Питання оптимізації обчислень" – Київ: Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ, 2009. – Т.2. – С.79–84.
2. Маринець В.В., Питьовка О.Ю. Про одну крайову задачу для диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу // Наук. вісник Ужгород.ун-ту. Сер. матем і інформ. – 2010. – Вип.20. – С.79–89.
3. Коллатц Л. Функціональний аналіз і вычислительная математика. – М.: Мир, 1969. – 448с.
4. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – К: Либідь, 2006. – 424 с.
5. Маринець В.В. Деякі підходи до побудови наближеного розв'язку задачі Гурса для систем визначених квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними з аргументом, що відхиляється // Укр.мат.журнал – 1995. – Т.47, №12. – С.1667–1675.
6. Красносельский М.А., Вайникко Г.М., Забрейко П.П., Рунцицкий Я.Б., Стеценко В.Я. Приближенное решение операторных уравнений. – М.: Наука, 1969. – 456 с.

Одержано 11.02.2011