

НОВІ ВИДИ ТВЕРДОКРИЛИХ РОДИНИ *MALACHIIDAE* У ФАУНІ ЗАКАРПАТТЯ

Мірутенко В.В.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра ентомології та збереження біорізноманіття

Представники родини *Malachiidae* (*Insecta: Coleoptera*) представляють собою досить чисельну групу в межах надродини *Cleroidea* і представлені близько 4000 описаними видами по всьому світу. В Європі поширено 312 видів, в Україні – 35 видів. У фауні Закарпатської області загалом налічується 28 видів жуків-малашок, що систематично належать до 12 родів.

***Apalochrus femoralis* Erichson, 1840**

Загальне поширення: Європа (крім півдня), Центральна Азія.

Зустрічається у червні – на початку липня. Типові місця існування – трав'яниста та кущова рослинність на ветлендах та поблизу них. На території Закарпаття поширений на Закарпатській низовині та у західній частині передгір'їв. Не чисельний.

***Ebaeus ater* Kiesenwetter, 1863**

Syn.: *Ebaeus pannonicus* Švihla, 1990.

Загальне поширення: Центральна Європа.

Відомий по єдиній знахідці на Закарпатській низовині, де був знайдений на початку червня у закинутому кар'єрі між селами Мужієво та Бене на трав'янистій рослинності. Дуже рідкісний вид.

***Anthocomus fasciatus* (Linnaeus, 1758)**

Syn.: *Cantharis fasciatus* Linnaeus, 1758; *Meloë gouani* Linnaeus, 1767; *Malachius regalis* Charpentier, 1818; *Malachius bituberculatus* Stephens, 1830; *Anthocomus latior* Abeille de Perrin, 1891; *Anthocomus latemaculatus* Pic, 1920.

Загальне поширення: Європа, Кавказ, Близький Схід.

Зустрічається з другої половини травня – до кінця червня. Типові місця існування – луки з домінуванням злакових. На території Закарпаття поширений в долинах річок у межах нижнього гірського лісового поясу (пояс букових лісів) – був знайдений в околицях с. Сіль (Великобerezнянський район) та с. Колочава (Міжгірський район). Рідкісний.