



# **Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии**

## **Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology**

Приложение №40

Материалы XVIII Ежегодного конгресса "Гепатология сегодня"

25 - 27 марта 2013 г.

Россия, Москва

Application #40

Abstracts XVIII Annual Russian Congress "Hepatology Today"

March 25 - 27, 2013

Moscow, Russia

№1

XXIII  
ТОМ

2013

## ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПАНКРЕАТИТОВ

Коваль В.Ю., Архий Э.И.

*Ужгородский национальный университет, медицинский факультет,  
г. Ужгород, Украина*

**Цель исследования:** провести анализ клинического течения разных форм хронического панкреатита.

### **Материалы и методы.**

Проведен анализ историй болезни 85 больных (39 – хроническим псевдотуморозным панкреатитом (ХПП), 21 – хроническим кальцифицирующим панкреатитом (ХКП), 25 – хроническим инфильтративно-фиброзным панкреатитом (ХИФП)), которые находились на лечении в гастроэнтерологическом отделении Ужгородской обласной клинической больницы им. А. Новака.

### **Результаты.**

Группу обследованных составило: женщин - 25%, мужчин - 75%. Соотношение мужчин/женщин при ХПП 5,5, при ХКП – 6, при ХИФП – 1,08. При ХПП 61,5% больных имели длительность заболевания от 6 месяцев до 5 лет. При ХКП и ХИФП длительность заболевания составляла от 1 месяца до 10 лет. Каких либо особенностей течения ХП от длительности заболевания не отмечалось. В клиническом течении при ХПП боль отмечалась у 82% больных, общая слабость – 56%, похудение – 44%, неустойчивый стул – 36% больных. При ХКП боль отмечали у 76%, общую слабость – 57%, похудение – 52%, неустойчивый стул – 48% больных. У больных ХИФП в 84% наблюдали боль, 68% - общую слабость, 44% - неустойчивый стул, 40% - вздутие живота. При эндоскопическом обследовании желудка у 56% случаев при ХПП, у 52% при ХКП, у 40% при ХИФП выявляли гастропатию.

### **Выводы:**

1. Хроническими кальцифицирующим и инфильтративно-фиброзным панкреатитом у 5,5-6 раз чаще болеют мужчины.
2. Доминирующими симптомами при разных формах хронического панкреатита есть наличие боли у 76-84 % больных. При хроническом псевдотуморозном и кальцифицирующем панкреатитах у 44-52% больных отмечается значительное похудение. Нестабильный стул одинаково выражен у всех группах хроническим панкреатитом.
3. В 40-56% больных хроническим панкреатитом отмечается гастропатия, которая чаще встречается при хроническом псевдотуморозном панкреатите.