



Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии

Russian Journal of Gastroenterology,
Hepatology, Coloproctology

Приложение № 44
Материалы Юбилейной Двадцатой Объединенной
Российской Гастроэнтерологической Недели
6 – 8 октября 2014 г., Москва

№ 5

XXIV
Том

2014

ОЦЕНКА ДЕПРЕССИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Коваль В.Ю., Архий Э.Й.

Ужгородский национальный университет, Украина

Цель исследования: оценить степень депрессивности у больных хроническим панкреатитом с нарушением экскреторной и инкреторной функции в зависимости от возраста, пола и места проживания.

Материалы и методы. Проведен анкетный опрос депрессивности Бека у 48 больных хроническим панкреатитом с нарушением экскреторной и инкреторной функции, которые находились на лечении в гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака.

Результаты. В анкетировании было опрошено 71% женщин и 29% мужчин. 63% опрошенных были пациенты сельской местности, 38% – городской местности.

После проведения анкетирования все больные согласно шкале опросника депрессивности Бека были распределены на 3 группы: 1 группа – отсутствие депрессивных симптомов, 2 группа – умеренно выраженная депрессия, 3 группа – критический уровень депрессивности. Первую группу составило одинаковое количество женщин и мужчин (соответственно – 50% мужчин и женщин). Возраст пациентов первой группы составил $42,75 \pm 5,54$ лет, 62% – жители села и 37% – городские жители. Во второй группе 89% женщины, 11% мужчин, 67% – жители села и 33% – жители города. Возраст пациентов составил $46,5 \pm 6,97$ лет. Третью группу – с критическим уровнем депрессивности выявленной у 71% женщин и 29% мужчин, городское население – 43% и сельское население – 57% в возрасте $49,43 \pm 5,86$ лет.

Выводы: 1) Отсутствие симптомов депрессивности выявлено у 33% больных хроническим панкреатитом.

2) У 67% больных присутствует симптоматика депрессивности: умеренно выраженная депрессия – 38%, критический уровень депрессивности – 29%.

3) Среди опрошенных больных симптомы депрессивности отмечались у 67% жителей городской и 56% сельской местности.

4) С увеличением возраста уровень депрессивности увеличивался.

5) При лечении больных хроническим панкреатитом нужно учитывать высокий уровень депрессивности и рекомендовать психотерапию.