

COLEOPTERA РІЗНИХ БІОТОПІВ СЕЛА КУШНИЦЯ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

Лемак В.І.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет
вул. А. Волошина, 32, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна

Село Кушниця розташоване у долині річок Боржава та Лисичанка на території Хустського району Закарпатської області. Клімат місцевості характерний для гірських районів, але м'якший, завдяки хребту Полонина Боржава, який захищає від холодних вітрів з півночі.

Дослідження ентомофауни певних природних територій та окремих біотопів є актуальними питаннями сучасної фауністики та екології. Долини річок завжди були важливою складовою «екологічних коридорів», що дозволяють зберегтися та розповсюджуватися багатьом видам твердокрилих.

Упродовж вегетаційного періоду 2022 року в різних біотопах цієї місцевості, нами було знайдено 20 видів комах ряду Твердокрилі (*Coleoptera*). Дослідження проводили загальноприйнятими методами, які включали візуальні спостереження, збір комах вручну та косіння ентомологічним сачком. Оглядали квітучі рослини, дерева, кущі, трав'янисті зарості, відкритий ґрунт. Було досліджено флору та фауну твердокрилих таких біотопів як: город, сад, ліс та прибудинкова територія.

В результаті, на городах у межах села нами неодноразово було виявлено два види твердокрилих *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758, та *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824) з родини *Chrysomelidae*.

В садах знайдені *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) – родина *Scarabaeidae*, а також *Chrysomela vigintipunctata* Scopoli, 1763 і *Plagioderma versicolora* (Laicharting, 1781) – родина *Chrysomelidae*.

На галявинах прилеглого до села лісу виявлені такі види: *Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758) – родина *Cleridae*, *Silpha tristis* Illiger, 1798 – родина *Silphidae*, *Brachinus crepitans* (Linnaeus, 1758) – родина *Carabidae* та *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) – родина *Cetoniidae*.

В дуплах буків були знайдені представники родини *Chrysomelidae* – *Clytra laeviuscula* (Ratzenberg, 1837), та *Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758) і родини *Scarabaeidae* – *Xyloryctes jamaicensis* (Drury, 1773).

На вулицях та біля будинків села Кушниця знайдені *Carabus coriaceus* Linnaeus, 1758 – родина *Carabidae*, *Lucanus cervus cervus* (Linnaeus, 1758) – родина *Lucanidae*, *Cetonia aurata* (Linnaeus, 1761) – родина *Scarabaeidae*, а також *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758, *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773), і *Harmonia axyridis* var. *conspicua* (Faldermann, 1835) – родина *Coccinellidae*.

В цілому, представлені види є звичайними, фоновими для досліджених біотопів.