

СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТЕРЕБЛЯ

Куртяк Ф.Ф.

*ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет
вул. А. Волошина, 32, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна*

Річка Теребля – права притока р. Тиси. Довжина річки складає 97,0 км, площа водозбору – 755 км². Основні притоки є лівими: Озерянка (довжина – 18,0 км; площа водозбору – 114 км²), Сухар (14 км та 69 км² відповідно), Уголька (27 км та 152 км² відповідно).

Наведені нижче відомості з видового складу круглоротих та риб базуються на результатах наших досліджень (2004-2023 рр.), під час яких контрольними відловками були охоплені нижня, середня та верхня течії річки Тереблі, її основні притоки. Виллов проводився за допомогою любительських пасток. Експозиція пасток становила 24 години.

Загалом нами здобуто 658 особини риб, що належать до 24 видів (Дозвіл Держкомрибгоспу України №004 виданий Головному управлінню Закарпатдержрибоохорони). Крім того, у роботі використані матеріали аналізу фондових колекцій риб зоологічних музеїв Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (далі ННПМ НАНУ), Ужгородського національного університету та відомих нам літературних джерел.

Іхтіофауна басейну річки Тереблі за нашими даними, матеріалами зоологічних музеїв та літературних джерел представлена 30 видами риб та 1 –

круглоротих, що належать до 6 рядів, 10 родин, 22 родів. Із яких нами виявлено лише 24 види. Не зустрічались нами, наведені для Тереблї у минулому: *A. ruthenus*, *A. brama*, *A. aspius*, *C. elongatoides*, *C. maraenoides*, *C. migratorius*, *S. ischchan*.

Три види риб вказані нами у басейні Тереблї вперше: *B. barbatus*, *G. uranoscopus*, *P. parva*.

Аборигенна іхтіофауна басейну річки Теребля нараховує 26 видів та підвидів круглоротих та риб, 2 інтродуценти (*P. parva*, *O. mykiss*) та 3 види, інтродукція яких виявилась невдалою: *C. maraenoides*, *C. migratorius*, *S. ischchan*.

У складі круглоротих та риб річки Тереблї, як частина басейну Дунаю, є 2 ендемічні види (6,45%): *E. danfordi*, *H. hucho*.

За особливостями поширення й біології лише 5 видів, що становить 16,13% іхтіофауни, представляють теплолюбивий лімнофільний комплекс (*P. parva*, *A. brama*, *A. albunus*, *C. taenia*, *P. fluviatilis*), решта – 26 видів (83,87%) – відносяться переважно до холодолюбивого реофільно-окситофільного комплексу.

Робота виконана у межах комплексної державної бюджетної науково-дослідної теми 9А-2020 кафедри зоології: «Комплексне вивчення фауни Карпат у контексті збереження біорізноманіття» (№ держреєстрації 0120U104545).