

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЖУКІВ (COLEOPTERA, INSECTA) ОСЕЛИЩ ДОЛИНИ РІЧКИ ЛИСИЧАНКА

Фечка В.І.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет
вул. А. Волошина, 32, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна

Темою для тез стали результати вивчення фауни Твердокрилих (Coleoptera) у різних біотопах долини річки Лисичанка. Протягом 2022-2023 років у різних оселищах (природні та антропогенізовані біотопи) долини річки, було знайдено 25 видів комах ряду Твердокрилі (Coleoptera).

Дослідження ентомофауни певних природних територій та окремих біотопів є актуальними питаннями сучасної фауністики та екології. Долини річок завжди були важливою складовою «екологічних коридорів», що дозволяють зберегтися та розповсюджуватися багатьом видам, в тому числі і твердокрилим.

Упродовж досліджень ми вивчали колеоптерофауну таких біотопів як городи, сади, узлісся, прирічкові трав'янисті зарості та ґрунти. В результаті було виявлено наступні види Coleoptera: *Brachinus crepitans*, Linnaeus, 1758, *Carabus coriaceus*, Linnaeus, 1758, *Cetonia aurata*, Linnaeus, 1761, *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758, *Chrysomela populi*, Linnaeus, 1758, *Chrysomela vigintipunctata*, Scopoli, 1763, *Clytra laeviuscula*, Ratzenberg, 1837, *Coccinella septempunctata*, Linnaeus, 1758, *Dytiscus marginalis* (Linnaeus, 1758), *Eubria palustris* Germar, 1818, *Galeruca tanacetii*, Linnaeus, 1758, *Harmonia axyridis*, Pallas, 1773, *Harmonia conspiciua*, Faldermann, 1835, *Leptinophora decemlineata*, Say, 1824, *Lucanus cervus*, Linnaeus, 1758, *Oedemera femorata*, Scopoli, 1763, *Oxythyrea funesta*, Poda, 1761, *Omoglymmius germari* (Ganglbauer, 1892), *Phyllopertha horticola*, Linnaeus, 1758, *Plagioderma versicolora*, Laicharting, 1781, *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787), *Silpha tristis*, Illiger, 1798, *Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1773), *Trichodes apiaries*, Linnaeus, 1758, *Xyloryctes jamaicensis*, Drury, 1773.

Більшість видів жуків були звичайними, фоновими для місцевості.