ЗАСТОСУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Фатула Ю.М., Купар В.В.

ДВНЗ «УжНУ», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра хірургічних дисциплін, КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.

Ключові слова: лапароскопічні операції, захворювання органів черевної порожнини.

Вступ: У передових хірургічних клініках лапароскопічні операції з кожним роком виконуються у більшій кількості, а також розширюється діапазон їхнього застосування.

Мета: проаналізувати частоту та рівень застосування лапароскопічних методик в загальній структурі всіх операцій, виконаних на органах черевної порожнини та черевній стінці.

Матеріали та методи: У хірургічній клініці Ужгородської центральної міської клінічної лікарні протягом 2023 р. виконано 980 планових і екстрених операцій на органах черевної порожнини та черевній стінці, з них 455 (46,2%) лапароскопічним методом.

Серед виконаних лапароскопічних операцій: 245 холецистектомій, 124 апендектомії, 53 операції при пахвинних грижах (трансабдомінальні преперитонеальні пахвинні герніопластики), 9 фундоплікацій при грижах стравоходного отвору діафрагми (вперше у клініці), 8 операцій при грижах білої лінії живота (4 за методикою eTEP, 4 за методикою SCOLA), 7 операцій при післяопераційних вентральних грижах (3 за методом IPOM, 3 ретромускулярні пластики з сепарацією заднього листка, 1 – зашивання), 1 операція з приводу пупкової грижі (зашивання), 3 зашивання перфоративної виразки 12-палої кишки (вперше в клініці), 4 гінекологічні операції (резекція кісти яєчника – 3, двобічна оваіектомія – 1), 1 сигмостомія з приводу пухлини сигмовидної кишки.

Результати: Відсоток лапароскопічних операцій по відношенню до відкритих методик становив: при жовчнокам′яній хворобі 92%, при гострих апендицитах – 79,5%, при діафрагмальних грижах 90%, при грижах білої лінії живота – 80%, при пахвинних грижах – 41,7%.

Висновки: В Ужгородській ЦМКЛ сучасні лапароскопічні методики широко застосовуються у плановому і екстреному оперативному лікуванні при 10 хірургічних захворюваннях. При операціях з приводу хронічного і гострого калькульозного холециститу, гострого апендициту, деяких видів гриж (діафрагмальних, білої лінії живота, пахвинних) лапароскопічні методики є основними з рівнем використання до 92 %.