

## ЧУТЛИВІСТЬ УРОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ *ESCHERICHIA COLI* ДО ПРЕПАРАТІВ АМІНОПЕНІЦИЛІНОВОГО ТА НІТРОФУРАНОВОГО РЯДІВ У 2015 РОЦІ

©Я. О. Михалко

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

**РЕЗЮМЕ.** У роботі наведено результати дослідження частоти резистентності та чутливості уропатогенних штамів *E. coli* до антибактеріальних препаратів амінопеніцилінового та нітрофуранового рядів. Показано, що при емпіричному лікуванні інфекції сечовивідних шляхів серед досліджених похідних пеніциліну найдоцільніше використовувати ампіцилін сульбактам, а серед похідних нітрофурану – нітрофурантоїн.

**КЛЮЧОВІ СЛОВА:** інфекція сечовивідних шляхів, *Escherichia coli*, антибіотики, амінопеніцилінові антибіотики, похідні нітрофурану.

**Вступ.** Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є однією з найчастіших причин звернень пацієнтів до лікаря загальної практики з приводу бактеріально-зумовлених захворювань. Найефективнішою тактикою лікування даної категорії хворих є призначення антибактеріальних (АБ) препаратів [1]. При цьому АБ призначають, як правило, емпірично. До препаратів вибору, поряд з представниками інших груп, належать також препарати амінопеніцилінового ряду та похідні нітрофурану [2, 3]. Водночас дедалі частіше з'являються повідомлення про зростаючий рівень резистентності основних збудників ІСШ до амінопеніцилінових препаратів та порівняно високу чутливість до нітрофуранових АБ [4–6]. Однак патерни чутливості та резистентності мікроорганізмів до АБ різняться від країни до країни. Саме тому для оптимізації емпіричної терапії ІСШ важливим є дослідження регіонального спектра антибіотикочутливості основних збудників даної інфекції та врахування цього при емпіричному лікуванні ІСШ.

**Мета дослідження** – вивчення особливостей регіональної чутливості уропатогенних штамів *E. coli* до АБ амінопеніцилінового та нітрофуранового рядів у пацієнтів з ІСШ у 2015 році.

**Матеріал і методи дослідження.** У ході роботи було проведено аналіз результатів бактеріологічного дослідження 64 зразків сечі дорослих пацієнтів, які лікувалися з приводу ІСШ, зумов-

леної *E. coli*, протягом 2015 року в лікувальних закладах м. Ужгород. Ідентифікацію мікроорганізмів проводили за стандартними методиками на класичних диференціально-діагностичних середовищах. Визначення чутливості збудників до АБ амінопеніцилінового (ампіцилін, ампіцилін/сульбактам та амоксицилін/клавуланова кислота) та нітрофуранового (фуразидин, фуразолідон та нітрофурантоїн) рядів проводили за стандартною методикою з використанням диск-дифузійного методу у бактеріологічних відділеннях клініко-діагностичних лабораторій Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород та ДЗ «Відділкова клінічна лікарня станції Ужгород» ДТГО «Львівська залізниця». Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакета прикладних програм Statistica 8.0 (StatSoft, США).

**Результати та їх обговорення.** Вивчення профілю антибіотикорезистентності уропатогенних штамів *E. coli* до АБ амінопеніцилінового ряду показало, що найвищим цей показник був для амоксициліну, захищеного клавулановою кислотою – 84,09 % випадків, тоді як найрідше траплялася резистентність до ампіциліну/сульбактаму – 29,55 % випадків. До ампіциліну, не захищеного сульбактамом, резистентність також була високою (69,57 %). Чутливість виділених штамів *E. coli* до вказаних АБ становила 9,09 %, 47,73 % та 13,04 % відповідно (табл. 1).

Таблиця 1. Резистентність *E. coli*, виділеної у пацієнтів з ІСШ, до антибіотиків амінопеніцилінового та нітрофуранового рядів (%)

Антибіотик	S	I	R
Ампіцилін/сульбактам, n=52	47,73	22,73	29,55
Ампіцилін, n=63	13,04	17,39	69,57
Амоксицилін/клавуланова кислота, n=55	9,09	6,82	84,09
Фуразидин, n=57	47,06	35,29	17,65
Фуразолідон, n=58	74,42	4,65	20,93
Нітрофурантоїн, n=54	70,27	5,41	24,32

Примітка: 1) S – чутливість; 2) I – помірна резистентність; 3) R – резистентність; 4) n – кількість досліджених зразків сечі.

Огляди літератури, **оригінальні дослідження**, погляд на проблему

На особливу увагу заслуговують мікроорганізми з помірною резистентністю (ПР) до досліджуваних препаратів, оскільки їх використання у середньотерапевтичних дозах є малоефективним з одного боку та сприяє зростанню антибіотикорезистентності в загальній популяції – з іншого. Серед досліджених у ході роботи пеніцилінових АБ, ПР *E. coli* найчастіше траплялася до ампіциліну/сульбактаму (22,73 %), дещо рідше – до ампіциліну (17,39 %) та амоксициліну клавуланату (6,82 %).

Серед досліджених похідних нітрофурану найвищий рівень резистентності *E. coli* був до нітрофурантоїну (24,32 %), дещо нижчим – до фуразолідону (20,93 %), найнижчим – до фуразидину (17,65 %). В той же час, рівень чутливості вказаного збудника ІСШ був найвищим до фуразолідону (74,42 %), дещо нижчим – до нітрофурантоїну (70,27 %), найнижчим – до фуразидину (47,06 %). Тобто, незважаючи на найнижчий рівень резистентності *E. coli* до фуразидину, чутливість даного збудника до нього теж виявилася найнижчою. Така на перший погляд невідповідність пов'язана з високою частотою ПР до цього препарату, яка

становила 35,29 %. На противагу цьому, рівень ПР до нітрофурантоїну та фуразолідону був дуже незначним (5,41 та 4,65 % відповідно). Варто зазначити, що, не зважаючи на порівняно низький показник резистентності та високий рівень чутливості *E. coli* до фуразолідону *in vitro*, його не рекомендовано застосовувати при лікуванні ІСШ, оскільки при його використанні в терапевтичних дозах не вдається домогтися концентрації препарату в сечі, достатньої для елімінації збудника ІСШ.

**Висновки.** Встановлено високий рівень резистентності уропатогенних штамів *E. coli* до всіх досліджених у ході роботи препаратів. При необхідності призначення АБ амінопеніцилінового ряду перевагу слід надавати ампіцилін/сульбактаму та уникати призначення амоксициліну клавуланату. Із досліджених препаратів похідних нітрофурану доцільно призначати нітрофурантоїн.

**Перспективи подальших досліджень.** У подальшому планується постійно проводити моніторинг рівня резистентності збудників ІСШ до АБ на регіональному рівні.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Guidelines on Urological Infections [Electronic resource] / M. Grabe, R. Bartoletti, T. E. Bjerklund Johansen [et al.] // European Association of Urology. – Electronic data. – 2015. – 86 p. – Access mode: World Wide Web: <https://uroweb.org/guideline/urological-infections/?type=archive> (viewed on March 03, 2016). – Title from the screen.

2. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Гострий неускладнений циститу жінок. Первинна медична допомога [Електронний ресурс] / О. М. Гіріна, С. П. Пасєчніков, Д. Д. Іванов [та ін.] // Наказ МОЗ України № 816 від 23.11.2011 р. – Режим доступу: [http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn\\_20111123\\_816.html](http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111123_816.html) (дата звернення 03.04.2016 р.). – Назва з екрана.

3. Колесник М. О. Протокол надання медичної допомоги хворим на пієлонефрит. [Електронний ресурс] / М. О. Колесник, І. О. Дудар, Н. М. Степанова // На-

каз МОЗ України № 593 від 12.12.2004 р. – Електронні дані. – Режим доступу: [http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn\\_20041212\\_593.html](http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20041212_593.html) (дата звернення 03.04.2016 р.). – Назва з екрана.

4. Antimicrobial susceptibilities of *Escherichia coli* isolates as agents of community-acquired urinary tract infection (2008-2014) / N. Yılmaz, N. Ağuş, A. Bayram [et al.] // Turk. J. Urol. – 2016. – Vol. 42, № 1. – P. 32–36.

5. Betrán A. Evaluation of antibiotic resistance of *Escherichia coli* in urinary tract infections in Primary Care Barbastro Sector (Huesca) / A. Betrán, A.M. Cortés, C. López // Rev. Esp. Quimioter. – 2015. – Vol. 28, № 5. – P. 263–266.

6. High prevalence of multidrug-resistance uropathogenic *Escherichia coli* strains, Isfahan, Iran / R. Dehbanipour, S. Rastaghi, M. Sedighi [et al.] // J. Nat. Sci. Biol. Med. – 2016. – Vol. 7, № 1. – P. 22–26.

## SUSCEPTIBILITY OF THE UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI STRAINS TO THE AMINOPENICILLINS AND NITROFURANS ANTIMICROBIALS IN 2015

©Ya. O. Mykhalko

*Uzhhorod National University, Uzhhorod*

**SUMMARY.** The paper presents the results of the study of the uropathogenic *E. coli* strains resistance and susceptibility rates to aminopenicillins and nitrofurans antimicrobials. It is shown that among the examined derivatives of penicillin in the empirical treatment of urinary tract infection the most appropriate is to use ampicillin/sulbactam, and among nitrofurans derivatives – nitrofurantoin.

**KEY WORDS:** urinary tract infection, *Escherichia coli*, antibiotics, aminopenicillins, nitrofurans.

Отримано 18.04.2016

# ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ



---

2(26)/2016

---

науково-практичний журнал

<i>А. С. Долгіх, Я. О. Михалко, І. І. Кутчак</i> ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА РИЗИК РОЗВИТКУ АНЕМІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ <i>A. S. Dolhikh, Ya. O. Mykhalko, I. I. Kutchak</i> THE INFLUENCE OF CERTAIN FACTORS ON THE RISK OF ANEMIA DURING PREGNANCY .....	50
<i>В. М. Ждан, Є. М. Кімура, О. Є. Кімура, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко, Л. М. Шилкіна, Г. С. Хайменова</i> АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В ПОЄДНАННІ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ У ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ <i>V. M. Zhdan, Ye. M. Kitura, O. Ye. Kitura, M. Yu. Babanina, M. V. Tkachenko, L. M. Shylkina, H. S. Khaymenova</i> THE ASPECTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN COMBINATION WITH ATRIAL FIBRILLATION IN GENERAL PRACTICE .....	53
<i>В. А. Капустник, О. В. Істоміна</i> СТАН ВАЗОАКТИВНИХ ПЕПТИДІВ, ГОРМОНІВ І НЕЙРОМЕДІАТОРІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ <i>V. A. Kapustnyk, O. V. Istomina</i> STATE OF VASOACTIVE PEPTIDES, HORMONES AND NEUROTRANSMITTERS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN COMBINATION WITH HYPERTENSION .....	56
<i>І. І. Кутчак, А. С. Долгіх, П. О. Колесник</i> ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЖІНОК ЗАКАРПАТТЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ <i>I. I. Kutchak, A. S. Dolhikh, P. O. Kolesnyk</i> COMPARISON OF QUALITY OF LIFE OF WOMEN OF TRANS-CARPATHTIA BASED ON ETHNIC AND SOCIAL STATUS .....	60
<i>Я. О. Михалко</i> ЧУТЛИВІСТЬ УРОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ <i>ESCHERICHIA COLI</i> ДО ПРЕПАРАТІВ АМІНОПЕНІЦИЛІНОВОГО ТА НІТРОФУРАНОВОГО РЯДІВ У 2015 РОЦІ <i>Ya. O. Mykhalko</i> SUSCEPTIBILITY OF THE UROPATHOGENIC <i>ESCHERICHIA COLI</i> STRAINS TO THE AMINOPENICILLINS AND NITROFURANS ANTIMICROBIALS IN 2015 .....	64
<i>В. Д. Міхель, М. А. Діогенова, Ю. В. Божович, Н. М. Кіндзерська</i> НА ДОПОМОГУ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ КОН'ЮНКТИВІТІВ У ДІТЕЙ І ДОРΟΣЛИХ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ <i>V. D. Mikhel, M. A. Diohenova, Yu. V. Bozhovych, N. M. Kindzerska</i> TO HELP FAMILY DOCTOR: DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONJUNCTIVITIS IN ADULTS AND CHILDREN IN A POLYCLINIC PRACTICE .....	66
<i>О. Я. Попадюк, Д. О. Мельник</i> ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ НАНООКСИДІВ МЕТАЛІВ НА ПАТОГЕННУ ФЛОРУ ГНІЙНИХ РАН <i>O. Ya. Popadyuk, D. O. Melnyk</i> JUSTIFICATION MECHANISM OF NANO METAL OXIDES ON PATHOGENIC FLORA PURULENT WOUNDS .....	69
<i>О. Г. Родинський, С. С. Ткаченко, О. Г. Зинов'єва</i> ВПЛИВ ЦИТОФЛАВІНУ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ НЕРВОВО-М'ЯЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕНОПАУЗИ <i>O. H. Rodynskiy, S. S. Tkachenko, O. H. Zynovyeva</i> IMPACT OF «CYTOFLAVIN» ON BIOELECTRICAL ACTIVITY OF THE NEUROMUSCULAR COMPLEX IN CONDITION OF EXPERIMENTAL MENOPAUSE .....	74
<i>Н. І. Сидлярук, І. Р. Мисула</i> ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА <i>N. I. Sydliaruk, I. R. Mysula</i> INFLUENCE OF COMBINED THERAPY ON PARODONTAL INDEXES PARAMETERS .....	79
<i>А. М. Шамсієв, Ш. А. Юсупов, А. К. Шахрієв</i> ЕФІЦІЄНЦІЯ АН УЛЬТРАЗВУКОВОЇ СОНОГРАФІЇ В ПЕРИТОНИТІ АПЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТУ СЕРЕДИ ДІТЕЙ <i>A. M. Shamsiev, Sh. A. Yusupov, A. K. Shahriev</i> EFFICIENCY OF AN ULTRASOUND SONOGRAPHY IN CASE OF APPENDICULAR PERITONITIS AMONG CHILDREN .....	84
<i>С. А. Тихонова, В. П. Пісковацька, В. Б. Яблонська</i> АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НЕЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ <i>S. A. Tykhonova, V. P. Piskovatska, V. B. Jablonska</i> CLINICAL AND GENETIC MARKERS OF INEFFECTIVE ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT IN HYPERTENSIVE PATIENTS .....	88